

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-213/2026d z dnia 24.03.2026 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-17/2019wu z dnia 11.05.2019 r.

Posiadacz zezwolenia:

COMPO GmbH, Gildenstr. 38, 48157 Münster, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 251 3277-0,
fax: +49 251 3277-0

COMPO BIO Granulat na ślimaki

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

**Zezwolenie MRiRW nr R-17/2019wu z dnia 11.05.2019 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-213/2026d z dnia 24.03.2026 r.**

Zawartość substancji czynnej:

fosforan żelaza (III) (związek z grupy nieorganicznych związków żelaza) – 12,5 g/kg (1,25%)

EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
--------	---

OPIS DZIAŁANIA

MOLUSKOCYD w postaci przynęty gotowej do zastosowania (RB). Środek przeznaczony do ochrony roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych uprawianych w warunkach polowych i pod osłonami w ogrodach przydomowych i działkowych.

Składnik czynny zaburza układ pokarmowy i metabolizm wapnia u ślimaków, powodując zatrzymanie odżywiania. Hamuje również wytwarzanie śluzu.

Granulat pozostaje atrakcyjny dla ślimaków niezależnie od poziomu wilgotności. Po jednorazowym spożyciu przynęty, ślimaki szybko przerywają żerowanie na roślinie. Następnie giną w przeciągu 3-6 dni, nie pozostawiając przy tym śladów śluzu i innych nieprzyjemnych pozostałości. Efekt działania środka jest widoczny głównie poprzez brak dalszych uszkodzeń roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny warzywne (np. sałata), zioła (świeże), rośliny ozdobne (np. akksamitka), rośliny sadownicze (np. truskawka)

Ślimaki nagie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

5 g/m² (użyć dołączonej do opakowania miarki)

Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkodników lub wyrządzonych przez nie szkód (rozsypać równomiernie na glebę lub podłoże pomiędzy roślinami).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

1. Podczas aplikacji środka należy zachować ostrożność, i zwrócić uwagę aby granulat nie pozostał na liściach, kwiatach lub innych częściach roślin, które mogą być przeznaczone do spożycia.
2. Środek przeznaczony jest do ochrony części nadziemnych roślin, zwłaszcza liści, w tym roślin w fazie siewek. Środek nie chroni części podziemnych roślin, w tym bulw przed uszkodzeniami powodowanymi przez ślimaki.
3. Zaleca się stosować środek wczesnym rankiem, późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem.
4. Środek należy rozsypać równomiernie, bezpośrednio na glebę lub podłoże wokół chronionych roślin upewniając się, aby środek nie znalazł się na liściach lub pomiędzy nimi i na innych częściach roślin.
5. Nie wysypywać punktowo i w formie kopczyków.
6. Jeżeli powierzchnia gleby jest spękana należy ją przed zabiegiem wyrównać.
7. W przypadku dużego nasilenia szkodników środek rozsypać również na sąsiednie grządki.
8. W przypadku pojawienia się licznych szkodników zastosowany środek może zostać szybko wykorzystany. Zabieg należy wówczas powtórzyć następnego dnia w przypadku pojawienia się kolejnych osobników.
9. Nie wymaga podlewania podczas suszy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).
Po zastosowaniu środka należy umyć ręce.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w oryginalnych opakowaniach,

- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w chłodnym, chronionym przed mrozem i dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć natychmiast mydłem i dużą ilością wody.

W przypadku kontaktu z oczami, przepłukiwać oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut i zwrócić się o pomoc medyczną.

W przypadku spożycia, wypłukać usta i wypić duże ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. W razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -