

**INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ W KIERUNKU
CHOROBOTWÓRCZYCH PAŁECZEK JELITOWYCH
(chorzy z objawami zatrucia pokarmowego)**

W przypadku osób z objawami zatrucia pokarmowego próbki należy pobrać jak najszybciej po wystąpieniu objawów zakażenia przewodu pokarmowego (po wystąpieniu biegunki), przed podaniem antybiotyku lub innych leków przeciwbakteryjnych lub co najmniej po 7 dniach od zakończenia kuracji antybiotykowej.

- kał oddać do czystego wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać talerz jednorazowego użytku, w przypadku małych dzieci jednorazową pieluszkę,
- materiał pobrać za pomocą łopatki przytwierdzonej do pokrywki jałowego pojemnika (tzw. kałówki), z różnych miejsc świeżo oddanego kału szczególnie z miejsc o zmienionym wyglądzie (śluz, krew, ropa) w ilości około 1/3 wysokości pojemnika, w przypadku kału płynnego pobrać około 1-2 ml,
- gdy przewidywany czas dostarczenia próbki do badania będzie dłuższy, kał (wielkości ziarna kukurydzy) pobiera się na podłoże transportowe za pomocą wymazówki.

Pojemniki/wymazówki z kałem należy opisać: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania i odpowiednio zabezpieczone dostarczyć do laboratorium:

- próbkę pobraną do plastikowego pojemnika (tzw. kałówki) w ciągu 2 godzin od pobrania, a do tego czasu przechowywać w temperaturze lodówki od +2°C do +8°C,
- próbkę pobraną wymazówką na podłoże transportowe do 72 godzin od pobrania, a do tego czasu przechowywać w temperaturze lodówki od +2°C do +8°C,
- w przypadku podejrzenia zakażenia pałeczkami Shigella, transport próbki powinien być niezwłoczny.

Uwaga!

W przypadku braku możliwości pobrania kału należy pobrać wymaz z odbytu.

Wymazy z odbytu może pobierać tylko personel medyczny.