Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 14 października 2026 r.

Znak sprawy: DHR.rs1.8208.1.60.2024

ZEZWOLENIE nr R-134/2026

Na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 oraz art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009[1] (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin[2] (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 listopada 2024 r. złożonego przez spółkę INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa zgodnie z art. 33 oraz art. 34 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz wniosku z dnia 21 listopada 2024 r. złożonego zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Catanga 200 SC.**

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Producent środka ochrony roślin:	INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Rodzaj środka ochrony roślin:	insektycyd
Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j. z późn. zm.)

Substancja czynna:	chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)
Okres ważności środka ochrony roślin	2 lata

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
250 ml; 500 ml; 510 ml; 564 ml; 600 ml; 800 ml; 1 l; 1,2 l; 2 l; 3 l; 4 l; 5 l; 5,85 l; 6 l; 10 l; 11,22 l; 20 l; 22 l; 124 l; 220 l; 222 l	HDPE
275 ml; 323 ml; 550 ml; 574 ml; 1 l; 1,1 l; 5 l; 5,5 l; 5,85 l; 10 l	HDPE/PA
312 ml; 318 ml; 570 ml; 575 ml; 580 ml; 585 ml; 1,15 l; 1,16 l; 1,17 l; 1,185 l; 1,2 l; 5,88 l; 5,95 l; 10 l	f-HDPE
250 ml; 310 ml; 500 ml; 579 ml; 1 l; 1,2 l; 5 l; 5,65 l; 10 l; 20 l	HDPE/EvOH

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 31 maja 2028 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011[3], zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

[3] Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. *w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin* (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008[4] (dalej jako: rozporządzenie CLP).

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia oraz numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie, po każdym wydaniu takiej decyzji.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowanie środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji.

Załącznik nr 5 – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 – Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. *w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006* (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Załącznik nr 8 – Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1:
   H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
2. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1:
   H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H410

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH208 – Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcję alergiczną.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P391 – Zebrać wyciek.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna chlorantraniliprol zaliczona jest do grupy 28.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych w szklarni (plecakowych lub wózkowych).

Ziemniak

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50–62,5 ml/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 31-60).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Kukurydza (w uprawie na ziarno)

omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy widoczny jest wierzchołek wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53–69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku kwitnienia (10% kwiatów otwartych) do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: w warunkach nasilonego wystąpienia pryszczarka kapustnika działanie środka polega na ograniczeniu występowania tego szkodnika.

Jabłoń
owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha (125 ml na 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha (70-125 ml 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)
Termin zabiegu: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż na początku wylęgania się larw (faza „czarnej główki"), do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 70)
Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

zwójkówki liściowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha (125 ml na 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha (70-125 ml 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Termin zabiegu: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, wczesną wiosną w fazie zielonego pąka na zimujące lub wylegające się gąsienice (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 70)

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Uwaga:

Środek w dawce 125 ml na 1 ha wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkóweczką.

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Po zastosowaniu tego środka w uprawie roślin korzeniowych, roślin bulwiastych, roślin kapustnych, winorośli, roślin ozdobnych, warzyw uprawianych na jadalne liście, środki zawierające substancję chlorantraniliprol można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 2 lata.

Po zastosowaniu tego środka w uprawie drzew owocowych, drzew bożonarodzeniowych, wierzby, środki zawierające substancję chlorantraniliprol można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 3 lata.

Termin zabiegu zaleca się wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników, z uwzględnieniem progu szkodliwości dla danego szkodnika.

Podczas stosowania nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Zalecane dawki środka w jabłoni i gruszy odnoszą się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany liści" – LWA:

$$\text{Powierzchnia ściany liści } [m^2/ha] = \frac{\text{2 x wysokość opryskiwanej ściany liści [m]} \times 10\,000\ [m^2/ha]}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$$

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści - LWA:

$$\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści } [ml/10\,000\ m^2] = \frac{\text{Ilość środka [ml/ha]} \times 10\,000\ [m^2/ha]}{\text{powierzchnia ściany liści } [m^2/ha]}$$

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha plantacji (ml/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

$$\frac{\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię}}{}$$

Ilość środka [ml/ha]	=	ściany liści [ml/10 000 m^2] x powierzchnia ściany liści [m^2/ha] / 10 000 [m^2/ha]

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy każdorazowo wyliczyć rzeczywistą powierzchnię ściany liści (LWA) i dawkę przestrzenną dla kwatery/sadu w którym środek ma być zastosowany.

Nie należy przekraczać maksymalnych zalecanych dawek środka na 1 ha powierzchni płaskiej sadu, nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Środek zawiera substancję czynną chlorantraniliprol, która wg klasyfikacji IRAC należy do grupy 28. Mechanizm działania tej substancji czynnej polega na modulowaniu receptorów rianodynowych owadów. W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach zwalczanych szkodników zaleca się m.in.:

- stosować środek przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji IRAC, o odmiennym mechanizmie działania
- środek Catanga 200 SC oraz inne środki zawierające substancje czynne z grupy 28 wg klasyfikacji IRAC, stosować maksymalnie 2 razy w danej uprawie w sezonie wegetacyjnym,
- w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
- nie stosować środka w obniżonych dawkach, również w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Winorośl (w uprawie w polu na winogrona stołowe i w uprawie w polu z przeznaczeniem na wytwarzanie wina) – 30 dni,

burak cukrowy – 28 dni,

marchew, chrzan pospolity, rzodkiewka, seler korzeniowy, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia (syn. kozibród porolistny), brukiew, rzepa biała, skorzonera (syn. wężymord) – 21 dni,

ziemniak, jabłoń, grusza, śliwa, pigwa pospolita, jabłoń płonka (syn. dzika), grusza azjatycka, nieszpułka zwyczajna, brzoskwinia zwyczajna, morela, wiśnia, czereśnia, leszczyna pospolita (orzech leszczyny), orzech włoski, kasztan jadalny – 14 dni,

kukurydza (w uprawie na ziarno), rzepak ozimy, kukurydza cukrowa, rzepak jary, len zwyczajny (w uprawie na nasiona), mak lekarski (w uprawie na nasiona), gorczyca sarepska (w uprawie na nasiona), gorczyca czarna (w uprawie na nasiona), gorczyca biała (w uprawie na nasiona), rzepik ozimy (w uprawie na nasiona) – 7 dni,

kalafior, brokuł zwyczajny – 1 dzień,

sałata, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, rzeżucha ogrodowa (syn. pieprzyca siewna), rukola (syn. rokietta siewna), endywia o liściach szerokich, szpinak, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, portulaka warzywna, gorczyca sarepska (syn. kapusta sitowata) uprawiana na liście (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża) – 1 dzień,

trawy uprawiane na nasiona, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach, rośliny ozdobne (w uprawie w polu), wierzba sp. (w uprawie na cele wikliniarskie i w uprawie na cele energetyczne) – nie dotyczy.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wchodzenia na obszar po zabiegu przez 24 godziny od jego wykonania.

W przypadku zastosowania w szklarni: stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W przypadku uprawy drzew i krzewów owocowych, drzewek bożonarodzeniowych, wierzby, winorośl:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 40 m zadarnionej na szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie, od terenów nieużytkowanych rolniczo, strefy ochronnej o szerokości:

- 3 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
- 5 m.

W przypadku uprawy roślin korzeniowych i okopowych, kukurydzy, rzepaku jarego, prosa, lnu, maku, gorczycy sarepskiej, gorczycy czarnej, gorczycy białej, rzepiku ozimego, traw:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kalafiora i brokułu:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego i roślin ozdobnych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, adres www) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia
Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia
Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Burak cukrowy

szarek komośnik, ćma buraczana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/ha środka Catanga 200 SC + 100 ml/ha adiuwanta Asystent+

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zwarcia międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31–49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Marchew

połyśnica marchwianka, błyszczka jarzynówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2.liscia do fazy całkowitego rozwoju (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 12–49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–800 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Chrzan pospolity, rzodkiewka, brukiew, rzepa biała w uprawie na korzeń (w uprawie w polu)

gnatarz rzepakowiec, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, bielinek rzepnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy 2. liścia do fazy całkowitego rozwoju (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 12–49).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–800 l/ha
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Seler korzeniowy (w uprawie w polu)
połyśnica marchwianka, błyszczka jarzynówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy całkowitego rozwoju (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 12–49).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–800 l/ha
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Topinambur (syn. słonecznik bulwiasty)
błyszczka jarzynówka, omacnica słonecznikówka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować od fazy 2. liścia do końca wzrostu bulw (BBCH 12–49).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–800 l/ha
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia (syn. kozibród porolistny), skorzonera (syn. wężymord) (w uprawie w polu)
połyśnica marchwianka, błyszczka jarzynówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy 2. liścia do fazy całkowitego rozwoju (części roślin przeznaczone do zbioru osiągają typową wielkość) (BBCH 12–49).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–800 l/ha
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kukurydza cukrowa
omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy widoczny jest wierzchołek wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53–69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary
chowacz podobnik, *pryszczarek kapustnik*, *chowacz czterozębny*, *chowacz brukwiaczek*, *słodyszek rzepakowy*, *tantniś krzyżowiaczek*, *gnatarz rzepakowiec*
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100–175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku kwitnienia (10% kwiatów otwartych) do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Len zwyczajny (w uprawie na nasiona)

zwójka lnianeczka, *pchełka lnowa*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100–175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy początku kwitnienia do fazy początku rozwoju owoców (10% torebek nasiennych osiągnęło ostateczną wielkość) (BBCH 61–71).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Mak lekarski (w uprawie na nasiona)

chowacz makówkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100–175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku kwitnienia (otwiera się pierwszy kwiat na pędzie głównym) do fazy pełni kwitnienia (kwiat na pędzie głównym otwarty w 50%) (BBCH 61–65).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Gorczyca sarepska, gorczyca czarna, gorczyca biała (w uprawie na nasiona)

chowacz podobnik, *pryszczarek kapustnik*, *chowacz czterozębny*, *chowacz brukwiaczek*, *słodyszek rzepakowy*, *tantniś krzyżowiaczek*, *gnatarz rzepakowiec*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100–175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów otwartych na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają) (BBCH 61–65).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepik ozimy (w uprawie na nasiona)
chowacz podobnik, *pryszczarek kapustnik*, *chowacz czterozębny*, *chowacz brukwiaczek*, *słodyszek rzepakowy*, *tantniś krzyżowiaczek*, *gnatarz rzepakowiec*
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100–175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od fazy początku kwitnienia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 61–65).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kalafior, brokuł zwyczajny (w uprawie w polu)
chowacz czterozębny, *chowacz brukwiaczek*, *słodyszek rzepakowy*, *śmietka kapuściana*, *gnatarz rzepakowiec*, *tantniś krzyżowiaczek*, *pchełki*
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
Termin stosowania: gdy główka/róża osiąga typową wielkość i kształt, jest ciasno zamknięta (BBCH 49).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Grusza
Owocówka jabłkóweczka, *miodówka gruszowa*, *paciornica gruszowianka*, *zwójki*
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha (125 ml na 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha (70-125 ml 10 000 m^2 powierzchni ściany liści – LWA)

Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia(BBCH 56–69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pigwa, grusza azjatycka
owocówka jabłkóweczka, pryszczarek gruszkowiec, paciornica gruszowianka, zwójki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 56–70).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Śliwa
kwieciak pestkowiec, owocówka śliwkóweczka, zwójki liściowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze

kwiaty do fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) (BBCH 56-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jabłoń płonka (syn. dzika)
owocówka jabłkóweczka, zwójki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy zielonego pąka do fazy końca kwitnienia (BBCH 56–69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Brzoskwinia zwyczajna, morela zwyczajna
nasionnica trześniówka, kwieciak pestkowiec, owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy, gdy płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze kwiaty do fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki)
(BBCH 56-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Nieszpułka zwyczajna

nasionnica trześniówka, kwieciak pestkowiec, owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha

Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy, gdy płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze kwiaty do fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) (BBCH 56-70).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Wiśnia, czereśnia

nasionnica trześniówka, kwieciak pestkowiec, zwójkówki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha

Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze kwiaty do fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) (BBCH 56-65).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Leszczyna pospolita (orzech leszczyny)

zwójka różóweczka, chrabąszcz majowy, opuchlak lucernowiec, słonik orzechowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, do fazy pełni kwitnienia (BBCH 56-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Orzech włoski
nasionnica orzechówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy kwiatostanów rozwiniętych w 60% do fazy pełni kwitnienia (BBCH 56-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Kasztan jadalny
słonik kasztanowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125–175 ml/ha
Środek w wyżej zalecanej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy kwiatostanów rozwiniętych w 60% do fazy pełni kwitnienia (BBCH 56-65).
Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Winorośl (w uprawie w polu na winogrona stołowe i w uprawie w polu z przeznaczeniem na wytwarzanie wina)
zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany są całkowicie rozwinięte (kwiaty oddzielone od siebie) do fazy wybarwiania się jagód (BBCH 57–83).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 700–1500 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Trawy uprawiane na nasiona
skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do fazy końca kwitnienia (BBCH 53–69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA
Rośliny poddane zabiegowi nie mogą być stosowane jako pasza.

Drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach,
skoczogonki, krobik modrzewiowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze kwiaty (nadal zamknięte) do fazy końca kwitnienia (BBCH 56–69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w uprawie w polu)
skoczogonki, krobik modrzewiowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczny kwiatostan lub pąki kwiatowe) do fazy końca kwitnienia (BBCH 51–69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Nie stosować środka na roślinach ozdobnych, które są lub mogą być przeznaczone do spożycia.

Wierzba sp. (w uprawie na cele wikliniarskie i w uprawie na cele energetyczne)
rynnica topolowa, jątrewka pospolita, jątrewka wiklinówka, niekreślanka zielona, pryszczarki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników, po fazie kwitnienia (>BBCH 69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200–750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Sałata, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, rzeżucha ogrodowa (syn. pieprzyca siewna), rukola (syn. rokietta siewna), endywia o liściach szerokich, szpinak, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę botwinka, portulaka warzywna, gorczyca sarepska (syn. kapusta sitowata) uprawiana na liście (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

śmietka kiełkówka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 155–210 ml/ha

Termin zabiegu: Zabieg wykonać do fazy osiągnięcia typowej wielkości i kształtu części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500–1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: : 1

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2024 r. złożonym zgodnie z art. 33 oraz art. 34 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 z siedzibą w Warszawie wystąpiła o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Catanga 200 SC.

Na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o środkach ochrony roślin minister właściwy do spraw rolnictwa przekazał przedłożoną wraz z wnioskiem dokumentację dotyczącą wnioskowanego środka ochrony roślin podmiotowi upoważnionemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy – 3P Expert.

Mając na uwadze art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz oceny i raporty opracowane przez podmiot upoważniony stwierdzono co następuje:

1. W skład przedmiotowego środka ochrony roślin wchodzą substancja czynna chlorantraniliprol dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i spełniająca warunki związane z jej użyciem określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011[5] (dalej jako: rozporządzenie nr 540/2011).
2. Określono właściwości fizyczne i chemiczne środka ochrony roślin oraz potwierdzono, że są one odpowiednie do zakresu stosowania, przechowywania i transportu, określono rodzaj i zawartość substancji czynnej oraz innych substancji środka ochrony roślin, w tym zanieczyszczeń o znaczeniu toksykologicznym i ekotoksykologicznym. Potwierdzono, że w skład środka nie wchodzą składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009. Ponadto, żaden ze składników obojętnych środka ochrony roślin nie spełnia kryteriów identyfikacji, które są uznawane za niedozwolone do stosowania w środkach ochrony roślin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/574[6].
3. Określono właściwy dla przedmiotowego środka rodzaj opakowań, z uwzględnieniem materiału, z których są one wykonane, sposobu ich wykonania oraz ich wymiarów i pojemności, wymiaru otworu, w tym zamknięcia i sposobu uszczelnienia.

[5] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. *w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych* (Dz. Urz. UE L 153 z 11.06.2011, str. 1, z późn. zm.).

[6] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/574 z dnia 13 marca 2023 r. *ustanawiające szczegółowe zasady identyfikacji składników obojętnych niedozwolonych w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009* (Dz. Urz. UE L 75 z 14.3.2023 r. str. 7).

4. Środek ochrony roślin stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody przeznaczonej do spożycia oraz nie wykazuje niepożądanego oddziaływania na organizmy nie będące celem jego zastosowania.
5. Ustalony został najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w środkach spożywczych, który obejmuje zakres stosowania środka, zgodny z wartościami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005[7].
6. Potwierdzono skuteczność działania środka w zakresie określonym w załącznikach do niniejszego zezwolenia oraz nie wykazano niepożądanego działania na rośliny i produkty roślinne.
7. Środek ochrony roślin został sklasyfikowany oraz oznakowany na podstawie art. 13 rozporządzenia CLP.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w rozporządzeniu nr 540/2011, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 31 maja 2028 r.

Dodatkowo wnioskiem z dnia 23 września 2020 r. złożonym zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka nazwa spółki wystąpiła o uwzględnienie w zezwoleniu zastosowania środka w następujących zastosowaniach: burak cukrowy, marchew, chrzan pospolity, rzodkiewka, brukiew, rzepa biała w uprawie na korzeń w polu, seler korzeniowy w uprawie w polu, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia (syn. kozibród porolistny), skorzonera (syn. wężymord) w uprawie w polu, kukurydza cukrowa w uprawie na kolby, rzepak jary, len zwyczajny w uprawie na nasiona, mak lekarski w uprawie na nasiona, gorczyca sarepska, gorczyca czarna, gorczyca biała (w uprawie na nasiona), rzepik ozimy w uprawie na nasiona, kalafior, brokuł zwyczajny w uprawie w polu, grusza, pigwa, grusza azjatycka, śliwa, jabłoń płonka (syn. dzika), brzoskwinia zwyczajna, morela zwyczajna, nieszpułka zwyczajna, wiśnia i czereśnia w uprawie na owoce, leszczyna pospolita w uprawie

[7] Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. *w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego* (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005 r., str. 1, z późn. zm.).

na orzechy, orzech włoski, kasztan jadalny, winorośl w uprawie w polu na winogrona stołowe oraz z przeznaczeniem na wytwarzanie wina, trawy uprawiane na nasiona, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach, rośliny ozdobne, wierzba sp. w uprawie na cele wikliniarskie oraz energetyczne, sałata, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, rzeżucha ogrodowa (syn. pieprzyca siewna), rukola (syn. rokietta siewna), endywia o liściach szerokich, szpinak, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, portulaka warzywna oraz gorczyca sarepska (syn. kapusta sitowata) uprawiana na liście (w uprawie w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża). Biorąc powyższe pod uwagę środek może być stosowany w rozszerzonym zakresie w powyższych uprawach przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Pismem z dnia 16 września 2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce INNVIGO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)[8], został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W toku korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną pełnomocnik spółki przedstawił uwagi do zawiadomienia, przekazując swoje ostateczne stanowisko w dniu 12 października 2026 r. Zgłoszone uwagi zostały częściowo uwzględnione przez organ.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej[9].

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego[10] (dalej jako: k.p.a.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 § 1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*[11] albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

[9] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)
[11] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)