



Znak sprawy: DHR.HOR.ow.8208.261.2017(2025)

DECYZJA nr R-764/2025d

Na podstawie art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2017 r. wraz z korektą z dnia 29 lipca 2025 r. złożonego przez spółkę BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Konfederacja Szwajcarska.

USTALAM

następujące warunki wprowadzania do obrotu środka ochrony roślin **Stomp Aqua 455 CS** dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-90/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.:

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Konfederacja Szwajcarska
Producent środka ochrony roślin:	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Konfederacja Szwajcarska
Rodzaj środka ochrony roślin:	herbicyd
Kategoria użytkowników środka	użytkownicy profesjonalni

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

ochrony roślin:	
Substancja czynna:	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) 455 g/l (38,56%)
Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną:	1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylizotiazol-3(2H)-on
Okres ważności środka ochrony roślin:	3 lata

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
250 ml - 50 l	HDPE, f-HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 15 stycznia 2028 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer i datę wydania zezwolenia oraz numer i datę niniejszej decyzji odnawiającej zezwolenie, a także numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie, po każdym wydaniu takiej decyzji.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z aktualnymi warunkami zezwolenia.

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania zezwolenia na wprowadzanie niniejszego środka do obrotu.

ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJI

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji i następstwo roślin.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B:
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
2. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2:
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
3. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2:
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS07, GHS08, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H317, H361d, H411

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę.

P391 - Zebrać wyciek.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany doglebowo, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania wodą (CS).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina zaliczana jest do grupy 3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Środek pobierany jest przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Środek pozostaje skuteczny w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

Zastosowanie wiosenne przedwschodowe (truskawka, cebula, marchew, groch jadalny zielony):

Chwasty wrażliwe	bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe	maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, żótlca drobnokwiatowa

Zastosowanie wiosenne powschodowe (cebula):

Chwasty wrażliwe	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe	chwastnica jednostronna, komosa biała, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, tasznik pospolity

Zastosowanie jesienne (truskawka):

Chwasty wrażliwe	tasznik pospolity, stulicha psia, dymnica pospolita, bodziszek drobny, niezapominajka polna, mak polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,
------------------	---

	tobołki polne, przetacznik polny, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, fiołek polny, miotła zbożowa, skrytek polny, bodziszek porożcinany, bodziszek okrągłolistny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, maruna nadmorska bezwonna, rumianek bezpromieniowy, wiechlina roczna
--	--

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Truskawka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jesienią lub wczesną wiosną poza okresem wegetacji (BBCH 93-00), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści właściwych, (BBCH 10-12), na glebę wolną od chwastów.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem zastosowań wskazanych w dalszej części etykiety)

UWAGA:

1. Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
2. Środka nie stosować w stadium liścia flagowego.

Marchew

Maksymalna / zlecona dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować do 5 dni po siewie, przed wschodami (BBCH 01-05) na glebę wolną od chwastów.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 w dawce pojedynczej (lub 2 w systemie dawek dzielonych wskazanych w dalszej części etykiety).

UWAGA:

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

Groch jadalny zielony

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni (BBCH 00-01) na glebę wolną od chwastów.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

W przypadku stosowania środka w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, czereśni, śliwy, gruszy, pigwy, orzecha włoskiego, orzecha laskowego, tytoniu, porzeczki, agrestu, maliny, jeżyny i roślin ozdobnych o wysokości powyżej 50 cm:

po zastosowaniu tego środka, środki zawierające pendimetalinę można zastosować na tej samej powierzchni najwcześniej za 2 lata.

1. Środka Stomp Aqua 455 CS nie należy mieszać z glebą.
2. Po zastosowaniu środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS mogą wystąpić niewielkie przemijające uszkodzenia roślin, nie mające żadnego wpływu na ich plonowanie.

3. Strategia zarządzania odpornością

W celu uniknięcia wykształcenia się odporności chwastów środek Stomp Aqua 455 CS powinien być stosowany z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
- informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

4. Środka ochrony roślin nie stosować:

- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Uwagi:

Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, jeżyna, orzech włoski, orzech laskowy – 80 dni

koper włoski, seler korzeniowy, seler naciowy, kapusta głowiasta, kapusta włoska, jarmuż, rumianek, dziurawiec – 60 dni

Seler listkowy, kolendra na liście, koper ogrodowy na liście, kozieradka na liście – 50 dni

Pietruszka korzeniowa, pasternak, szczypiorek – 42 dni

Brokuł, kalafior – 35 dni

Pietruszka naciowa – 28 dni

Kalarepa – 21 dni

marchew (dawki dzielone) – 42 dni

Marchew (zastosowanie pojedyncze), cebula z siewu, cebula dymka, cebula z rozsady, truskawka, ogórek (na folii/włókninie), dynia (na folii/włókninie), groch jadalny zielony, bób, groch siewny (na nasiona), peluszka, soja, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, rabarbar, chrzan, kukurydza cukrowa, kapusta brukselska, kapusta pekińska, sałata, endywia, roszponka, kminek, słonecznik, koniczyna czerwona (plantacje nasienne), lucerna (plantacje nasienne), tytoń, kozłek lekarski, brzoskwinia, morela, wiśnia, czereśnia, śliwa, grusza, pigwa, szkółki drzew i krzewów, tulipan, narcyz, mискant – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Plantacje nasienne koniczyny czerwonej i lucerny - w sezonie, w którym wykonano zabieg nie przeznaczają roślin na paszę dla zwierząt.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następnie. Po bardzo krótkich uprawach sezonowych, takich jak warzywa, przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość 15-25 cm.

W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem jesienią, po wykonaniu orki na głębokość 15 – 25 cm i dobrym wymieszaniu gleby, wiosną można uprawiać pszenicę jary, jęczmień jary, ziemniak, rzepak jary, owies, pszenicę durum, kukurydzę, groch oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek.

W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem wiosną, uprawy takie jak kukurydza, fasola polna, groch, łubin, soja i słoneczniki mogą być ponownie wysiewane bezpośrednio

(na głębokość 3-5 cm) lub po wykonaniu orki na głębokość 15-25 cm i po okresie oczekiwania 2-8 tygodni.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać pod zamknięciem:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie pukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub stycznosci: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę.

Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety **Działanie na chwasty**, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem

Cebula uprawiana z siewu

Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po sadzeniu przy wysokości szczypioru 5-10 cm, od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12), na glebę wolną od chwastów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem zastosowań z wcześniejszej części etykiety)

Cebula uprawiana z dymki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po sadzeniu przy wysokości szczypioru 5-10 cm, od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w 5 -10 dni po sadzeniu, gdy rozsada w czasie sadzenia ma 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu czosnku, ale przed wschodami (BBCH 01-08) lub po wschodach czosnku przy wysokości roślin 5-10 cm (BBCH 11-12) na glebę wolną od chwastów.

Ząbki czosnku sadzić nie płycej niż na głębokość 5 cm.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Por uprawiany z siewu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie (nie później niż do 3 dni) (BBCH 00-01) lub po wschodach nie wcześniej niż od fazy 2 liści właściwych (BBCH 12), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Nasiona pora wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

Por uprawiany z rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować do 7 dni po posadzeniu rozsady (BBCH 12-13), na glebę wolną od chwastów.

Rozsada pora w czasie sadzenia powinna mieć nie mniej niż 2-3 liście.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew

System dawek dzielonych

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana głębokość siewu nasion marchwi to 3 cm.

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,85 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13), na glebę wolną od chwastów.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 2 do 5 tygodni.

UWAGA:

Łączna dawka w zabiegach dzielonych nie może przekroczyć 2,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 w systemie dawek dzielonych (lub 1 w dawce pojedynczej wskazanej we wcześniejszej części etykiety).

Pietruszka korzeniowa, pasternak

Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Lub

System dawek dzielonych

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.

Termin stosowania: bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,85 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13), na glebę wolną od chwastów:

Odstęp między zabiegami: co najmniej 2 do 5 tygodni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Łączna dawka w zabiegach dzielonych nie może przekroczyć 2,6 l/ha.

Seler korzeniowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady do fazy 3 liści właściwych (BBCH 13), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler naciowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady do fazy 3 liści właściwych (BBCH 13), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fenkuł (koper włoski) uprawiany z rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio przed sadzeniem lub do 10 dni po posadzeniu rozsady (BBCH 11-13), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rabarbar

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną, przed wznowieniem wegetacji, na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ogórek, dynia uprawiane na folii lub włókninie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w międzyrzędziach przed siewem lub sadzeniem rozsady na glebę wolną od chwastów pomiędzy ściółkowanymi pasami.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po posadzeniu (BBCH 00-01) w uprawie płaskiej, a w uprawie na redlinach do 2 tygodni po posadzeniu i uformowaniu redlin (BBCH 01-03), przed wschodami chrzanu.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kukurydza cukrowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, jarmuż uprawiane z rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem rozsady na uprawioną, wolną od chwastów, glebę lub po posadzeniu i przyjęciu się rozsady do fazy 6 liści właściwych (BBCH 16).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

- Nie stosować w uprawach pod osłonami (pod folią perforowaną czy włókniną).
- Stosować tylko po przyjęciu się rozsady.
- Stosowanie w temperaturze powyżej 25°C jak i na rośliny o niedostatecznie rozwiniętej warstwie woskowej na liściach (na przykład po długim okresie pochmurnej, deszczowej pogody) może spowodować uszkodzenie liści.

Kapusta głowiasta uprawiana z siewu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej w fazie od 2 do 6 liści właściwych (BBCH 12-16), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Nie stosować w uprawach pod osłonami (pod folią perforowaną czy włókniną).

Kalarepa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem rozsady na uprawioną, wolną od chwastów, glebę.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Nie stosować w uprawach pod osłonami (pod folią perforowaną czy włókniną).

Sałata, endywia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem rozsady na uprawioną, wolną od chwastów glebę.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bób

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Groch siewny uprawiany na suche nasiona, groch siewny pastewny uprawiany na suche nasiona (peluszka)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), lub powschodowo, gdy groch ma około 5 cm wysokości (BBCH 11-14).

Zalecana głębokość siewu 3 cm.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Soja

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana głębokość siewu 5 cm.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Przy dawce powyżej 1,5 l/ha w niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury i wysoka wilgotność) mogą wystąpić objawy uszkodzeń, takie jak przejściowe zahamowanie wzrostu czy przebarwienia liści. Może to mieć negatywny wpływ na wysokość plonu.

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, słonecznik zwyczajny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Zalecana głębokość siewu 3 cm.

Koniczyna czerwona, lucerna – plantacje nasienne

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 3 liścia właściwego (BBCH 13).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

W sezonie, w którym wykonano zabieg nie przeznaczать roślin na paszę dla zwierząt.

Tytoń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować 1-4 dni przed sadzeniem rozsady, na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Dziurawiec zwyczajny

Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny rozpoczną wegetację, a nowe przyrosty osiągną do 10 cm wysokości (do BBCH 23).

– Pierwszy rok uprawy – po posadzeniu rośliny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

– Kolejne lata uprawy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rumianek pospolity

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wschodach do fazy tworzenia rozety (BBCH 23).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kozłek lekarski (korzeń)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie 3-4 liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH 13-14) na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Koper ogrodowy

a) Uprawa na świeże liście i pędy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

b) Uprawa na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler listkowy, kolendra siewna (na liście), szczypiorek, roszponka, kminek zwyczajny, kozieradka pospolita (na liście)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brzoskwinia, morela, wiśnia, czereśnia, śliwa, grusza, pigwa

Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: w sadach ziarnkowych środek stosować do fazy BBCH 74 (średnica zawiązków do 40 mm- czerwcowy opad zawiązków), a w sadach pestkowych do fazy BBCH 73 (czerwcowy opad zawiązków), w pasach herbicydowych na glebę wolną od chwastów, stosując osłony na dysze.

Lub

Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania:

- brzoskwinia, morela, wiśnia, czereśnia, śliwa - środek stosować w okresie od fazy BBCH 91 (wzrost pędów zakończony, pąk wierzchołkowy ukształtowany, liście zielone) do fazy BBCH 97 (wszystkie liście opadły) w pasach herbicydowych na glebę wolną od chwastów, stosując osłony na dysze.
- grusza, pigwa - środek stosować po zbiorach owoców w pasach herbicydowych na glebę wolną od chwastów stosując osłony na dysze.

Lub

System dawek dzielonych

Termin stosowania: w sadach ziarnkowych środek stosować w okresie od fazy BBCH 57 (różowy pąk) do fazy BBCH 74 (średnica owocu do 40 mm), a w sadach pestkowych od fazy BBCH 57 (różowy lub

biały pąk), do fazy BBCH 73 (czerwcowy opad owoców) w pasach herbicydowych na glebę wolną od chwastów stosując osłony na dysze.

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 l/ha

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym brzoskwini, moreli, wiśni, czereśni, śliwy, gruszy i pigwy: 3.

UWAGA:

Środka nie stosować w roku sadzenia.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wczesną wiosną w stanie spoczynku roślin, w okresie bezlistnym, gdy pąki kwiatowe zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami (BBCH 00) na glebę wolną od chwastów opryskując całą plantację bądź tylko pasy herbicydowe stosując osłony na dysze.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Środka nie stosować w roku sadzenia.

Malina, jeżyna (plantacje produkcyjne i młode nasadzenia)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wczesną wiosną w stanie spoczynku roślin, w okresie bezlistnym, gdy pąki kwiatowe zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami (BBCH 00) na glebę wolną od chwastów opryskując całą plantację bądź tylko pasy herbicydowe stosując osłony na dysze.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Orzech włoski, orzech laskowy (plantacje produkcyjne i nasadzenia)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wczesną wiosną w stanie spoczynku roślin, w okresie bezlistnym (BBCH 00) na glebę wolną od chwastów w pasach herbicydowych na glebę wolną od chwastów stosując osłony na dysze.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

Środka nie stosować w roku sadzenia.

Szkółki drzew i krzewów (z wyjątkiem jednorocznych siewek roślin iglastych)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w okresie spoczynku od późnej jesieni do wiosny na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tulipan, narcyz

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować do fazy 3 liści tulipana i narcyza na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 100-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Miskant

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po sadzeniu roślin na glebę wolną od chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uzasadnienie

Środek ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS został dopuszczony do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-90/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. wydanym na rzecz spółki BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec.

W skład przedmiotowego środka ochrony roślin wchodzi substancja czynna pendimetalina dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i spełniająca warunki związane z jej użyciem określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁵ (dalej jako: rozporządzenie nr 540/2011). W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1114⁶ państwa członkowskie zostały zobowiązane do dokonania ponownej oceny środków ochrony roślin zawierających substancję czynną pendimetalina.

Ponowną ocenę należało wykonać zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr VI do dyrektywy 91/414/EWG i z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w kolumnie dotyczącej przepisów szczegółowych zawartych w załączniku nr I do niniejszego rozporządzenia. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie zostały zobligowane do określenia, czy środek ochrony roślin spełnia warunki ustanowione w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS zobowiązany był do przedstawienia dokumentacji o której mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009 w celu opracowania oceny tej dokumentacji w ramach przeglądu przedmiotowego zezwolenia pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ww. rozporządzenia.

Wymagana dokumentacja została przedłożona przez spółkę BASF SE, Republika Federalna Niemiec przy wniosku z dnia 24 listopada 2017 r. o odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS z uwzględnieniem wniosku o uznanie części danych jako badań kategorii 4 dla substancji czynnej. W trakcie postępowania administracyjnego w dniu 13

⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.06.2011, z późn. zm.)

⁶ ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pendimetalina jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. U.E. z 23.06.2017)

grudnia 2019 r. pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył dodatkowe informacje i dane (badania kategorii 4) dotyczące przedmiotowego środka.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia nr 1107/2009 wniosek o ponowną ocenę zezwolenia został złożony w państwach członkowskich, w których przedmiotowy środek jest wprowadzany do obrotu. Zgodnie z art. 35 wyżej wskazanego rozporządzenia wniosek był rozpatrywany przez zaproponowane przez wnioskodawcę państwo członkowskie – Królestwo Niderlandów. Właściwy urząd Królestwa Niderlandów dokonał oceny przedłożonej dokumentacji środka ochrony roślin i sporządził raport rejestracyjny, który następnie został udostępniony wszystkim państwom członkowskim należącym do Strefy B – Centrum, zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia nr 1107/2009. Urząd do spraw rejestracji środków ochrony roślin w Królestwie Niderlandów udostępnił wszystkim państwom członkowskim ostateczną wersję raportu rejestracyjnego z listopada 2024 r.

W powyższym raporcie potwierdzono, że w skład środka nie wchodzi składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Substancja czynna pendimentalina została zatwierdzona jako substancja kwalifikująca się do zastąpienia. Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, przed udzieleniem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję kwalifikującą się do zastąpienia, państwa członkowskie są zobligowane do wykonania oceny porównawczej takiego środka. Tym samym, niniejsza decyzja obejmuje wynik przeprowadzonej oceny porównawczej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia nr 1107/2009, w oparciu o m.in. informacje i dane złożone wraz z przedmiotowym wnioskiem.

Po uwzględnieniu ocen i raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy urząd Królestwa Niderlandów, a także komentarzy do wykonanej oceny sporządzonej przez podmiot upoważniony – Merit Mark Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze stycznia 2025 r. potwierdzono wypełnienie kryteriów, determinujących odnowienie zezwolenia na wprowadzanie środka do obrotu, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Biorąc pod uwagę powyższe, zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS zostało zmienione w zakresie wypełnienia wymagań określonych w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Ponadto w związku z korektą wniosku z dnia 29 lipca 2025 r., w której pełnomocnik spółki BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec oraz spółki BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Oddział Freienbach Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon Sz, Konfederacja Szwajcarska zawnioskował o przeniesienie uprawnień i obowiązków wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin Stomp Aqua 455 CS do obrotu na spółkę BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Oddział Freienbach Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon Sz, Konfederacja Szwajcarska, dokonano wnioskowanej zmiany, zgodnie z sentencją decyzji w akapicie „DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN”.

Pismem z dnia 19 września 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce BASF Agro B.V., Konfederacja Szwajcarska w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)⁷, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 23 września 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wniósł uwag do postępowania.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w rozporządzeniu nr 540/2011, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 15 stycznia 2028 r.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

⁷ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin.. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁸.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁹ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

⁸ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

⁹ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia e-PUAP)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych