

Każda nietypowa, oporna na leczenie lub nawracająca jednostka chorobowa powinna skłonić do zlecenia badania w kierunku HIV.



Wczesne rozpoznanie HIV i szybkie wdrożenie terapii antyretrowirusowej (ARV) u osoby zakażonej, pozwala uchronić ją przed zachorowaniem na AIDS, a jej partnerów seksualnych – przed zakażeniem.

Od maja 2025 roku lekarze POZ
mogą zlecać testy przesiewowe w kierunku HIV
w ramach świadczeń gwarantowanych,
finansowanych z budżetu powierzonego.

Więcej informacji w Kompendium wiedzy dla lekarzy POZ:
<https://www.hiv-aids.edu.pl/kompendium-wiedzy>



DIAGNOSTYKA HIV W WYBRANYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH

CHOROBY WIEWNETRZNE

- gorączka o niejasnej etiologii
- utrata masy ciała o niejasnej etiologii
- trawiczojelitowa / lub trawiczojelitowa o niejasnej etiologii
- drógcięża przebiegająca z bólem
- przewlekła biegunka
- cięższe jelit o niejasnej etiologii
- nawracające infekcyjne zapalenie płuc
- krótkotrwałe zapalenie płuc
- limfadenopatie
- zespół wyniszczenia niejasnego pochodzenia
- zakażenia gronkowymi drożdżakowymi
- zespół mononukleozopodobny

CHOROBY ZAKAŹNE

- pólipneumonia z wtórną etiologią
- zakażenia hemolityczne
- modyfikacja układu odpornościowego, pokarmowego
- zespół mniemanej koagulopatii
- przewlekła biegunka
- nawracające zapalenie płuc
- leukopenia, monocytopenia
- hipotoksyczne zapalenie opon
- niedobór immunoglobulin
- częste zapalenie opon
- niedobór czynników
- guzów, inne ekspozycje
- wirusowe zapalenie wątroby: HBV, HCV, HAV
- zakażenia promieniowa dróg pokarmowych
- inne choroby z objawami
- zakażeń układu oddechowego
- COVID-19

DERMATOLOGIA

- [illegible]

GINEKOLOGIA

- cięta = kobieta i jej partner. W roku braku badania w III trymestrze test należy zaoferować po porodzie, a jeśli kobieta nie wyraża zgody, należy zaprzeczyć badanie noworodka
- noworodki śródciężne po ciąży
- niekierującą promieniową drógą piersiową
- lewoszyjny i śródwoszyjny rak szyjki macicy
- dysplazja szyjki macicy = 2 stopnie
- pakietoncie = P4

LARYNGOLOGIA

- zapalenie błon śluzowych i błon łącznych
- nowotwory chłonnej głowy i szyi
- gryzłak jamy ustnej, przełyka lub krtani
- limfadenopatia złośliwego pochodzenia
- zakażenia przenoszone drogą płciową
- zespół mononukleozopodobny

NEFROLOGIA / UROLOGIA

- nefropatie kłębuskowe
- zakażenia przeniesione drogą płciową
- brodawczak pęcherza moczowego
- nasienie (seminal)

NEUROLOGIA

- najczęstsze
- toksoplazmoza mózga
- neurocystozeria o niejasnej etiologii
- PMJ
- krętkowate zapalenie opon
- indolowe włazińców
- postępujące zapalenie
- chłoniak pierwotny mózga
- zespół Guillain-Barre
- postizemne zapalenie rdzenia kręgowego
- polioencefalopatia
- septyczne zapalenie opon
- indolowe włazińców

OKULISTYKA

- zapalenie błony śluzowej i siateczki (CHF, HSV, cytomegalowirus, Trak)
 - wirusowe zapalenie płuc, pęcherzyki
 - półpasiec nowotworowy
 - zakrzepica przewlekła dróg płucnych
- ONKOLOGIA / HEMATOLOGIA**
- choroby nowotworowe
 - nadciśnienie nadobrotowe odczyn / trypi naczy
 - rak płu
 - melanom (zamienniki)
 - stwardnia złośliwa
 - choroby Castlemana
 - limfocytosis niejasnego pochodzenia
 - mielodysplazja, leukopenia, leukocytosis

100

- 

Ministerstwo
Zdrowia

PEDIATRIA / NEONATOLOGIA


- [illegible]

PULMONOLOGY

- mykobakterie płucne lub rozlane
- nawracające bakteryjne zapalenie płuc
- śródmiąższowe zapalenie płuc
- zapalenie płuc o niejasnej etiologii
- cięśnięta schyłkowa (faza osłabienia)
- aspergiloza
- COVID-19

STOMATOLOGIA

- rurecaccia dżdżownica (jamy ustne)
i języczki
- smilany diplosylaryczne brzozy (kierwe)
(jamy ustne)
- zaskakierle HPI
- oporyczkowe zapalenie (jamy ustne)
(zawracajca)
- zaskakierle przeniesione drogą pokarmową
- chłoniak Burkitta
- rureczka Kaposiego
- leszczynki włochate

[illegible][aids.gov.pl](http://aids.gov/pl)