



**Państwowy Instytut
Medyczny MSWiA**
w Warszawie

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA prowadzi całodobowy dyżur leczenia pacjentów ze wstrząsem kardiogenym. Prosimy o najszybsze zgłaszanie pacjentów ze wstrząsem o różnej etiologii celem kwalifikacji do leczenia w naszym zespole Shock Team.

Zajmujemy się pacjentami we wstrząsie kardiogenym o różnej etiologii, w tym w przebiegu:

- OZW, w tym mechaniczne powikłanie OZW
- zapalenie mięśnia serca
- zdekompensowana przewlekła niewydolność serca
- zdekompensowana przewlekła wada zastawkowa
- ostra zatorowość płucna
- ostra wada zastawkowa
- kardiomiopatia połogowa
- ostra niewydolność serca de novo z innych przyczyn

**Całodobowym kontaktem dla Państwa jest lekarz konsultujący Pracowni
Kardioangiografii Kliniki Kardiologii PIM MSWiA – tel. +48 885 670 031 lub
+48 47 722 1103**

**Przeciwwskazania do przekazania pacjenta, w tym przeciwwskazania do rozpoczęcia lub
eskalacji mechanicznego wspomagania krążenia**

Bezwzględne

Brak zgody chorego na mechaniczne wspomaganie krążenia w przypadku pacjenta przytomnego

Stan po nagłym zatrzymaniu krążenia z podejrzeniem anoksemicznego uszkodzenie mózgu (punktacja w Skali Glasgow < 8)

Niekontrolowane, hemodynamicznie istotne krwawienie

Nieodwracalna niewydolność wielonarządowa (mleczany we krwi tętniczej >16 mmol/l)



Schyłkowe stadium chorób przewlekłych innych niż niewydolności serca, w tym:

- Zaawansowana przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca mechanicznego wsparcia oddechu lub przewlekła tlenoterapia domowa
- Potwierdzona choroba nowotworowa o złym 1-rocznym rokowaniu
- Zaawansowana patologia ośrodkowego układu nerwowego o jednoznacznie złym rokowaniu - aktywne krwawienie śródczaszkowe i/lub rozległe niedokrwienie OUN
- Zaawansowana i utrwalona zła sprawność neurologiczna (CPC>2)
- Utrwalona zależność od pomocy w wykonywaniu codziennych czynności sprzed zachorowania (Kliniczna Skala Kruchości>4)

Brak dostępow naczyniowych

Dotyczy pompy Impella:

- Skrzeplina w lewej komorze serca
- Mechaniczna zastawka w pozycji aortalnej

Względne

Przeciwwskazania do systemowej antykoagulacji

Brak zgody chorego na leczenie preparatami krwi

UWAGA!

Wiek pacjent nie wpływa na włączenie do programu. Sugerujemy, aby przekazanie ze SPOKE i/lub eskalację do mechanicznego wspomagania krążenia rozważyć u pacjentów poniżej 65 roku życia lub starszych bez istotnej współchorobowości