

STAN OCHRONY GŁOWACZA BIAŁOPŁETWEGO *COTTUS GOBIO* W OBSZARZE OSTOJA JAŚLISKA PLH180014

Obszar	OSTOJA JAŚLISKA	
Nazwa gatunku	Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	
Autor	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak	
Stan wiedzy o gatunku w obszarze	Od wielu lat badania ichtiofauny omawianego obszaru prowadzi zespół Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego. Informacje na temat występowania gatunku w przeszłości są nieliczne.	
Rozmieszczenie gatunku w obszarze	Brak aktualnych stanowisk występowania gatunku	
Wielkość populacji w obszarze	Brak gatunku w obszarze	
Siedlisko gatunku	Siedlisko – żwirowo- kamieniste odcinki potoków z czystą, dobrze natlenioną wodą.	
Szacunkowa powierzchnia siedliska gatunku	-	
Czy stan wiedzy o gatunku w obszarze jest wystarczający ?	Nie	
Najważniejsze źródła informacji	Dane zebrane w 2019 roku przez Krzysztofa Kukułę i Anetę Bylak (Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego)	
Wymagane inwentaryzacje lub prace badawcze	Zinwentaryzowanie typowych siedlisk gatunku w obszarze, przede wszystkim w Jasiołce i Wiśłoku.	
Zmiany w rozmieszczeniu, liczebności, ew. w strukturze populacji	Gatunek aktualnie nie występuje w Ostoi.	
Zmiany jakościowo-ilościowe w siedliskach gatunku.	Głowacz białopłetwy prawdopodobnie wyginął w Ostoi, co najmniej dziesięć lat temu (przed rokiem 2010). Większość potencjalnych siedlisk (odcinki z kamienisto-żwirowym dnem i szybkim pędem wody) jest częściowo zdegradowana przez dopływ zanieczyszczeń komunalnych i zmiany w korytach cieków. Niewykluczone, ale mało prawdopodobne, że w obszarze znajdują się jeszcze pojedyncze siedliska z głowaczem białopłetwym.	
Negatywne oddziaływania i zagrożenia	Najsilniej negatywnie na gatunek wpływają zanieczyszczenia wody, głównie komunalne. Istotny wpływ ma także brak drożności systemu zlewni Wiśłoki i Wiśłoka. Progi i zapory istniejące w dolnym biegu Jasiołki uniemożliwiały rekolonizację środkowego i górnego biegu przez ryby z populacji w Wiśloce i dolnej Jasiołce. Jest nadzieja, że po udrożnieniu w ostatnim okresie głównych cieków zlewni Wiśłoki m.in. głowacz białopłetwy pojawi się w Ostoi. Potencjalnym zagrożeniem jest budowa zbiornika zaporowego na Jasiołce powyżej Dukli. W przypadku rzeki Wiśłok, mimo istnienia siedlisk przydatnych dla głowacza białopłetwego, zaporą w Besku wyklucza możliwość dotarcia tego gatunku do górnego biegu Wiśłoka.	
Aktualny stan zachowania gatunku w obszarze	Ocena	Komentarz
	brak gatunku w Ostoi	gatunek w zaniku w wielu innych zlewniach

