

Karta obserwacji gatunku na stanowisku	
Kod i nazwa gatunku	KOD 1163, GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY COTTUS GOBIO
Nazwa stanowiska	Stanowisko 1 - Jasiołka – Wola Wyżna
Typ stanowiska	Badawcze
Obszary chronione, na których znajduje się stanowisko	Natura 2000 „Ostoja Jaślicka”
Współrzędne geograficzne	N 49.40024587; E 21.87183611
Wysokość n.p.m.	512
Opis stanowiska	ok. 1200 m poniżej budynków w Woli Wyżnej
Charakterystyka siedliska gatunku na stanowisku	Charakter cieku: potok fliszowy Średnia szerokość czynnego koryta: 5 m Średnia głębokość wody – 0,15 m; max – 0,5 m Gruby rumosz drzewny – średnio liczny Otoczenie stanowiska – pas drzew i krzewów, łąki, nieużytki
Informacje o gatunku na stanowisku	brak gatunku na stanowisku
Czy monitoring w kolejnych latach jest wymagany?	tak
Obserwator	Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Daty obserwacji	Daty wszystkich obserwacji – 16.08.2019

Stan ochrony gatunku na stanowisku					
Parametr	Wskaźniki		Wartość wskaźnika i komentarz słowny		Ocena
Populacja	Względna liczebność		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Struktura wiekowa		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
	Udział gatunku w ichtiofaunie		gatunku na stanowisku nie stwierdzono		U2
Siedlisko	Jakość hydromorfologiczna		1,0		FV
		Ciągłość cieku	zachowana		FV
		Charakter i modyfikacja brzegów	brzegi naturalne		FV
		Charakterystyka przepływu	przepływ naturalny		FV
		Geometria koryta	koryto naturalne		FV
		Mobilność koryta	możliwa naturalna migracja koryta		FV
		Substrat denny	substrat w 100% naturalny		FV
	Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk		ilość niezbędnych siedlisk ograniczona		U2
Perspektywy zachowania: Na tym odcinku znajdują się siedliska odpowiednie dla pokrewnego głowacza pręgopłetwego.					U2
Ocena ogólna					U2

<b>Aktualne oddziaływania</b>				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
420	Odpady, ścieki	B	-	Możliwy dopływ ścieków z gospodarstwa rolnego powyżej.
403	Zabudowa rozproszona	C	-	Niekontrolowane źródła ścieków i śmieci.

<b>Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)</b>				
Kod	Nazwa działalności	Intensywność	Wpływ	Syntetyczny opis
870	Tamy, wały	A	-	Plany przegrodzenia Jasiołki zaporą w Dukli stanowią największe zagrożenie dla ichtiofauny Jasiołki. Zagrożone byłyby wszystkie gatunki reofilne i jednocześnie Jasiołka przestałaby być drogą migracji ryb dwuśrodowiskowych. Powstałyby siedliska dla gatunków obcych i oportunistycznych.
420	Odpady, ścieki	B	-	Możliwe wzrosty ilości ścieków z gospodarstw domowych.
421	Odpady z gospodarstw domowych	B	-	Wzrost ilości śmieci i odpadów z gospodarstw domowych.
952	Eutrofizacja	B	-	Wzrost ilości glonów na powierzchni dna. Obniżenie jakości siedliska dla bezkręgowców wodnych i ryb.

<b>Inne informacje</b>	
<b>Inne wartości przyrodnicze</b>	Dobrze zachowany zespół gatunków reofilnych małego potoku fliszowego, z dość liczną populacją głowacza pręgopłetwego i pstrąga potokowego. Dodatkowo górna Jasiołka, po udrożnieniu głównego koryta Wisłoki i dolnej Jasiołki, będzie istotnym elementem w restytucji łososa atlantyckiego i troci wędrownej.
<b>Gatunki obce i inwazyjne</b>	Nie stwierdzono.
<b>Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna</b>	w załączeniu