



Znak sprawy:DHR.rs2.8207.25.2024.Maganic.2025.(09)

DECYZJA nr R- 642/2025d

Na podstawie art. 45 i w związku z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o *środkach ochrony roślin*² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2024 r. oraz wniosku z dnia 18 lutego 2025 r. i wniosku z dnia 30 lipca 2025 r., złożonych przez spółkę ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 55/2024 z dnia 28 marca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Maganic** w następujący sposób:

1. W sentencji zezwolenia akapit **DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN** otrzymuje brzmienie następujące brzmienie -

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Posiadacz zezwolenia:	ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Producent środka ochrony roślin:	ADAMA Makhteshim Ltd. P.O. Box 60, Beer Sheva, 8410001, Państwo Izrael

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywę Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

Rodzaj środka ochrony roślin:	Fungicyd
Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	Użytkownicy profesjonalni
Substancje czynne:	a) difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,47%) b) protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 175 g/l (16,06%)
Inne substancje stwarzające zagrożenie, nie będące substancją czynną:	n-(n-oktylo)-2-pirolidynon; etoksylowane rozgałęzione C11-14, C13 wzbogacone alkohole
Okres ważności środka ochrony roślin	3 lata

2. Poniżej wskazane załączniki do przedmiotowego zezwolenia:

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowanie środka ochrony roślin,

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin,

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania,

Załącznik nr 4 - Okresy karencji i Następstwo roślin,

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych,

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego,

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin;

otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 2. Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B:
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 3. Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2:
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
 4. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1:
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- 21,1% mieszaniny stanowią substancje o nieznannej toksyczności ostrej skórnej.
32,1% mieszaniny stanowią substancje o nieznannej toksyczności ostrej inhalacyjnej.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314, H317, H351, H410

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P260 - Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

P410 - Chronić przed światłem słonecznym.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne difenokonazol oraz protiokonazol zaliczone są do grupy 3 (fungicydy SBI I - DMI).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenvica ozima

septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języzek (ligula) ostatniego liścia) do fazy końca kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 39-69).

Liczba zabiegów: 1

fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo, od fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) do fazy końca kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej przed fuzariozą kłosów.

Jęczmień ozimy

rynychosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (ligula) ostatniego liścia) do fazy zakończenia kłoszenia (kłos jest całkowicie widoczny) (BBCH 39-59).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Środek w dawce 0,8 l/ha wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie jęczmienia ozimego przed rynychosporiozą zbóż.

Jęczmień jary

rynychosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (ligula) ostatniego liścia) do fazy zakończenia kłoszenia (kłos jest całkowicie widoczny) (BBCH 39-59).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Środek w dawce 0,8 l/ha wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie jęczmienia jarego przed rynychosporiozą zbóż.

Pszenżyto ozime

septoriozy liści, rdza brunatna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (liguła) ostatniego liścia) do fazy końca kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 39-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować jesienią, zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liści do fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych.

Burak cukrowy

chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby), do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie buraka cukrowego przed chwościkiem buraka, mączniakiem prawdziwym i rdzą buraka.

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek w ochronie zbóż w dawce 0,8 l/ha zaleca się stosować wyłącznie w warunkach niższej presji chorobotwórczej.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera dwie substancje czynne: difenokonazol oraz protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI I - DMI, wg klasyfikacji FRAC grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m. in.:

- stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
- niestosowanie środka w dawkach innych niż są zalecane,
- włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne lub w mieszaninie zbiornikowej),
- celem zmniejszenia presji chorobotwórczej, należy również stosować inne niż chemiczne metody ochrony, zgodne z zaleceniami integrowanej ochrony roślin uprawnych np. uprawa odmian odpornych lub o mniejszej podatności, przestrzeganie zasad zmianowania i właściwej agrotechniki.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Zboża, rzepak ozimy – niewymagany,

burak cukrowy - 40 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka, na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

burak pastewny - 40 dni.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Maganic można sadzić lub siać rośliny następne po upływie co najmniej 30 dni od ostatniego zastosowania środka.

Załącznik nr 5 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne, odzież roboczą oraz odpowiednie obuwie podczas wykonywania prac polowych na obszarze po zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Uprawy zbóż ozimych i jarych, buraka cukrowego, buraka pastewnego:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Uprawa rzepaku ozimego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare

rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny jęczyzek (liguła) ostatniego liścia) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 39-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara twarda, pszenica ozima twarda

septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny jęczyzek (liguła) ostatniego liścia) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 39-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo, od fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) do fazy końca kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak pastewny

chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby), do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2024 r. spółka ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wystąpiła o zmianę zezwolenia MRiRW nr R- 55/2024 z dnia 28 marca 2024 r. na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Maganic, która polegała na dodaniu zalecenia stosowania środka w ochronie buraka cukrowego i buraka pastewnego oraz zmiany okresu ważności środka z dwóch do trzech lat.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia nr 1107/2009 wniosek został złożony w państwach członkowskich, w których środek jest wprowadzany do obrotu. Zgodnie z art. 35 wyżej wskazanego rozporządzenia wniosek był rozpatrywany przez zaproponowane przez wnioskodawcę państwo członkowskie – Republikę Czeską. Właściwy urząd Republiki Czeskiej dokonał oceny przedłożonej dokumentacji środka ochrony roślin i sporządził raport rejestracyjny, który następnie został udostępniony wszystkim państwom członkowskim należącym do Strefy B – Centrum, zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia nr 1107/2009. Właściwy urząd do spraw rejestracji środków ochrony roślin Republiki Czeskiej w dniu 28 lutego 2025 r. wydał decyzję zmieniającą zezwolenie na wprowadzanie przedmiotowego środka ochrony roślin do obrotu i udostępnił wszystkim państwom członkowskim ostateczną wersję raportu rejestracyjnego z lutego 2025 r.

Po uwzględnieniu ocen i powyższego raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy urząd Republiki Czeskiej i komentarzy do raportu sporządzonych przez. podmiot upoważniony – spółkę E-V-A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzono wypełnienie kryteriów, determinujących zmianę zezwolenia na wprowadzanie przedmiotowego środka do obrotu, o których mowa w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

Przy czym ze względu na brak przedłożonych badań skuteczności lub ich niedostateczną liczbę nie uwzględniono rozszerzenia zakresu stosowania przedmiotowego środka w buraku cukrowym w ochronie przed brunatną plamistością liści (ramulariozą).

Ponadto, w zezwoleniu dokonano zmian porządkowych poprzez dodanie do akapitu DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN wiersza „Inne substancje stwarzające zagrożenie, nie będące substancją czynną”. Poza tym w załączniku do zezwolenia nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN doprecyzowano zapis dotyczący kategorii zagrożenia dla zwrotu H317, zapis zwrotu wskazującego środki ostrożności

P353 oraz dodano informację, że 21,1% mieszaniny stanowią substancje o nieznannej toksyczności skórnej oraz 32,1% mieszaniny stanowią substancje o nieznannej toksyczności inhalacyjnej.

Dodatkowo wnioskiem z dnia 30 lipca 2025 r. złożonym zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka ADAMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła o uwzględnienie w zezwoleniu zastosowania środka w ochronie buraka pastewnego przed chwościkiem buraka, mączniakiem prawdziwym buraka i rdzą buraka. Biorąc powyższe pod uwagę środek może być stosowany w rozszerzonym zakresie w tej uprawie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Ponadto zezwolenie MRiRW nr R- 55/2024 z dnia 28 marca 2024 r. na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Maganic wydano z następującym obwarowaniem: "Jednocześnie posiadacz w celu zezwolenia dopełnienia zasad ekstrapolacji jest zobligowany do przedłożenia wyników badań skuteczności przedmiotowego środka w ochronie: pszenżyta ozimego przed rdzą żółtą zbóż i traw, jęczmienia ozimego przed rdzą jęczmienia oraz jęczmienia jarego przed rynchosporiozą zbóż, plamistością siatkową jęczmienia i rdzą jęczmienia wraz z projektem uzupełnienia do raportu rejestracyjnego w tym zakresie w terminie 20 mc-y od daty wydania niniejszego zezwolenia oraz uzyskania pozytywnej oceny przedłożonych danych. Dla każdego z wymienionych zastosowań (roślina uprawna – jednostka chorobowa) należy przedłożyć minimum po jednym badaniu skuteczności wykonanym w Polsce lub w innych krajach strefy pn.-wsch. EPPO. Brak przedłożenia powyższych danych lub uzyskania pozytywnej ich oceny może skutkować zmianą warunków niniejszego zezwolenia."

W związku z powyższym, spółka ADAMA Polska Sp. z o.o., przy wniosku z dnia 28 marca 2025 r., przedłożyła dodatkowe wyniki badań oraz projekt raportu rejestracyjnego wraz zaktualizowanym projektem etykiety przedmiotowego środka.

Zgodnie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się pismem z dnia 31 marca 2025 r. do podmiotu upoważnionego – spółki E-V-A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ocenę dokumentacji dołączonej do pisma z dnia 28 marca 2025 r. oraz o potwierdzenie skuteczności przedmiotowego środka.

Podmiot upoważniony – spółka E-V-A Sp. z o.o. sporządził ocenę przedłożonej dokumentacji przedmiotowego środka w formie raportu rejestracyjnego z kwietnia 2025 r. (uzupełnienie oceny na poziomie krajowym – National Addendum).

Analiza ocen zamieszczonych w tym raporcie wskazuje, że posiadacz zezwolenia tylko częściowo wypełnił warunek z zezwolenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-55/2024 z dnia 28 marca 2024 r., przedstawiając wyłącznie badania skuteczności środka w ochronie jęczmienia jarego przed rynchosporiozą zbóż oraz plamistością siatkową jęczmienia, które zostały pozytywnie ocenione przez podmiot upoważniony. W związku z tym niezbędna stała się korekta zaleceń stosowania środka przedstawionych w załączniku nr 2 ww. zezwolenia, polegająca na usunięciu zaleceń stosowania środka w ochronie: pszenżyta ozimego przed rdzą żółta zbóż i traw oraz jęczmienia jarego i jęczmienia ozimego przed rdzą jęczmienia.

Należy zaznaczyć, iż dołączony do wniosku z dnia 18 lutego 2025 r. projekt etykiety środka Maganic uwzględniał zmiany przedstawione powyżej.

Zawiadomieniem z dnia 16 czerwca 2025 r. wnioskodawca został powiadomiony o konieczności wszczęcia postępowania w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 55/2024 z dnia 28 marca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu przedmiotowego środka, która ma polegać na usunięciu zastosowań środka zaleceń stosowania środka w ochronie: pszenżyta ozimego przed rdzą żółtą zbóż i traw oraz jęczmienia jarego i jęczmienia ozimego przed rdzą jęczmienia. Zawiadomienie zostało prawidłowo doręczone w dniu 18 czerwca 2025 r. Strona została w nim poinformowana o prawie do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz pisemnego wypowiedzenia się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa, do pisemnego wypowiedzenia się przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Tym samym urząd stwierdza, że warunek zapisany w ww. zezwoleniu, dotyczący badań skuteczności został spełniony w zakresie zastosowania środka w jęczmieniu jarym w ochronie przed rynchosporiozą zbóż oraz plamistością siatkową jęczmienia. Natomiast zalecenia stosowania środka w ochronie pszenżyta ozimego przed rdzą żółtą zbóż i traw oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed rdzą jęczmienia zostały usunięte z zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 55/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Pismem z dnia 28 lipca 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki Adama Polska Sp. z o.o. w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu

postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 30 lipca 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwag, które zostały zaakceptowane.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.)

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935 t.j.)

Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony
Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje -
(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
([zezwolenia.sor@piorin.gov.pl](mailto:zezwozenia.sor@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych