

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY.
DZIAŁ LABORATORYJNY.
ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ.

Wyciąg z załącznika nr 7 do PL-02/IR-01/LEP wydanie 4 załącznika z dnia 2020-01-27

2.1. Pobieranie i transport próbek kału w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego, *Giardia intestinalis*, *Cryptosporidium* spp.

Kał należy oddać do czystego naczynia. Próbkę należy pobierać za pomocą łopatki dołączonej do pojemnika transportowego. Należy wypełnić próbką połowę pojemnika na kał, zarówno w przypadku stolców o konsystencji stałej i płynnej.

Kał należy pobierać z trzech różnych miejsc wypróżnienia. Należy pobrać widoczną krew, śluz lub ropę, jeśli są w kale.

Badanie kału w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego należy wykonać trzykrotnie w odstępach min 3-5 dni. Badanie kału w kierunku *Giardia intestinalis* i *Cryptosporidium* spp. wykonuje się jednorazowo.

Po pobraniu próbkę należy dostarczyć do PPPiWW możliwie jak najszybciej. W razie braku takiej możliwości przechowywać w temp. 2-8°C lecz nie dłużej niż 24 h. Próbki kału w kierunku wykrywania pasożytów tropikalnych należy dostarczyć do PPPiWW w czasie nie przekraczającym 1 h od pobrania w temperaturze pokojowej.