

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr **R - 857/2020d z dnia 25.11.2020 r.**
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 194/2016 z dnia 08.09.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Agropak sp.j. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel./fax: 32 61 56 330,
e-mail: agropak@agropak.pl

TREOL 770 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

olej parafinowy – 770 g/l (89,6%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 194/2016 z dnia 08.09.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 857/2020d z dnia 25.11.2020 r.



Uwaga

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Treol 770 EC jest insektycydem i akarocydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Na roślinie działa powierzchniowo.

Na szkodniki działa kontaktowo, w sposób mechaniczny: środek tworzy na powierzchni ciała szkodnika szczelny film blokując procesy oddychania (wymiany gazowej).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania za pomocą opryskiwacza ręcznego (w tym opryskiwacza plecakowego z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym).

Jabłoń

Przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja)

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną w fazie pęknięcia pąków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 7,5-10 l/100m².

Śliwa

Misecznik śliwowy

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (0,175 l środka w 10 l wody)

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 7,5-10 l/100m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem zastosowania środka wymienionego w dalszej części etykiety).

Świerk

Przędziorek sosnowiec (stadia zimujące – jaja)

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 10-12 l/100m².

Cis

Misecznik cisowiec (stadia zimujące – larwy)

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 10-12 l/100m².

Modrzew

Ochojnik świerkowo-modrzewiowy (stadia zimujące – larwy)

Termin stosowania: środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 10-12 l/100m².

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik***

Grusza

Przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja), mszyce

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną w fazie pęknięcia pąków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty (BBCH 53).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 7,5-10 l/100m².

Śliwa

Przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja), mszyce

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną, na krótko przed rozpoczęciem wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych, w fazie zielonego pąka (BBCH 53-55).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 7,5-10 l/100m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem zastosowania środka wymienionego we wcześniejszej części etykiety).

Brzoskwinia, czereśnia, morela, wiśnia

Przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja), mszyce

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną, na krótko przed rozpoczęciem wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych w fazie zielonego pąka (BBCH 53-55).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 7,5-10 l/100m².

Agrest, aronia, borówka wysoka, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl

Misecznik śliwowy (stadia zimujące – larwy)

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną, na początku okresu wegetacji, w fazie pęknięcia pąków (BBCH 07-08).

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (0,175 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 5,0-7,5 l/100m².

Leszczyna

Misecznik śliwowy (stadia zimujące – larwy)

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną, na początku okresu wegetacji, w fazie pęknięcia pąków.

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (0,175 l środka w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 5,0-7,5 l/100m².

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać mechanicznie, np. poprzez intensywne wstrząsanie zbiornikiem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń, śliwa, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, morela, agrest, aronia, borówka wysoka, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, leszczyna - nie dotyczy.

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 0°C.

Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa spływała z pni i gałęzi.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Stosowanie środka na odmiany świerka o niebieskim zabarwieniu igieł może spowodować utratę lub spadek intensywności niebieskiej barwy (igły przybierają kolor zielony).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera środki powierzchniowo czynne; w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -