



Badanie mikrobiologiczne płwociny Instrukcja samodzielnego pobrania płwociny przez pacjenta

Pracownia Bakteriologii CDL PIM MSWiA

Pobieranie płwociny - instrukcja dla pacjenta

Płwocina jest najłatwiejszym do pobrania materiałem z dolnych dróg oddechowych. Uzyskanie wartościowego materiału diagnostycznego wymaga jednak spełnienia kilku warunków, mających na celu ograniczenie do minimum, praktycznie nieuniknionego, zanieczyszczenia pobieranej płwociny fizjologiczną florą jamy ustnej.

1. Pamiętajmy o tym, że do badania pobieramy płwocinę, a nie ślinę.
2. Najbardziej wartościowa pod względem bakteriologicznym jest płwocina poranna, najdłużej zalegająca w drogach oddechowych.
3. W momencie pobierania płwociny pacjent powinien być na czczo.
4. Przed odkrztuszeniem płwociny koniecznie wyjąć ewentualną protezę.
5. Dokładnie wypłukać jamę ustną przegotowaną wodą.
6. Odkrztuszoną płwocinę wypłuć do sterylnego pojemnika transportowego.
7. Pojemnik dokładnie zamknąć, opisać i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, razem ze skierowaniem.