



Znak sprawy: DHR.rs1.8207.1.11.2023

POSTANOWIENIE nr 77/2026

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) (dalej: k.p.a.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j. z późn. zm.), **postanawiam** z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 194/2026d z dnia 3 marca 2026 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Polyversum WP** produkcji BIOPREPARATY, spol. s r.o., Tylišovská 772/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Republika Czeska, w następujący sposób:

- 1) **Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN (użytkownik profesjonalny)** do ww. decyzji, otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Truskawka

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 4 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 - 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Kapusta głowiasta czerwona

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Seler korzeniowy

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń, zgnilizna twardzikowa*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu korzeni do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Metodę stosować do przechowywania selerów oczyszczonych.

Bób

Choroby przechowalnicze: *askochytoza, czekoladowa plamistość*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu nasion do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Porzeczka czerwona

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 - 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Malina (niezależnie od rodzaju odmiany i terminu zbioru owoców).

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 4 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Grusza

choroby przechowalnicze: *szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5°C.

Zalecana ilość wody: 4 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Śliwa

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 - 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Brzoskwinia

Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m³ komory przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5°C.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzącym na 500 m³ komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 – 10.

PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej: 15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w ilości 50 ml na 1 l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Zabieg wykonywać może wyłącznie użytkownik profesjonalny, który ukończył szkolenie w zakresie stosowania środków metodą fumigacji.

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powietrza pomiędzy rzędami.

Pelargonja (uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g środka w 10 l wody).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Sposób stosowania: podlewanie roślin w ilości 100 ml cieczy użytkowej na 1 roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5

Maksymalna całkowita dawka na uprawę w sezonie wegetacyjnym nie może przekroczyć 25 kg/ha.

Poinsecja (uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g środka w 10 l wody).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Sposób stosowania: podlewanie roślin w ilości 100 ml cieczy użytkowej na 1 roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5

Maksymalna całkowita dawka na uprawę w sezonie wegetacyjnym nie może przekroczyć 25 kg/ha.

Papryka (w uprawie w polu)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy pierwsze owoce papryki osiągną 5 – 6 cm.

Liczba zabiegów: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Fasola szparagowa (w uprawie w polu)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku kwitnienia do fazy, gdy 30% strąków osiągnie typową długość (BBCH 61-73).

Liczba zabiegów: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Pietruszka korzeniowa

ordzawienie korzeni (parch zwykły, fuzarioza), choroby przechowalnicze

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 – 0,2 kg/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać, gdy główka korzenia ma 6 – 7 mm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 kg/ha

Drugi zabieg wykonać, gdy główka korzenia ma 1,5 cm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha

Trzeci zabieg wykonać po upływie 21 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie sprzyjających porażeniu. Zabieg należy wykonać na ok. 14 dni przed zbiorem w celu wybielenia korzeni i poprawy ich zdrowotności w trakcie przechowywania.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Liczba zabiegów: 4

Zabiegi wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kapusta pekińska

choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kapusta głowiasta biała

choroby przechowalnicze: *szara pleśń*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Ogórek (w uprawie w polu)

zgorzel siewek, mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać w fazie rozwiniętych 2–3 liści właściwych na pędzie głównym ogórka (BBCH 12-13).

Drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem ogórka (przed fazą BBCH 61).

Trzeci zabieg wykonać po drugim zbiorze ogórka.

W razie wydłużonego zbioru i występowania warunków sprzyjających występowaniu mączniaka rzekomego należy wykonać dodatkowy zabieg po upływie 14 dni.

Liczba zabiegów: 3-4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Cebula

różowienie korzeni powodowane przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 kg/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w fazie, gdy jest wyraźnie widoczny 3 – 4 liści (BBCH 13-14), kolejny po 14-21 dniach. Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Chmiel

mączniak rzekomy chmielu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwoju liści (rozwinięta pierwsza para liści do fazy, gdy szyszki są dojrzałe do zbioru (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 – 2000 l/ha

Do cieczy użytkowej należy dodać adiuwant Protector w dawce 300 ml/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Borówka wysoka

szara pleśń, antraknoza borówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kwitnienia do zbioru owoców (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Porzeczka czarna

szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kwitnienia do zbioru owoców (BBCH 61-89).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Malina (odmiany jesienne)

przypłkowe zamieranie pędów maliny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 - 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca zbioru owoców (BBCH 61-89), w odstępach co 7-10 dni.

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 ~~–10~~ dni.

Zalecana ilość wody: 400 - 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Malina (odmiany letnie)

przypłkowe zamieranie pędów maliny

a) Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Termin stosowania: środek zastosować po zbiorach w celu ochrony jednorocznych nowych pędów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Środek zastosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 600- 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kwitnienia (BBCH 61), w odstępach co 7-10 dni.

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody 400 – 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Czereśnia

szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie, gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać (od fazy BBCH 81).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 4 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Grusza

szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawkach:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek zastosować na 3–5 dni przed zbiorem owoców.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Rośliny ozdobne z rodziny wrzosowatych (uprawa w polu w szkółkach i nasadzenia trwałe)

fytoftorazy

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g środka w 10 l wody).

a) moczenie sadzonek

Termin stosowania: Środek zastosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 3 l na 1000 roślin

b) podlewanie roślin

Termin stosowania: środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin ~~do~~ na stałe stanowisko.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml na 1 roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Maksymalna całkowita dawka na uprawę w sezonie wegetacyjnym nie może przekroczyć 25 kg/ha.

Szkółki ozdobnych i leśnych drzew i krzewów iglastych (uprawa w polu)

fytoftorazy

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g środka w 10 l wody).

a) moczenie sadzonek

Termin stosowania: Środek zastosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 3 l na 1000 roślin

b) podlewanie roślin

Termin stosowania: środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin na stałe stanowisko.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml na 1 roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Maksymalna całkowita dawka na uprawę w sezonie wegetacyjnym nie może przekroczyć 25 kg/ha.

Róża (uprawa w szkółkach i nasadzenia trwałe)

szara pleśń, czarna plamistość róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g środka w 10 l wody).

Termin stosowania: Środek stosować od późnej wiosny do końca wegetacji.

Liczba zabiegów: 5

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l na 100 m².

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (plecakowych).

Uzasadnienie

W załączniku nr 9 do decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 194/2026d z dnia 3 marca 2026 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Polyversum WP popełniono omyłkę w postaci niewskazania zwalczanych chorób w uprawie śliwy i brzoskwini. Prawidłowy zapis zwalczanych chorób w obu tych uprawach brzmi: „Choroby przechowalnicze: *szara pleśń*”.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki pisarskie w wydanych przez ten organ decyzjach. W związku z powyższym, postanowiono o sprostowaniu powyższej omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3, w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
([zezwolenia.sor@piorin.gov.pl](mailto:zezwozenia.sor@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych