



Znak sprawy: : DHR.rs2.8202.50.2023
DHR.rs2.8202.52.2023
DHR.oz.8207.1396.2024
DHR.oz.8207.1397.2024
DHR.oz.8207.1896.2024
DHR.oz.8207.1897.2024
DHR.oz.8207.144.2025
DHR.oz.8207.145.2025

POSTANOWIENIE nr 71/2025

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹ (dalej jako: k.p.a.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w treści decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-617/2025d z dnia 27 sierpnia 2025 r. dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania na uprawy małoobszarowe, zmiany okresu ważności z 2 lat na 3 lata, wprowadzenia aktualnego adresu posiadacza zezwolenia, zmiany składu polegających na dodaniu alternatywnych dostawców koformulanta oraz zmiany producenta środka ochrony roślin Kestrel 200 SL i środka ochrony roślin Carnadine 200 SL, zmieniającej poniżej wskazane zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

L.p.	Nazwa środka ochrony roślin	Nr i data zezwolenia
1.	Carnadine 200 SL	R-157/2018 z dnia 10.10.2018 r. odnowione decyzją nr R-22/2022o z 20.07.2022 r.
2.	Kestrel 200 SL	R-106/2018 z dnia 28.05.2018 r. odnowione decyzją nr R-12/2022o z 04.07.2022 r.

w następujący sposób:

1) Załącznik do wskazanych powyżej zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin

otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.).

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.*

Rzepak jary

chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Środek zastosować na początku nalotu na plantację, przed złożeniem jaj przez szkodniki, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ślodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 50-60).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha.

Termin stosowania:

Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest otwartych co najmniej 10% kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku jarego w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

Zwójka kwasigroneczka, zwójka krzyżoweczka, mszyce, tutkarz cygarowiec, skoczek winorośli, chrabąszcz majowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,175 l/ha (0,12 L/10000m² LWA – powierzchnia ściany liści).

Termin stosowania:

Środek zastosować od fazy zawiązków owoców do fazy dojrzałości zbiorczej (do 21 dni przed zbiorem) (BBCH 71-89).

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto jare, pszenica samopsza, pszenica płaskurka, pszenica twarda, pszenica orkisz

Skrzypionka zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

środek zastosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy widocznego, ale jeszcze nierozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 37-65).

Liczba zabiegów: 1.

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

środek zastosować wiosną w momencie pojawienia się szkodnika, od początku krzewienia do fazy pełnej dojrzałości młecznej ziarniaków (BBCH 21-75).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszemica ozima, jęczmień ozimy

Niezmiarka paskowana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika na plantacji od końca fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29-31)

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, uwzględniająca zastosowania z wcześniejszej części etykiety 1.

Pszemica jara, jęczmień jary

Niezmiarka paskowana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika na plantacji od końca fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29-31)

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jęczmienia jarego uwzględniająca zastosowania z wcześniejszej części etykiety 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pszenicy jarej: 1.

Sorgo

Stonka kukurydziana, omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika na plantacji od początku fazy kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości mleczonej ziarniaków (BBCH 51-75).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzodkiew oleista, facelia, seradela - produkcja nasienna (nie przeznaczać do skarmiania zwierząt)

Wciornastki, mszyce, opuchlaki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania:

Środek zastosować po pojawieniu się szkodników na plantacji tylko po okresie kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uzasadnienie

W decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-617/2025d z dnia 27 sierpnia 2025 r. dotyczącej między innymi rozszerzenia zakresu stosowania środka ochrony roślin Kestrel 200 SL i środka ochrony roślin Carnadine 200 SL na uprawy małoobszarowe w punkcie dotyczącym zwalczania mszyc w uprawie żyta jarego, pszenicy samopszy, pszenicy płaskurki, pszenicy twardej i pszenica orkisz omyłkowo nie została wymieniona maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania.

Tym samym zapis:

Mszyce

Termin stosowania: środek zastosować wiosną w momencie pojawienia się szkodnika, od początku krzewienia do fazy pełnej dojrzałości mleczonej ziarniaków (BBCH 21-75).

Liczba zabiegów: 1.

Zastępuje się zapisem:

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować wiosną w momencie pojawienia się szkodnika, od początku krzewienia do fazy pełnej dojrzałości mleczonej ziarniaków (BBCH 21-75).

Liczba zabiegów: 1.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3 w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych