

Posiadacz zezwolenia:

BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

...

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

.....

STORANET

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

alfa – cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – **100 mg/ 1 m² siatki (1,57 g/kg)**

Zezwolenie MRiRW nr R- 66/2015 z dnia 31.03.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-429/2019d z dnia 11.07.2019 r.



Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

STORANET jest środkiem w postaci siatki wykonanej z tworzywa sztucznego i zaimpregnowanej substancją czynną alfa-cypermentryną, służącym do ochrony ściętego drewna drzew iglastych oraz liściastych przed gatunkami chrząszczy z rodziny kózkowatych, i rodziny bogatkowatych oraz podrodziny kornikowatych. Substancja czynna środka działa kontaktowo i żołądkowo.

STORANET jest siatką wykonaną z włókien politereftalanu etylenowego (PET, poliester), które są zaimpregnowane substancją czynną alfa-cypermetyną za pomocą spoiwa polimerowego. Powłoka z substancji czynnej jest наносzona na siatkę w postaci formułacji wodnej. Stopniowe uwalnianie alfa-cypermetyny z powierzchni siatki zapewnia długotrwałą skuteczność działania.

STOSOWANIE ŚRODKA

Drewno drzew iglastych i liściastych

Chrząższe z podrodziny kornikowatych wylęgające się w drewnie i wylęgające się pod kora (w tym m.in. kornik drukarz, rytownik pospolity, drwalnik paskowany)

Termin stosowania: przed okresem rójki chrząszczy lub w przypadku stwierdzenia zagrożenia (zapobiegawczo).

Chrząższe z rodziny kózkowatych oraz z rodziny bogatkowatych

Termin stosowania: przed okresem rójki chrząszczy lub w przypadku stwierdzenia zagrożenia (zapobiegawczo).

Zalecane ilości siatki STORANET:

Pojedyncze dłużyce: do 50 m² siatki/ pojedynczy pień,

Dłużyce: do 200 m² siatki / 40 m³ drewna,

Drewno stosowe: do 100 m² siatki / 20 m³ drewna w warstwach.

Zakres zastosowania: otwarta przestrzeń

UWAGI

1. Siatka STORANET działa także w niskich temperaturach. Może być stosowana już wczesną wiosną, podczas układania dłużyc i kiedy istnieje zagrożenie pojawu szkodników.
2. Siatka STORANET zapewnia ochronę do 6 miesięcy, nawet podczas wysokiej temperatury (powyżej 20°C) oraz podczas długich opadów deszczu. Jeżeli więc była używana przez krótszy okres nie została uszkodzona, siatka STORANET może być usunięta z chronionych obiektów (zrolowana do pustego oryginalnego opakowania) i zastosowana ponownie np. wczesną wiosną w następnym roku kalendarzowym.

SPOSÓB STOSOWANIA

Środek STORANET stosuje się w formie zabiegu owijania drewna siatką.

Siatka STORANET ma szerokość 8 metrów. Dostarczana jest w postaci zwiniętej w plastikowym opakowaniu, w celu łatwego transportu do miejsca stosowania.

Całkowita długość zwiniętej siatki STORANET wynosi 12,5 m.

W celu użycia, należy rozciągnąć siatkę na chroniony obiekt (wałki, dłużyce, drewno stosowe) trzymając za cztery rogi (czynność może być wykonana przez jedną lub dwie osoby). Po pokryciu siatką STORANET stosów drewna o pojemności większej niż 20 m³, należy obciążyć siatkę w odstępach co około pięć metrów.

Podczas nakładania siatki nie dopuścić do jej rozerwania lub rozdarcia. Małe rozdarcie do 5 cm długości nie obniża skuteczności ochrony drewna przed szkodnikami.

Większe rozdarcia należy przykryć lub naprawić przy użyciu nici lub sznura.

Pojedyncze cenne dłużyce/wałki, takie jak dąb do produkcji forniru, które pozostaną w lesie przez długi okres czasu mogą być bardzo skutecznie chronione przed uszkodzeniami przez chrząszcze przez cały sezon wegetacyjny poprzez nakrycie pojedynczą siatką STORANET.

Przed wywozem ściętego drewna z lasu należy usunąć siatkę STORANET, którą można użyć ponownie, jeśli nie jest uszkodzona i nie była wykorzystywana przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Tablice informacyjne muszą być zamontowane w widocznych miejscach w pobliżu chronionego drewna tak, aby wszystkie osoby postronne bezwzględnie unikały kontaktu z produktem (siatką).

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie stosowania preparatu.

W przypadku kontaktu ze skórą (zwłaszcza twarzy) może wystąpić zaczerwienienie lub świąd. W powyższym przypadku należy unikać dalszego kontaktu ze środkiem. Jeżeli objawy nie ustąpią lub pojawią się kolejne – zasięgnij porady lekarza.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Zabrania się stosowania produktu na terenach, na których występują gatunki stawonogów wymienione w załączniku II lub IV do dyrektywy 92/43/EWG z dnia 1 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7, z późn. zm.).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności	- 3 lata
Data produkcji -	
Zawartość netto	-
Nr partii	-