



Minister
Zdrowia

PLD.4731.3.2026.AK
Warszawa, 07 lipca 2026

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA
w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury
ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.)¹ w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 499), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jego publikacji.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Katarzyna Kacperczyk
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637, 779, 1192, oraz 1211



Minister Zdrowia

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany	Kod ICD-10	Uwagi
1.	Abecma	<i>Idecabtagene vicleucel</i>	dyspersja do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	leczenie opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego u dorosłych pacjentów - terapia po uprzednim zastosowaniu co najmniej dwóch linii leczenia, w tym zawierających lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu oraz przeciwciało anti-CD38
2.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	w populacji pacjentów <12 roku życia
3.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
4.	Agamree	<i>Vamorolonum</i>	zawiesina doustna	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a	G71.0	w populacji pacjentów niespełniających kryteriów wyszczególnionych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2026, tj. zdolność do samodzielnego chodzenia, wynik testu czasu wstawania z leżenia (TTSTAND) < 10s
5.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena przewlekła	G43	brak

6.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Migrena epizodyczna	G43	rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej
7.	Amvuttra	<i>Vutrisiran</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej	E85, I42.1	Leczenie dorosłych pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej, z klasą czynnościową serca NYHA I-II lub u dorosłych pacjentów z klasą czynnościową serca NYHA III wyłącznie w stadium NAC1 lub NAC2
8.	Ayvakyt	<i>Avapritinib</i>	tabletki powlekane	Indolentna mastocytoza układowa	D47.0	leczenie dorosłych chorych na indolentną mastocytozę układową z objawami umiarkowanymi lub ciężkimi, niedostatecznie kontrolowanymi leczeniem objawowym
9.	Bavencio	<i>Avelumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie raka nerki	C64	wiek 18 lat i powyżej; histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z komponentem jasnokomórkowym; w terapii skojarzonej z aksytynibem; nowotwór w stadium zaawansowanym (obecne przerzuty odległe) lub nawrót po leczeniu chirurgicznym lub brak możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego; brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki;

10.	Berinert 2000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy
11.	Berinert 3000	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy	D84.1	leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy
12.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2	E75.4	brak
13.	Brukinsa	<i>Zanubrutinib</i>	kapsułki twarde	Przewlekła białaczka limfocytowa / chłoniak z małych limfocytów B	C91.1	monoterapia dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, w tym z chłoniakiem z małych limfocytów B- subpopulacja FIT (tj. bez przeciwwskazań do rozpoczęcia I linii z wykorzystaniem schematu FCR)
14.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	leczenie chłoniaka z komórek płaszczka - I linia leczenia dorosłych chorych, niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (autoHSCT) - terapia skojarzona z bendamustyną oraz rituksymabem
15.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	tabletki powlekane	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	I linia leczenia u dorosłych chorych, niezależnie od statudu delecji 17p / mutacji TP53 - terapia skojarzona z wenetoklaksem i obinutuzumabem lub z wenetoklaksem

16.	Cresemba	<i>Isavuconazolum</i>	kapsułki twarde	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
17.	Cresemba	<i>Isavuconazolum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
18.	Darzalex	<i>Daratumumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	leczenie dorosłych chorych na uprzednio nieleczzonego szpiczaka plazmocytozowego, niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych (autoHSCT)
19.	Dupixent	<i>Dupilumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Przewlekła obturacyjna choroba płuc	J44	leczenie dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i zapaleniem typu 2., charakteryzującym się liczbą eozynofili w krwi na poziomie ≥ 300 komórek/ μ L - terapia skojarzona z korynkosteroidem wziewnym (wGKS), długodziałającym beta-2-mimetykiem (LABA) i długodziałającym antagonistą muskarynowym (LAMA), lub terapia skojarzona z LABA i LAMA, jeśli wGKS nie jest odpowiedni
20.	Dupixent	<i>Dupilumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Przewlekła obturacyjna choroba płuc	J44	

21.	Ebglyss	<i>Lebrikizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Atopowe zapalenie skóry	L20	leczenie pacjentów w wieku 12 lat i powyżej z umiarkowaną postacią atopowego zapalenia skóry
22.	Ebglyss	<i>Lebrikizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce			
23.	Emgality	<i>Galcanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Migrena przewlekła	G43	W ramach leczenia profilaktycznego
24.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
25.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów	M05, M06, M08	brak
26.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak
27.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów	L40.5, M07.1, M07.2, M07.3	brak

28.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)	M45	brak
29.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)	M45	brak
30.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
31.	Enbrel	<i>Etanerceptum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK	M46.8	brak
32.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
33.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
34.	Erlotinib Vipfarm	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak

35.	Esperoct	<i>Turoctocog alfa pegol</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII)	D66	w populacji pacjentów w wieku 12 lat i powyżej
36.	Fibryga	<i>Fibrinogenum humanum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji	Nabyta hipofibrynogenemia	D68.4	optymalizacja leczenia farmakologicznego ciężkiego krwotoku okołozabiegowego u pacjentów z nabytą hipofibrynogenemią
37.	Filsuvez	<i>Birch bark extract</i>	żel	Pęcherzowe oddzielanie się naskórka	Q81	leczenie ran o częściowej grubości związanych z postacią dystroficzną pęcherzowego oddzielania się naskórka (DEB) i postacią graniczną pęcherzowego oddzielania się naskórka (JEB) u pacjentów w wieku 6 miesięcy i starszych
38.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	Leczenie raka nerki	C64	brak

39.	Hemlibra	<i>Emicizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Zapobieganie krwawieniom u doostych z ciężką hemofilią A niepowikłaną inhibitorem	D66	Leczenie chorych >18 r.ż., ze zdiagnozowaną ciężką hemofilią A bez inhibitora, spełniających kryteria: 1) wystąpienia co najmniej sześciu krwawień rocznie 2) jednego samoistnego krwawienia zagrażającego życiu pacjenta, jeżeli u pacjenta stwierdza się: a) brak możliwości prowadzenia długoterminowej profilaktyki koncentratem czynnika VIII z powodu trudnego lub niemożliwego dostępu żylnego, lub b) brak możliwości prowadzenia długoterminowej profilaktyki koncentratem czynnika VIII z powodu udokumentowanych chorób towarzyszących, które w ocenie Zespołu Koordynacyjnego uniemożliwiają przestrzeganie zalecanego schematu c) brak skuteczności regularnie prowadzonej profilaktyki maksymalnymi dawkami koncentratu czynnika VIII definiowane jako występowanie krwawień przebijających lub d) brak tolerancji na koncentraty czynnika VIII, która w ocenie Zespołu Koordynacyjnego uniemożliwia dalsze ich stosowanie u pacjenta.
-----	----------	-------------------	------------------------	---	-----	--

40.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim	L73.2	brak
41.	Hypavzi	<i>Marstacimab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Hemofilia A, hemofilia B	D66, D67	rutynowa profilaktyka epizodów krwawień u chorych w wieku 12 lat i starszych, z ciężką hemofilią A bez inhibitorów czynnika VIII (FVIII) lub z ciężką hemofilią B bez inhibitorów czynnika IX (FIX)
42.	Ilaris	<i>Canakinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych	E85, R50.9, D89.8, D89.9	w leczeniu wrodzonych zespołów autozapalnych: CAPS (w tym: NOMID/CINCA; MWS; FCAS); TRAPS; HIDS/MKD; FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny
43.	Imfinzi	<i>Durvalumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu neoadjuwantowym, a następnie w monoterapii jako leczenie adjuwantowe u dorosłych chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca z wysokim ryzykiem nawrotu oraz brakiem rearanżacji w genie EGFR lub rearanżacji genu ALK

44.	Iqirvo	<i>Elafibranor</i>	tabletki powlekane	Pierwotne zapalenie dróg żółciowych	K74.3	leczenie dorosłych pacjentów pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych, u których stwierdzono brak skuteczności leczenia z zastosowaniem kwasu ursodeoksycholowego (UDCA) po minimum 12 miesiącach leczenia; terapia skojarzona z UDCA lub monoterapia w przypadku nietolerancji UDCA
45.	Jaypirca	<i>Pirtobrutinib</i>	tabletki powlekane	Chłoniak z komórek płaszczka	C85.7	monoterapia dorosłych pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszczka - nawrót, progresja lub oporność po minimum jednej linii leczenia, w tym terapii inhibitorem kinazy Brutona
46.	Jaypirca	<i>Pirtobrutinib</i>	tabletki powlekane	Przewlekła białaczka limfocytowa	C91.1	monoterapia u dorosłych pacjentów z oporną lub nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową, bez względu na status delekcji 17p / mutacji w genie TP53 (del17p / mTP53), u których stosowano co najmniej jedną linię leczenia, w tym inhibitor kinazy Brutona niezależnie od linii leczenia
47.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy	E75.5, E75.6	brak
48.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	Endogenny zespół Cushinga		> 12 rż

49.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie raka nerki	C64	I linia terapii, u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym o rokowaniu pośrednim i niekorzystnym wg IMDC - terapia skojarzona z aksytynibem
50.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C61, C65, C66, C67, C68	I linia leczenia raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia - terapia skojarzona z enfortumabem wedotyny
51.	Kinpeygo	<i>Budesonidum</i>	kapsułki twarde	Pierwotna nefropatia IgA	N02.8	w ramach rozszerzenia populacji docelowej do pacjentów dorosłych z pierwotną nefropatią IgA z poziomem białka w moczu $\geq 1,0\text{g/dobę}$ (lub stosunkiem stężenia białka do kreatyniny w moczu $\geq 0,8\text{ g/g}$)
52.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji, $1,2 \times 10^6 - 6 \times 10^8$ komórek w worku infuzyjnym	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniu złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcej linii leczenia systemowego, w tym zawierającego przeciwciało anti-CD20 i związki alkilujące

53.	Kyprolis	<i>Carfilzomibum</i>	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytozowego po uprzednim zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia
54.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
55.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
56.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
57.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką		u pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
58.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie opornego na kastrację, przerzutowego raka gruczołu krokowego u dorosłych pacjentów, u których nie jest wskazana chemioterapia - terapia skojarzona z octanem abirateronu

59.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
60.	Lyvdelzi	<i>Seladelpar</i>	kapsułki twarde	Pierwotne zapalenie dróg żółciowych	K74.3	w populacji dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie z zastosowaniem kwasu ursodeoksycholowego lub z jego nietolerancją, u których stwierdza się nietolerancję lub przeciwwskazania do stosowania terapii fibratami
61.	MabThera	<i>Rituximab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Chłoniaki złośliwe	C82, C83	brak
62.	Mekinist	<i>Trametinib</i>	tabletki powlekane	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
63.	Metopirone	<i>Metyraponum</i>	kapsułki miękkie	Leczenie pacjentów z hiperkortyzolemią	E24.0, E24.3, E24.8, E24.9	leczenie endogennej zespołu Cushinga
64.	Myalepta	<i>Metreleptinum</i>	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Lipodystrofia	E88.1	brak
65.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamicinum</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	Ostra białaczka szpikowa	C92.0	W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)

66.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)	E76.2	brak
67.	Nerlynx	<i>Neratinib</i>	tabletki powlekane	Rak piersi	C50	leczenie adjuwantowe
68.	Ocaliva	<i>Acidum obeticholicum</i>	tabletki powlekane	Pierwotne zapalenie dróg żółciowych	K74.3	leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenie kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innym leczeniu brany pod uwagę w wytycznych klinicznych)
69.	Onivyde pegylated liposomal	<i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak trzustki w stadium uogólnienia	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9	brak
70.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C65, C66, C67	miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rak urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny
71.	Ozurdex	<i>Dexamethasonum</i>	implant do ciała szklistego w aplikatorze	Zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak

72.	Padcev	<i>Enfortumabum vedotini</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	Rak urotelialny	C61, C65, C66, C67, C68	I linia leczenia raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia - terapia skojarzona z pembrolizumabem
73.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)	H47.2	brak
74.	Respreeza	<i>Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny i rozedmą płuc	J44.8, E88.0	
75.	Rinvoq	<i>Upadacitinib</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Atopowe zapalenie skóry	L20	w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry
76.	Rybrewant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych; leczenie w monoterapii

77.	Rybrevant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	II i kolejne linie leczenia u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z delecjami w eksonie 19 lub substytucją p.L858R w eksonie 21 genu EGFR, po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR 3. generacji - terapia skojarzona z karboplatiną i pemetreksedem
78.	Saphnelo	<i>Anifrolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Toczeń rumieniowaty układowy	M32	leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczeniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej do ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia
79.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnościową niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m ²) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)
80.	Sialanar	<i>Glycopyrronium bromidum</i>	roztwór doustny	Mózgowe porażenie dziecięce	G80	leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym

81.	Signifor	<i>Pasireotidum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Choroba Cushinga	E24.0	w populacji osób dorosłych, z potwierdzoną klinicznie i biochemicznie chorobą Cushinga, u których wykonanie zabiegu operacyjnego guza przysadki nie jest możliwe lub zakończyło się niepowodzeniem; tylko dla leku w dawce 10mg
82.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
83.	Spevigo	<i>Spesolimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Łuszczyca krostkowa uogólniona	L40.1	leczenie zaostrzeń uogólnionej łuszczyki krostkowej u pacjentów w wieku 12 lat i powyżej, z rozpoznaniem uogólnionej łuszczyki krostkowej z zaostrzeniem choroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
84.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
85.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak piersi	C50	potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 $\geq 1\%$, którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsiaanej
86.	Tezpire	<i>Tezpelumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	Leczenie chorych z ciężką postacią astmy	J45. J82	finansowana ze środków publicznych jest postać leku we wstrzykiwaczu

87.	Trepulmix	<i>Treplostinil</i>	roztwór do infuzji	Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne	I27, I27.0, I26	Leczenie zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego CTEPH w monoterapii oraz w skojarzeniu z riocyguatem (IV klasa czynnościowa wg NYHA/WHO; w kolejnej linii leczenia pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii riocyguatem (RIOC) oraz w terapii skojarzonej treprostynil z riocyguatem)
88.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Stwardnienie rozsiane	G35	leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
89.	Uplizna	<i>Inebilizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego	G36.0	monoterapia dorosłych pacjentów uprzednio nieleczonych lub u których minął określony czas od wcześniejszego leczenia
90.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	Przewlekła niewydolność serca	I50	w populacji pacjentów dorosłych

91.	Vyloy	<i>Zolbetuximab</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	Nowotwór złośliwy żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego	C16, C16.0	I linia leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2-ujemnym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazującym obecność kładyny 18.2 (CLDN18.2) - terapia skojarzona z chemioterapią opartą na pochodnych fluoropirymidyny (5-fluorouracyl) i platyny (oksaliplatyna lub kapecytabina - według schematu FOLFOX lub CAPOX)
92.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	Rodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa (TTR-FAP)	E85.1	
93.	Wainzua	<i>Eplontersen</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	Dziedziczna amyloidoza transtytetynowa (hATTR)	E85.1	w populacji dorosłych pacjentów z polineuropatią w I lub II stadium zaawansowania w przebiegu hATTR
94.	Xgeva	<i>Denosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	Guz olbrzymiokomórkowy kości	D48.0	brak
95.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem	C92.0	leczenie podtrzymujące remisję
96.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	kapsułki miękkie	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa

97.	Xtandi	<i>Enzalutamidum</i>	tabletki powlekane	Rak gruczołu krokowego	C61	leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
98.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
99.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rak przełyku	C15	I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą $\geq 1\%$, terapia skojarzona z niwolumabem
100.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleucel</i>	dyspersja do infuzji, $0,4 \times 10^8 - 2 \times 10^8$ komórek w worku infuzyjnym	Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe	C82, C83, C85	terapia CAR-T w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka z komórek B o dużym stopniu złośliwości (HGBCL) lub transformowanego chłoniaka grudkowego (TFL), z nawrotem choroby w ciągu 12 miesięcy od zakończenia immunochemioterapii I linii lub choroba oporna na immunochemioterapię I linii, niekwalifikujących się do autoHSCT
101.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	Leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej	C56, C57, C48	leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej

102.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovecum</i>	roztwór do infuzji	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	G12	w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym
------	-----------	---------------------------------------	--------------------	---	-----	---

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4934393.18942972.20002968
Nazwa dokumentu	wykaz leków niefinansowanych ratunkowy dostęp 07.2026.pdf
Tytuł dokumentu	wykaz leków niefinansowanych ratunkowy dostęp 07.2026
Sygnatura dokumentu	PLD.4731.3.2026
Data dokumentu	2026-07-07
Skrót dokumentu	F301C4D9AB98E207914F73D79275E6DC01B97C6D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2026-07-07 08:31:14
Podpisane przez	Katarzyna Kacperczyk Podsekretarz Stanu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.31.31.

Data wydruku: 2026-07-07

Autor wydruku: Kurek Adam (Główny Specjalista)