

## „Dolina Wadąga”

Opis z rozdziału *Miejsca szczególnie cenne dla awifauny* (str. 248):

**Opis terenu.** Obszar o powierzchni około 120 ha, rozciągnięty wzdłuż 5 km odcinka rzeki Wadąg, od al. Wojska Polskiego do ul. Jagiellońskiej, które stanowią jego zachodnią i wschodnią granicę. Granicę północną i południową stanowią krawędzie doliny (ryc. 195). Jest to przełomowy odcinek rzeki o dużych walorach krajobrazowych. Prawie na całym odcinku strome zbocza doliny rzecznej porośnięte są starodrzewem. Głównie jest to drzewostan mieszany na siedliskach lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego. W piętrze drzew dominują 70-80-letnie świerki *Picea abies* lub 90-140-letnie sosny zwyczajne *Pinus sylvestris*. Znaczną część doliny zajmują także bór mieszany bagienny ze 100-letnimi świerkami lub 60-letnie olsy z udziałem olszy czarnej *Alnus glutinosa*. Rzeka Wadąg jest stosunkowo płytka, przy brzegach porośnięta roślinnością zielną, o wartkim nurcie, piaszczystym dnie, z dużą liczbą przeszkód wodnych (zwalone pnie drzew, gałęzie). Przeszkody te są głównie rezultatem działalności bobrów *Castor fiber*. W środkowym odcinku rzeki utworzyły się niewielkie łachy (wysepki) o powierzchni około 30 m<sup>2</sup> każda.

**Awifauna.** W dolinie Wadąga na wyznaczonym obszarze stwierdzono lęgi 46 gatunków. Jest to miejsce ważne dla gniazdowania nurogęsi *Mergus merganser* (3 p.), zimorodka *Alcedo atthis* (2 p.), dzięcioła czarnego *Dryocopus martius* (1-2 p.), dzięcioła zielonego *Picus viridis* (1 p.), dzięcioła dużego *Dendrocopos major* (9 p.), puszczyka *Strix aluco* (1 p.), kobuza *Falco subbuteo* (1 p.), drożdżika *Turdus iliacus* (1-2 p.), orzechówki *Nucifraga caryocatactes* (2 p.). Typowymi gatunkami są tutaj ptaki związane z drzewostanami świerkowymi, np. pokrzywnica *Prunella modularis* (2-3 p.), krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra* (1-2 p.), gil *Pyrrhula pyrrhula* (3 p.) i olsami, np. rudzik *Erithacus rubecula* (25-30 p.), śpiewak *Turdus philomelos* (16-17 p.), kos *Turdus merula* (17-18 p.), strzyżyk *Troglodytes troglodytes* (8—10 p.), pełzacz leśny *Certhia familiaris* (9-10 p.), grubodziób *Coccothraustes coccothraustes* (5 p.), muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca* (4-5 p.), muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis*. Zimą jest to jedno ze stałych miejsc występowania pluszcza *Cinclus cinclus*.  
Inne walory przyrodnicze. Jest to miejsce występowania bobrów *Castor fiber*.

**Zagrożenia.** Zagrożeniem dla tego terenu może być przede wszystkim nadmierna eksploatacja (wycinka) drzew, jakie rosną na tym obszarze.

**Proponowana forma ochrony.** Stanowisko dokumentacyjne lub pomnik przyrody, chroniący obszar cennego krajobrazu przełomowej doliny rzeki. Celowe byłoby wyznaczenie edukacyjnej leśnej ścieżki przyrodniczej wzdłuż rzeki.

Ptaki Olsztyna – Jacek J. Nowakowski, Beata Dulisz, Krzysztof Lewandowski. Wydawnictwo ElSet, Olsztyn 2006.

