

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY.
DZIAŁ LABORATORYJNY.
ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ.**

Wyciąg z załącznika nr 7 do PL-02/IR-01/LEP wydanie 4 załącznika z dnia 2020-01-27

1.4. Pobieranie wymazu z nosa, gardła lub jamy nosowo-gardłowej

Nos. Wymazówkę należy zwilżyć jałowym roztworem soli fizjologicznej. Sterylny patyczek wymazowy umieścić w prawym i lewym nozdrzu pacjenta. Umieścić pobrany wymaz w probówce. Probówkę dostarczyć jak najszybciej (do 2 h) do Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników (PPPiWW) WSSE w Bydgoszczy lub zastosować podłoże transportowe (do 48 h).

Gardło. Pacjent powinien być na czczo i przed pobieraniem powinien przeplukać usta przegotowaną, letnią wodą. Unieruchomić język szpatułką. Jałowym wacikiem pobrać materiał z migdałków, łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła lub ze zmian ropnych (czopy). W przypadku suchych błon śluzowych wacik można zwilżyć jałowym roztworem 0,9% soli fizjologicznej. Należy pamiętać, aby nie dotykać języka i języczka podniebiennego oraz nie zanieczyścić wymazów śliną.

Nosogardziel. W przypadku pobierania materiału z jamy nosowo-gardłowej należy posługiwać się małym wacikiem na giętym pręcie. Wacik wprowadza się za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła.

W kierunku nosicielstwa *Neisseria meningitidis* wymaz należy pobierać z jamy nosowo-gardłowej.

W przypadku braku możliwości natychmiastowego przesyłania i opracowania próbki wymaz należy pobierać za pomocą specjalnych, fabrycznych zestawów zawierających wymazówkę i podłoże transportowe. Do czasu dostarczenia do PPPiWW przechowywać w temperaturze pokojowej (możliwość przesłania do laboratorium do 48 godzin od pobrania).

Wymazówki z pobranym materiałem można przesłać w jałowej probówce bez podłoża transportowego w temperaturze pokojowej, gdy materiał zostanie opracowany w Pracowni Mikrobiologii Medycznej do 3 godzin od pobrania.