

Miejsce na kod kreskowy



Zlecenie na badanie nr DL-OBM.PDM.9051. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

Dane zleceniodawcy (jeśli inny niż pacjent) – nazwa, adres, dane kontaktowe

Nazwisko i Imię badanej osoby

Płeć

Numer PESEL

 - -

Data urodzenia

W przypadku braku numeru PESEL – nazwa, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
dla ubezwłasnowolnionego dane opiekuna; dla noworodka pesel matki – „syn” lub „córka”

 -

Adres zamieszkania lub Oddział szpitalny

Kod pocztowy

Miejscowość

Rozpoznanie kliniczne

Imię i Nazwisko osoby zlecającej badanie

Tytuł zawodowy

Numer prawa wykonywania zawodu

Dane do kontaktu z osobą zlecającą badanie (nr telefonu, adres e-mail)

Imię i Nazwisko osoby pobierającej materiał i jej podpis

Rodzaj działalności/badane cechy	Dokument odniesienia
obecność materiału genetycznego wirusów w materiale klinicznym:	
^A Wirusy oddechowe – SARS CoV-2, Grypa, RSV	PB-01/E wyd. 1 z dnia 17.01.2024
^A Norowirusy GI, GII	PB-65/E wyd. 3 z dnia 18.01.2024
^A HIV-1 – test potwierdzenia	PB-66/E wyd. 2 z dnia 10.07.2025
^{**} Obecność materiału genetycznego <i>Bordetella pertussis</i> (krztusiec)	PB-67/E wyd. 1 z dnia 18.09.2024
^{**} Obecność materiału genetycznego patogenów przewodu pokarmowego	PB-68/E wyd. 2 z dnia 20.08.2025
Inne:	

^A – badanie akredytowane, certyfikat AB 379, aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl.^{**} – badanie nieakredytowane

PB – procedura badawcza opracowana w laboratorium

Zapoznałem się z instrukcją zlecenia badania laboratoryjnego oraz instrukcją pobierania materiału do badań
(dostępny na www.gov.pl/web/wsse-lublin/badania-laboratoryjne) i zrozumiałem je

☒ F-03/IR-01/PO-05/DL/OBM ☐ F-05/IR-01/PO-05/DL/OBM ☒ F-07/IR-01/PO-05/DL/OBM ☐ F-09/IR-01/PO-05/DL/OBM

Dla badań wykonywanych z krwi wyrażam zgodę na naruszenie ciągłości tkanki w celu pobrania próbki 2-5ml krwi.

Zostałem poinformowany:

- o stosowanych w Laboratorium metodach badawczych umieszczonych w zleceniu i je akceptuję,
- że laboratorium dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem umożliwiającym wykonanie zlecenia,
- że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek,
- o zachowaniu poufności informacji pozyskanych i wytworzonych podczas realizacji zlecenia z wyjątkiem obowiązku zgłoszenia dodatknych wyników wynikającego z art. 29 Ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- że informacje o przetwarzaniu danych osób fizycznych znajdują się na stronie internetowej zleceniobiorcy.

Data i podpis zleceniodawcy

Stan próbki w chwili przyjęcia:	Tryb badania:	Cel badania:	Rodzaj materiału i jego pochodzenie:	Materiał pobrany od:
☐ prawidłowy ☐ nieprawidłowy	☐ normalny ☐ CITO	☐ diagnostyka ☐ sanitarno-epidemiologiczny	☐ kał ☐ wymaz z ☐ szczep ☐ postać dojrzała pasożyta ☐ inny	☐ osoby zdrowej (uczeń, student, doktorant*) ☐ osoby chorej ☐ ozdrowieńca ☐ nosiciela ☐ osoby ze styczności
Kod próbki	Data pobrania materiału	Godzina pobrania materiału		

Data i godzina przyjęcia materiału

podpis osoby przyjmującej zlecenie

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie.
Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: co robimy-badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zlecniodawcy

*- właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązujących badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

F-07/IR-01/PO-05/DL/OBM

Instrukcja pobierania materiału do badań wirusologicznych i molekularnych Pobieranie materiału w celu wykrycia materiału genetycznego wirusów (np.: grypa, SARS Cov-2, RSV) i bakterii *Bordetella* spp. metodami opartymi na technice real-time PCR.

Materiał do badania należy pobrać nie później niż 48 godzin od wystąpienia objawów klinicznych w ostrym okresie choroby

Materiały pomocnicze:

- komercyjne podłoża,
- sterylne patyczki wymazowe z solą fizjologiczną jałową.

Wymaz z gardła:

Wymaz pobierać sterylnym patyczkiem wymazowym, a szpatułką docisnąć język ku dołowi co pozwoli uniknąć kontaminacji wymazu śliną.

Wyjętym z próbówki transportowej patyczkiem wymazowym energicznie pocierając obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej) zwracając szczególną uwagę na miejsca zapalnie zmienione pobrać wymaz.

W przypadku podejrzenia krztuśca (*Bordetella pertussis*) wymaz pobrać z tylnej ściany gardła (jak najgłębiej) – należy pobrać możliwie wiele materiału w tym i nabłonka dróg oddechowych.

Patyczek wymazowy umieścić w próbówce z podłożem transportowym (1,5 ml – 2 ml).

Próbkę zamknąć i podpisać (imię i nazwisko pacjenta oraz data pobrania wymazu).

Wymazy z nosa, gardła, nosogardzieli przeznaczone do badań wirusologicznych prowadzonych techniką qPCR należy przewozić w warunkach chłodniczych. Wymaz z gardła należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiału innego niż wata/bawełna (dakron, czysta wiskoza, poliestr, sztuczny jedwab etc.), ponieważ stosowanie innych wymazówek powoduje inhibicję reakcji PCR.

Jałowe podłoże (UTM, VTM, buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS, lub płyn Hanks'a albo fizjologiczny roztwór NaCl) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az. Jeśli to możliwe zalecamy stosowanie komercyjnych podłoży do transportu materiału do badań wirusologicznych.

Wymaz z nosa (z obu nozdrzy):

Wymaz pobieramy z nosa nieoczyszczonego z wydzieliny.

Wymaz pobrać energicznie sterylnym patyczkiem wymazowym z prawego nozdrza pacjenta, aby mieć pewność, że zawiera zarówno komórki jak i śluz z wnętrza nosa i umieścić w próbówce zawierającej 1,5 – 2 ml podłoża transportowego (wymagania jak w przypadku wymazów z gardła).

Przy pomocy nowego sterylnego patyczka wymazowego pobrać materiał z lewego nozdrza według tej samej procedury.

Wymazy muszą być przechowywane i transportowane w pozycji pionowej.

Kał do diagnostyki antygenów rotawirusów, adenowirusów, norowirusów i badań molekularnych

Kał powinien być pobrany w okresie ostrych objawów choroby 1-5 dnia. Próbkę kału w ilości 5–10 g lub 10-20 ml, należy pobrać do dostępnego w handlu czystego, suchego pojemnika (kałówki) bez środków konserwujących, detergentów i podłoża transportowego.

Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania) lub do odbioru osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11:30 do 14:00