



Znak sprawy: DHR.rs1.8208.3.56.2024

POSTANOWIENIE Nr 21/2025

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*¹ (dalej jako: Kpa) **postanawiam** sprostować oczywistą omyłkę w zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-30/2025 z dnia 21 lutego 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Tarlicom**, w następujący sposób:

Załącznik do zezwolenia nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin otrzymuje następujące brzmienie:

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfuron zaliczona jest do grupy 2, a substancja czynna dikamba zaliczona jest do grupy 4.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wnika do rośliny poprzez korzenie i liście powodując zahamowanie wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym sposobie i mechanizmie działania oraz objawach powodowanych na zwalczanych chwastach.

Symptomy uszkodzeń roślin powodowane przez dikambę są typowe dla syntetycznych auksyn, polegające na skręceniu i karłowaceniu kielkujących roślin i formujących się liści. Symptomy te

¹ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 j.t.)

przechodzą w chlorozy części wegetatywnych, zatrzymanie wzrostu, więdnienie i nekrozy. Pierwsze widoczne objawy działania chwastobójczego u wrażliwych gatunków widoczne są przy ciepłej pogodzie po 1-2 dniach od zastosowania, przy chłodnej pogodzie objawy te mogą być opóźnione do więcej niż jednego tygodnia. Najszybsze objawy występują podczas intensywnego wzrostu i podziału komórek.

Prosulfuron u roślin wrażliwych powoduje zahamowanie wzrostu w kilka godzin po zastosowaniu środka, jednak objawy działania takie jak żółknięcie roślin, czerwone przebarwienia, pojawiają się od kilku dni do dwóch tygodni po zabiegu. Kompletne zamieranie roślin ma miejsce jeden do dwóch tygodni później, zależnie od gatunku chwastu oraz czynników środowiska takich jak temperatura i wilgotność.

Najskuteczniej zwalczane są młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie wschodów, od 1 do 4 liści.

Wrażliwość chwastów w zastosowaniu w kukurydzy

Chwasty wrażliwe:	szarłat szorstki, bniec biały, rumian polny, samosiewy rzepaku, żóltlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mak polny, tobołki polne; fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdestówka powojowata, rdest ptasi, tasznik pospolity – zwalczać we wczesnych fazach rozwojowych, tj. od 1 do 3 liści właściwych.
Chwasty średnio wrażliwe:	powój polny; psianka czarna (zabieg wykonać we wczesnych stadiach rozwojowych chwastu).
Chwasty odporne:	jasnota purpurowa, ostrożeń polny, przetacznik perski, chwastnica jednostronna, perz właściwy, włośnice.

Wrażliwość chwastów w zastosowaniu na użytkach zielonych

Dawka środka 0,36 kg/ha

Chwasty wrażliwe:	barszcz zwyczajny, gwiazdnica pospolita, jaskier polny.
Chwasty średnio wrażliwe:	jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny.
Chwasty odporne:	ostrożeń błotny

Dawka środka 0,30 kg/ha

Chwasty wrażliwe:	gwiazdnica pospolita
-------------------	----------------------

Chwasty średnio wrażliwe:	barszcz zwyczajny, jaskier polny, jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny.
Chwasty odporne:	ostrożeń błotny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza

Środek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w następujących dawkach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Tarlicom 0,3 kg/ha + Trend 90 EC 0,1%.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Tarlicom 0,3 kg/ha + Trend 90 EC 0,05-0,1%.

Termin stosowania:

Środek zastosować po wschodach kukurydzy w fazie od 2 do 8 liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH 12-18), najlepiej na młode intensywnie rosnące chwasty w fazie 1-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Użytki zielone – starsze niż 12 miesięcy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,36 kg/ha

Termin stosowania: Środek zastosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów od kwietnia do października.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Użytki zielone – nowo wysiane, siew wiosenny

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

Termin stosowania: Środek zastosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, od kwietnia do października, w roku wysiewu. Nie stosować środka wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od wysiewu i/lub przed fazą piątego liścia traw (BBCH 15).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Użytki zielone – nowo wysiane, siew jesienny

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

Termin stosowania: Środek zastosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów od kwietnia do października. Zabieg wykonać po upływie minimum 12 miesięcy od wysiewu.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uzasadnienie

W załączniku nr 2 do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi R - 30/2025 z dnia 21 lutego 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Tarlicom, w zapisie dotyczącym stosowania środka w kukurydzy, w maksymalnej dawce dla jednorazowego zastosowania, wskazano niewłaściwą nazwę środka ochrony roślin – Terlicom zamiast prawidłowej Tarlicom.

W związku z powyższym, postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki pisarskie w wydanych przez ten organ decyzjach.

Na podstawie art. 113 § 3, w związku z art. 144 i art. 127 § 3 Kpa, strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie

30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:
(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(wo@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych