

ODRA



Morbillivirus

Wirus odry łatwo się rozprzestrzenia

OBJAWY

- ✓ **Gorączka** powyżej 38°C
- ✓ **Ostry ból gardła**
- ✓ **Suchy kaszel**
- ✓ **Światłowstręt**
- ✓ **Jest wysoce zakaźna**
- ✓ **Wysypka plamisto-grudkowa** trwająca dłużej niż 3 dni

PROFILAKTYKA



- ✓ **szczepionka MMR**
(przeciw odrze, śwince i różyczce)
- ✓ **szczepionka "żywa"**
(z osłabionymi wirusami)

2 dawki: w 13 – 15 m.ż. i 6 r.ż.
osoba dorosła (nieszczepiona): 2 dawki w odstępie 4 tyg.

NIE ZAPOMNIJ O SZCZEPIENIACH!

DWIE DAWKI SZCZEPIONKI ZAPEWNIĄ NIEMAL 100% OCHRONĘ!

POWIKŁANIA

Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest większe u pacjentów z niedoborem odporności

- **ZAPALENIE PŁUC**
- **ZAPALENIE OSKRZELI**
- **BIEGUNKA (DZIECI)**
- **ZAPALENIE WĄTROBY (DOROŚLI)**
- **OSTRE ZAPALENIE MÓZGU**

- **ZAPALENIE KRTANI I TCHAWICY (KRUP)**
- **ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO (DZIECI)**
- **PODOSTRE STWARDNIAJĄCE ZAPALENIE MÓZGU**