

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 946/2020d z dnia 22.12.2020 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 80/2015 z dnia 08.05.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Monsanto Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita
Polska, tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.roundup.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie: (...).

Roundup Active 360

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli potasowej - **360 g/l (28,5%)**.

Zezwolenie MRiRW nr R - 80/2015 z dnia 08.05.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 946/2020d z dnia 22.12.2020 r.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Roundup Active 360 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych przed siewem lub sadzeniem, przed wschodami rośliny uprawnej (kukurydza, cebula), przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego i po zbiorze (ścierniska), a także w sadach (jabłoń, porzeczka czarna), na terenach nieużytkowanych rolniczo (ugorach i odłogach) i na użytkach zielonych (łąkach) oraz w uprawach leśnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych oraz sadowniczych z belką herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Active 360 jest nieselektywnym, dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnienie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1,33 l/ha: samosiewy zbóż.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1,5-2,0 l/ha (dotyczy chwastów w fazie siewki): komosa biała, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest plamisty.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 1,5-2,0 l/ha (dotyczy chwastów w fazie siewki): chwastnica jednostronna.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 2,7 l/ha: chwastnica jednostronna,,,,,, komosa biała, perz właściwy.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha: perz właściwy, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowaty, wyczyniec polny.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 4,0 l/ha:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, wiechlina roczna, starzec zwyczajny, przetacznik perski, wyczyniec polny, jasnota purpurowa, wiechlina łąkowa, ostrożeń polny, przytulia polna, rdest ptasi, perz właściwy.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 4,0 l/ha:

turzyca owłosiona, mniszek pospolity.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha:

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia polna, rdest plamisty, starzec zwyczajny, przetacznik perski, wyczyniec polny, tasznik pospolity, rdest ptasi, perz właściwy, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha:

turzyca owłosiona, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 6,0 l/ha:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia polna, rdest plamisty, wiechlina roczna, starzec zwyczajny, przetacznik perski, wyczyniec polny, wiechlina łąkowa, rdest ptasi, perz właściwy, turzyca owłosiona, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty zwalczane w uprawach leśnych

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha m.in.: borówka czarna, malina właściwa, trzcinnik piaskowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Pola uprawne wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy gleby lub ograniczyć ją do włókowania.

B. Pola uprawne - wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.

KUKURYDZA

Termin stosowania: Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po siewie na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

UWAGI

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
4. Środka nie stosować w uprawie kukurydzy cukrowej.

CEBULA (Z SIEWU)

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

UWAGI

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

C.1 Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

PSZENICA OZIMA

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

C.2. Desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: **200 - 300 l/ha.**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

UWAGI:

1. Dawki środka dostosować do nasilenia występowania i składu gatunkowego chwastów występujących na polu.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

D. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.

D.1. Zwalczanie chwastów

UWAGA:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu właściwego zwalczania chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: **200 - 300 l/ha.**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

D.2. Desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować środka w na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.

E. Pola uprawne - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów

ŚCIERNISKA (po pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i rzepaku ozimym)

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 4,0 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów. Przy czym dawkę 1,33 l/ha stosować przy niewielkim zachwaszczeniu i do zwalczania samosiewów zbóż.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

F. Rośliny sadownicze

Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

CZARNA PORZECZKA

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 6,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JABŁOŃ

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 6,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

G. Tereny nieużytkowane rolniczo likwidacja ugorów i odlogów

Termin stosowania:

wiosna - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania,

jesień - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 5,0 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

H. Użytki zielone - łąki

Środek stosuje się do na użytkach zielonych przeznaczonych do odnowienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,0 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

I. Uprawy leśne

Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne

Termin stosowania: Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu. Dawkę środka dostosować do uciążliwości występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 6,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

Uprawy leśne z wieloletkami różnych gatunków

Termin stosowania: Zabieg wykonać w sierpniu lub we wrześniu stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.

Po zakończeniu rocznego przyrostu wieloletek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu pąka szczytowego to jest na przełomie sierpnia i września), środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon) stosując tylko dawkę 3,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste.**

UWAGA

Zabiegi w uprawach leśnych wykonywać podczas bezdeszczowej najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano środek **Roundup Active 360** można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnienie), jednak nie wcześniej niż po 3 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem **1 godziny** po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Mieszaniny środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas używania produktu

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

- w przypadku stosowania środka przed zbiorem roślin uprawnych (rzepak, pszenica) - na teren potraktowany środkiem nie wchodzić przez **7 dni**,
- w pozostałych przypadkach - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
- na użytki zielone i łąki nie wprowadzać zwierząt gospodarskich przez **5 dni**.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rzepak – **7 dni**,

pszenica – **10 dni**

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -