Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 28 września 2026 r.

Znak sprawy: DHR.rs1.8200.2.2026
DHR.rs2.8202.64.2026

ZEZWOLENIE nr R – 129/2026

Na podstawie art. 41 w związku z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009[1] (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin[2] (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 stycznia 2026 r. (uzupełnionego w dniu 10 lutego 2026 r.) wraz z korektą z dnia 17 sierpnia 2026 r. złożonego przez spółkę FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. Avda. del Cadí, 19-23. Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Olèrdola BARCELONA, Królestwo Hiszpanii zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz wniosku z dnia 17 sierpnia 2026 r. złożonego zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **SUMIFLY OD**

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. Avda. del Cadí, 19-23. Pol. Ind. Sant Pere Molanta. 08799 Olèrdola Barcelona, Królestwo Hiszpanii
Producent środka ochrony roślin:	FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. Avda. del Cadí, 19-23. Pol. Ind. Sant Pere Molanta. 08799 Olèrdola Barcelona, Królestwo Hiszpanii
Rodzaj środka ochrony roślin:	insektycyd

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2026 r. poz. 624, t.j.)

Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni
Substancja czynna:	*Paecilomyces fumosoroseus*, szczep FE9901 - 86 g/L* *zawiera co najmniej $5x10^8$ CFU/ml
Państwo członkowskie odniesienia, z którego następuje wzajemne uznanie zezwolenia:	Republika Francji
Numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin w państwie członkowskim odniesienia, wraz z datą jego wydania:	nr 2200569 z dnia 3 grudnia 2020 r. wraz z decyzjami z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz 21 października 2022 r.
Nazwa handlowa środka ochrony roślin, wprowadzanego do obrotu w państwie członkowskim odniesienia:	FB FE9901 OD
Okres ważności środka ochrony roślin:	36 miesięcy w temperaturze poniżej 4°C 24 miesiące w temperaturze 4°C - 26°C

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał, z którego wykonane jest opakowanie, w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
250 ml - 10 l	HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 31 maja 2028 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011[3], zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008[4].

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia oraz numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie, po każdym wydaniu takiej decyzji.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 – Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 – Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 – Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 – Okresy karencji.

Załącznik nr 5 – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

---

[3] Rozporządzenie komisji (UE) Nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. *w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin* (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176)

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. *w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006* (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Załącznik nr 6 – Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 – Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 – Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 9 – Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 – KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

Środek ochrony roślin nie został zaklasyfikowany do żadnej z klas i kategorii zagrożenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: brak.

Hasło ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

brak

Zawiera *Paecilomyces fumosoroseus*. Mikroorganizmy mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD biologiczny w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD) o działaniu kontaktowym.

Substancją czynną środka są zarodniki entomopatogennego grzyba *Paecilomyces fumosoroseus*, szczep FE9901. Po zastosowaniu środka zarodniki grzyba przylegają do owadów i po skiełkowaniu wrastają bezpośrednio przez kutykulę do wnętrza ciała owada - gospodarza. Tutaj grzybnia rozrasta się i penetruje cały organizm szkodnika, pozbawiając go substancji odżywczych i wody, uwalniane są przy tym enzymy i substancje antybiotyczne. W konsekwencji zakażony owad ginie. We właściwych warunkach środowiskowych zwalczane szkodniki giną po 3-5 dniach.

Grzyb rozwija się dalej i zarodnikuje na martwym ciele owadów, co może być widoczne w postaci nalotu grzybni i zarodników.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna środka należy do grupy UNF.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza szklarniowego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego) bądź innych opryskiwaczy przeznaczonych do stosowania w uprawach pod osłonami.

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Ogórek (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

wciornastek zachodni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha (0,375-2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Cukinia, melon, arbuz, dynia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

wciornastek zachodni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Pomidor (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha (0,375-2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Papryka, oberżyna (syn. bakłażan) (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Rośliny ozdobne, w tym chryzantema i mieczyk (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
wciornastek zachodni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek jest produktem biologicznym (zawiera mikroorganizm jako substancję czynną) i może wykazywać zmienny poziom działania, w tym wyłącznie działanie ograniczające występowania szkodnika. W konsekwencji środek nie powoduje natychmiastowej redukcji populacji szkodnika, ale sukcesywnie obniża jego liczebność.

2. Stosowane środka należy rozpocząć natychmiast po zaobserwowaniu obecności pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania. Zabieg należy wykonywać wcześnie rano lub późnym popołudniem.

3. W razie konieczności zabiegi środkiem powtarzać co 5-7 dni. W przypadku mniejszego zagrożenia interwał pomiędzy zabiegami można wydłużyć do 15 dni.

4. Środek działa wyłącznie kontaktowo, dlatego celem zapewnienia skutecznego działania bardzo ważne jest dokładne pokrycie chronionych roślin cieczą użytkową. Rośliny należy opryskiwać do całkowitego zwilżenia.

5. Przed zastosowaniem środka w uprawie chronionej produktami zawierającymi parazytoidy szkodników należy skonsultować się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

6. Środka nie stosować w mieszaninie z grzybobójczymi środkami ochrony roślin. W przypadku łącznego stosowania środka ze środkami ochrony roślin z innych grup użytkowych oraz z innymi produktami np. nawozami przed wykonaniem zabiegu wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem celem wykluczenia ewentualnych negatywnych skutków wykonania takiej aplikacji.

7. Należy zachować co najmniej trzydniowy odstęp przed i po zabiegu środkiem a stosowaniem innych środków ochrony roślin, w tym szczególnie środków grzybobójczych.

8. Ryzyko uodpornienia się zwalczanych szkodników na substancję czynną środka określone jest jako niskie. Wskazane jest jednak, aby stosowanie środka było tylko jednym z elementów realizowanego zintegrowanego programu ochrony roślin przed szkodnikami.

9. Zalecane dawki środka w ochronie pomidora i ogórka odnoszą się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu roślin, określanej jako „powierzchnia ściany liści” – LWA:

$$\text{Powierzchnia ściany liści } [m^2/ha] = \frac{\text{2 x wysokość opryskiwanej ściany liści [m] x 10 000 } [m^2/ha]}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$$

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści - LWA:

$$\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l/10 000 m}^2\text{]} = \frac{\text{Ilość środka [l/ha] x 10 000 [m}^2\text{/ha]}}{\text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}$$

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha uprawy (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

$$\text{Ilość środka [l/ha]} = \frac{\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l/10 000 m}^2\text{] x powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}{\text{10 000 [m}^2\text{/ha]}}$$

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy każdorazowo wyliczyć rzeczywistą powierzchnię ściany liści (LWA) i dawkę przestrzenną na powierzchnię uprawy, na której środek ma być zastosowany.

Nie należy przekraczać maksymalnych zalecanych dawek środka na 1 ha powierzchni płaskiej uprawy, nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia, papryka, pomidor, oberżyna – 1 dzień.

Fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna – 3 dni.

Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na oddziaływanie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.

Środek nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością.

Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronę dróg oddechowych (maski typu FFP2/FFP3) oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej i wykonywania zabiegu oraz podczas czyszczenia sprzętu użytego do aplikacji.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą podczas wchodzenia na obszar po zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
8 godzin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Załącznik nr 7 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający: kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w suchym, wentylowanym miejscu, a jeśli to możliwe w chłodni,
- w temperaturze do 26°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

<u>Zatrucie może powodować:</u>
nudności, wymioty, ból głowy, ucisk w skroniach, ucisk w okolicy policzkowej i ucisk w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, szyi i klatki piersiowej, uczucie gorąca, dreszcze i sporadycznie skurcz oskrzeli.

Wskazówki terapeutyczne dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia:

- w przypadku połknięcia, dekontaminacja przewodu pokarmowego zależnie od tego czy poszkodowany jest przytomny,
- leczenie objawowe.

Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia
Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia
Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Załącznik nr 9 – ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Ogórek (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści - LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha (0,375-2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Cukinia, melon, arbuz, dynia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik szklarniowy, *mączlik ostroskrzydły*, *wciornastek zachodni*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Pomidor (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha (0,375-2,25 l/ha na 10 tys. m^2 ściany liści – LWA).

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Papryka, oberżyna (syn. bakłażan) (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)

mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).

Liczba zabiegów: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Rośliny ozdobne, w tym chryzantema i mieczyk (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-2,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w całym sezonie uprawy, po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania (BBCH 10-99).
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w wyżej wymienionych uprawach).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 stycznia 2026 r. złożonym zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. Avda. del Cadí, 19-23. Pol. Ind. Sant Pere Molanta. 08799 Olèrdola BARCELONA, Królestwo Hiszpanii wystąpiła o wzajemne uznanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin NoFly OD.

W toku prowadzonego postępowania pełnomocnik spółki, korektą wniosku z dnia 17 sierpnia 2026 r., wystąpił o zmianę nazwy środka z „**NoFly OD**" na „**SUMIFLY OD**", co zostało uwzględnione w przedmiotowym zezwoleniu.

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 29 przedmiotowego rozporządzenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenia dla tego samego środka ochrony roślin, takiego samego zastosowania i przy zastosowaniu porównywalnych praktyk rolnych w innym państwie członkowskim.

Przedmiotowy środek pod nazwą handlową FB FE9901 OD dopuszczony jest do obrotu w Republice Francuskiej zezwoleniem nr 2200569 z dnia 3 grudnia 2020 r.

W toku postępowania administracyjnego stwierdzono spełnienie wymagań w zakresie wzajemnego uznania zezwolenia określonych w art. 40-42 rozporządzenia nr 1107/2009.

Na podstawie informacji uzyskanej z właściwego urzędu Republiki Francji w dniu 3 lutego 2026 r. potwierdzono, że w skład środka nie wchodzą składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Jednocześnie, przy podejmowaniu decyzji w przedmiotowej sprawie wzięto pod uwagę informacje i dane oraz oceny, dotyczące stosowania substancji czynnej *Paecilomyces fumosoroseus*, szczep FE9901 w ochronie roślin w Polsce, znajdujące się w posiadaniu organu wydającego niniejsze zezwolenie.

Ponadto, posiadacz zezwolenia zobligowany jest przez urząd Republiki Francuskiej do przedłożenia informacji i danych dotyczących:
- oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego według wytycznej SANCO12116/2012 wraz z metodą walidacji metod, przed i po przechowywaniu przez 36 miesięcy w temperaturze 4°C oraz przed i po przechowywaniu przez 24 miesiące w temperaturze 26°C;
- właściwości technicznych produktu FB FE9901 OD (koncentrat w formie zawiesiny olejowej) przed i po przechowywaniu przez 36 miesięcy w temperaturze 4°C.

W związku z powyższym posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do przedłożenia identycznego pakietu danych oraz wyniku oceny wykonanej przez urząd Republiki Francuskiej. Stosowane dane należy przedłożyć w Polsce niezwłocznie po ich przekazaniu do urzędu Republiki Francuskiej, zaś wynik ich oceny, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia oceny przez urząd

Republiki Francuskiej. Brak przedłożenia stosownych danych lub uzyskania pozytywnej oceny przedłożonych danych, może skutkować zmianą warunków przedmiotowego zezwolenia albo jego wycofaniem z obrotu prawnego.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011[5], termin ważności zezwolenia upływa z dniem 31 maja 2028 r.

Dodatkowo wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2026 r. złożonym zgodnie z art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009, spółka FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. wystąpiła o uwzględnienie w zezwoleniu zastosowania środka w ochronie: pomidora, papryki, oberżyny w ochronie przed mączlikiem ostroskrzydłym (w uprawie pod osłonami typu szklarnia) oraz ogórka, cukinii, melona, arbuza, dyni oraz roślin ozdobnych w ochronie przed mączlikiem szklarniowym i mączlikiem ostroskrzydłym (w uprawie pod osłonami typu szklarnia) a także fasoli, grochu, soczewicy w ochronie przed mączlikiem szklarniowym, mączlikiem ostroskrzydłym i wciornastkiem zachodnim (w uprawie pod osłonami typu szklarnia), co zostało uwzględnione w niniejszej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę środek może być stosowany w rozszerzonym zakresie w powyższych uprawach przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Pismem z dnia 23 września 2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce FUTURECO BIOSCIENCE, S.A., w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)[6], został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 25 września 2026 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wniósł uwag.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

[5] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. *w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych* (Dz. Urz. UE L 153 z 11.06.2011, str. 1, z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, t.j.)

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej[7].

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 §1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[8] albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Smaczyński
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:
(za zwrotnym dowodem doręczenia)

[7] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2026 r. poz. 143, z późn. zm.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych