

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -134/2025d z dnia 10.02.2025 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2018 z dnia 31.01.2018 r.

Posiadacz zezwolenia:

SP Sourcon Padena GmbH, Sindelfinger Strasse 3, 72070 Tübingen, Niemcy, tel: +49 7071 975520,
www.sourcon-padena.com

Proradix

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 (związek mikrobiologiczny) – 6,6 x 10¹⁰ jtk/g

**Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2018 z dnia 31.01.2018 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -134/2025d z dnia 10.02.2025 r.**

EUH208	Zawiera <i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260	Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P361	Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P264	Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P314	W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie (WP).

Środek zawiera bakterie *Pseudomonas* sp. DSMZ 13134, które występują naturalnie w środowisku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego.

Ziemniak

Rizoktonioza ziemniaka

Środek może być zastosowany w formie aerozolu podczas sadzenia lub jako zaprawa do zaprawiania sadzeniaków przed sadzeniem.

Stosowanie przed sadzeniem:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 g/100 kg bulw.

Liczba zabiegów: 1

lub

Stosowanie w trakcie sadzenia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOObszarowych

**Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik**

Truskawka (uprawa w szklarni)

Twarda zgnilizna owoców

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy dwóch liści do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 12-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe + namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 10000-20000 l/ha.

Większa objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, rzodkiew, chrzan pospolity (uprawa w szklarni)

Fuzarioza, rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie BBCH 12 -81 tj. w przypadku:

- buraka ćwikłowego – od fazy dwóch liści do fazy początku dojrzewania;
- rzodkwi – od fazy dwóch liści do fazy początku dojrzewania;
- chrzanu pospolitego – od fazy dwóch liści do fazy początku dojrzewania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.

Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.

Większa objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pomidor, bakłażan, papryka (uprawa w szklarni)

Fuzarioza, rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy dwóch liści do początku fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową wielkość (BBCH 12-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.

Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.

Większa objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ogórek, cukinia, dynia zwyczajna, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa (uprawa w szklarni)

Fuzarioza, rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy dwóch liści do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 12-88).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe + namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 10000-20000 l/ha.

Większa objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Salata głowiasta, salata liściowa, cykoria korzeniowa, cykoria салатowa, rukola, endywia, roszponka warzywna, gorczyca uprawiana na młode liście, portulaka warzywna, burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, burak liściowy (w tym uprawiany na młode liście) (uprawa w szklarni)

Rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie BBCH 12 – 42 tj. w przypadku:

- sałaty liściowej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- sałaty głowiastej - od fazy 2 liści do fazy gdy główka osiągnie 20% typowej wielkości;
- cykorii korzeniowej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- cykorii салатowej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- rukoli - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- endywi - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- rzeżuchy ogrodowej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- roszponki warzywnej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- gorczycy - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- portulaki warzywnej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- buraka ćwikłowego przeznaczonego na liście - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- buraka liściowego (w tym uprawianego na młode liście) - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.

Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.
Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szpinak (w tym uprawiany na młode liście) (uprawa w szklarni)

Rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować po siewie do końca fazy 8 liści (BBCH 00 – 18).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.
Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.
Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.
Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.
Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, brokuł zwyczajny, kalarepa, jarmuż, brukiew, rzepa, gorczyca (uprawa w szklarni)

Fuzarioza, rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie BBCH 12-42 tj. w przypadku:
– kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej - od fazy 2 liści do fazy gdy główka osiągnie 20% typowej wielkości;
– kapusty brukselskiej - od fazy 2 liści do końca fazy początku rozwoju pędów bocznych;
– kalafiora, brokuła - od fazy 2 liści do końca fazy początku rozwoju główki o szerokości wierzchołka $1 > \text{cm}^3$;
– kalarepy - od fazy 2 liści do fazy gdy korzeń osiąga 20% typowej średnicy;
– jarmużu - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
– brukwi, rzepy - od fazy 2 liści do fazy gdy korzeń osiąga 20% typowej średnicy;
– gorczycy - od fazy 2 liści do końca fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.
Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.
Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.
Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.
Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pietruszka uprawiana na nać, szczypiorek, czosnek pospolity, szalotka, rzeżucha ogrodowa, koper włoski, koper ogrodowy, seler listkowy, szczaw (uprawa w szklarni)

Fuzarioza, rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie BBCH 12-42 tj. w przypadku:
– pietruszki uprawianej na nać - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej

typowej odmiany;

- szczypiorku - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany
- czosnek pospolity - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- rzeżuchy ogrodowej - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- kopru włoskiego - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- kopru ogrodowego - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- selera listkowego - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany;
- szczawiu - od fazy dwóch liści do fazy gdy osiągnięte zostaje 20% masy liściowej typowej odmiany.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 2000 – 20000 l/ha.

Niższą objętość wody stosować w przypadku zraszania.

Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny ozdobne doniczkowe (uprawa w szklarni)

Rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku wegetacji do fazy bezpośredniego wejścia w stan spoczynku (BBCH 00 – 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe, zraszanie, namaczanie korzeni.

Zalecana ilość wody: 10000-20000 l/ha.

Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty (uprawa w szklarni)

Rizoktonioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100-125 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku wegetacji do fazy bezpośredniego wejścia w stan spoczynku (BBCH 00 – 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 15-30 dni.

Metoda zabiegu: nawadnianie kropelkowe + namaczanie korzeni

Zalecana ilość wody: 10000-20000 l/ha.

Większą objętość wody stosować w przypadku nawadniania kropelkowego.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

1. Środek zawiera żywy mikroorganizm jak substancję czynną i wykazuje średni poziom zwalczania lub ogranicza występowanie choroby.
2. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy podczas postępowania z zaprawionymi sadzoniakami.
3. Maksymalna norma sadzenia bulw traktowanych środkiem wynosi 3 t/ha.
4. Zaprawione sadzoniaki nie powinny być naruszane bez istotnej przyczyny.
5. Nie stosować zaprawionych sadzoniaków jako pożywienia lub paszy.
6. Zabezpieczyć zaprawione sadzoniaki przed dostępem ludzi, zwierząt domowych / hodowlanych oraz dzikich w każdym przypadku przechowywania lub użytkowania.
7. Otwarte opakowanie zużyć w przeciągu kilku dni.
8. Opakowań lub zbiorników, które były używane do zaprawy nasion nie stosować ponownie do pożywienia lub paszy.
9. Nie mieszać środka z produktami zawierającymi związki miedzi.
10. W celu uzyskania informacji o możliwości mieszania z innymi środkami należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY UŻYTKOWEJ I SPOSÓB STOSOWANIA

Aby sporządzić zawiesinę użytkową do namaczania/moczenia korzeni, nawadniania kropelkowego i zraszania oraz metod aplikacji środka poprzez: namaczanie/moczenie korzeni, nawadnianie kropelkowe lub zraszanie należy:

1. Napełnić wiadro lub inne naczynie wodą w ilości 1 litra. Następnie dodać wymaganą ilość środka i rozmieszać. Dodać kolejny 1 litr wody i kontynuować mieszanie przez co najmniej 10 minut do momentu całkowitego rozprowadzenia środka.
2. Woda użyta do przygotowania zawiesiny powinna mieć temperaturę 15-25°C.
3. Przed zastosowaniem upewnić się, że sprzęt do aplikacji jest czysty.

Stosowanie do zaprawiania sadzoniaków przed sadzeniem (zaprawianie bulw):

Napełnić zbiornik rozpylacza w systemie ultraniskoobjętościowego stosowania (ULV) (spray o niskiej objętości/Mafex) zawiesiną środka i wody, i kontynuować dopełnianie zbiornika rozpylacza wymaganą ilością wody. Środek winien być stosowany przy maksymalnej dawce 2 g/100 kg sadzoniaków (co odpowiada ilości 20 g środka na tonę bulw). Sugerowana ilość wody dla sprzętu do ultraniskoobjętościowej aplikacji wynosi 2-4 l / na tonę bulw. Środek należy rozpylać bezpośrednio na sadzoniaki transportowane na taśmie przesuwałowej się po stole rolkowym (lub na podobnym urządzeniu).

Stosowanie podczas sadzenia (ziemniak):

Napełnić zbiornik rozpylacza zawiesiną środka i wody i kontynuować dopełnianie zbiornika rozpylacza wymaganą ilością wody. Środek powinien być stosowany w maksymalnej dawce 60 g/ha z odpowiednią ilością wody. W celu uzyskania odpowiedniej ilości zawiesiny użytkowej, zaleca się dodatek 50 – 80 l/ha. W wyjątkowych przypadkach wymagana może być większa ilość wody. Zawiesina powinna być wstrząsana do czasu zakończenia rozpylania. Zawiesinę należy rozpylać bezpośrednio na bulwy podczas sadzenia.

Stosowanie środka w roślinach małoobszarowych

a) Stosowanie środka poprzez moczenie korzeni.

Namaczanie korzeni jest przeznaczone tylko do pierwszej aplikacji. W celu sporządzenia zawiesiny wodnej należy rozcieńczyć produkt w części wymaganej objętości wody i dobrze wymieszać roztwór. Dodać całkowitą ilość wody wymaganej do zabiegu i ciągle mieszać, aby uzyskać jednorodny roztwór. Namaczać korzeń przez 1,5 minuty, upewniając się, że korzeń jest zanurzony w roztworze. Objętość aplikacji 10000 l / ha. Zaleca się przygotowanie roztworu na 3-6 godzin (maksymalnie 24 godziny) przed zastosowaniem. Używać wody o temperaturze 15–25°C.

b) Stosowanie środka poprzez nawadnianie kropelkowe

Rozcieńczyć produkt w części wymaganej objętości wody i dobrze wymieszać roztwór. Dodać całkowitą ilość wody wymaganej do zabiegu i ciągle mieszać, aby uzyskać jednorodny roztwór. Objętość wody

10000-20000 l / ha. Zaleca się przygotowanie roztworu na 3-6 godzin (maksymalnie 24 godziny) przed zastosowaniem. Używać wody o temperaturze 15–25 ° C. Upewnić się, że rura ociekowa ma 1 kroplownik na roślinę.

c) Stosowanie środka poprzez zraszanie

Rozcieńczyć produkt w części wymaganej objętości wody i dobrze wymieszać roztwór. Dodać całkowitą ilość wody wymaganą do zabiegu i ciągle mieszać, aby uzyskać jednorodny roztwór. Najpierw nawodnić, aby warzywa były całkowicie mokre (1-2 mm nawadniania; następnie nałożyć produkt (2000 l / ha); następnie natychmiast po aplikacji nawodnić (2-3 mm nawadniania), aby uzyskać jednolitą dystrybucję produktu na poziomie korzenia. Zaleca się przygotowanie roztworu na 3-6 godzin (maksymalnie 24 godziny) przed zastosowaniem. Używać wody o temperaturze 15–25 ° C.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Resztki zawiesiny oraz wodę użytą do mycia sprzętu do aplikacji należy:

- jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wmyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (jednorazowe filtry ochronne twarzy co najmniej EN149 FFP3 lub odpowiednie) oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania zaprawy oraz w trakcie zaprawiania.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochron roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Stosowanie przed sadzeniem:

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

- zaprawione bulwy muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane bulwy.

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować/składować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak asfalt, beton, bruk, torowiska, i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

WARUNKI PRZECHEWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze:
 - poniżej -20°C (12 miesięcy) lub
 - w temperaturze -20°C do 4°C (6 miesięcy) lub
 - w temperaturze 4°C - 25°C (3 miesiące),

- z dala od źródeł ciepła,
- w suchym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności:

- 12 miesięcy przy przechowywaniu środka w temp. poniżej -20°C,
- 6 miesięcy w temp. -20°C do 4°C,
- 3 miesiące w temp. 4°C - 25°C.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -