



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Znak sprawy: DHR.rs1.8208.3.43.2026

ZEZWOLENIE nr R-117/2026

Na podstawie art. 28 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku spółki Pestila Sp. z o. o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz z dnia 18 maja 2026 r.

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **ARES 200 SL**.

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Nazwa środka referencyjnego:	PIORUN 200 SL
Numer zezwolenia MRiRW środka referencyjnego wraz z datą wydania:	R-43/2026 z dnia 24 lutego 2026 r.
Posiadacz zezwolenia:	Pestila Sp. z o. o. Studzianki 24A 97-320 Wolbórz
Producent środka ochrony roślin:	Pestila Sp. z o. o. Studzianki 24A 97-320 Wolbórz
Rodzaj środka ochrony roślin:	insektycyd

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2026 r. poz. 624 t.j.)

Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni
Substancje czynne:	acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,48 %)
Okres ważności środka ochrony roślin	2 lata

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał, z którego wykonane jest opakowanie, w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
250 ml – 20 l	HDPE, HDPE/PA, f-HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem **28 lutego 2034 r.**

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer i datę wydania zezwolenia oraz numer i datę ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie, po każdym wydaniu takiej decyzji.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

OBOWIAZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji i następstwo roślin.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 9 – Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4:
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
2. Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1:
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2:
H319 – Działa drażniąco na oczy.
4. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2:
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
5. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1:
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS07, GHS08, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302, H317, H319, H361d, H410

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P391 – Zebrać wyciek.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczona jest do grupy 4A.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Oberżyna (syn. bakłazan)

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek, chowacz czterożębny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania pędu (brak międzywęźli) do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).

Liczba zabiegów: 1

słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy pąkowania do fazy początku kwitnienia rzepaku (BBCH 50-61).

Liczba zabiegów: 1

chowacz podobnik, przyszczarek kapustnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodników na plantację, zgodnie z sygnalizacją, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).

Liczba zabiegów: 1

Uwaga:

Środek w dawce 0,1 l/ha wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie rzepaku ozimego przed pryszczarkiem kapustnikiem i chowaczem podobnikiem.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ziemniak

stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy rozwoju owoców (50% zawiązanych jagód) (BBCH 35-75). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku nasilonego występowania szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń

zwójka siatkóweczka i inne gatunki zwójek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego wylęgu gąsienic, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71-81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego lotu motyli i składania jaj przez samice oraz rozwoju larw na tzw. „czarną główkę”, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy

powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm aż do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

owocnica jabłkowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w okresie lotu szkodnika i składania jaj oraz wylęgu larw, zgodnie z sygnalizacją, od fazy pełni kwitnienia - przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki do końca fazy kwitnienia - wszystkie płatki opadły (BBCH 65-69).

Liczba zabiegów: 1

mszyca jabłoniowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszycy, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 56- 81).

Liczba zabiegów: 1

bawełnica korówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,18 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodnika, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 56- 81).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Przy ustalaniu wielkości kropel cieczy użytkowej należy uwzględnić ograniczenia wymienione w akapicie dotyczącym środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

Termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników, z uwzględnieniem progów szkodliwości.

Zalecana dawka środka w ochronie jabłoni i innych drzew ziarnkowych odnosi się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu nasadzeń, określanej jako „powierzchnia ściany liści” – LWA:

Powierzchnia ściany liści [m ² /ha]	=	$\frac{2 \times \text{wysokość opryskiwanej ściany liści [m]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$
--	---	--

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści (LWA):

Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l / 10 000 m ²]	=	$\frac{\text{Ilość środka [l/ha]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}$
---	---	--

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha uprawy (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka [l/ha]	=	$\frac{\text{Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l / 10\,000 m}^2\text{]} \times \text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}{10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}$
---------------------	---	--

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy każdorazowo wyliczyć rzeczywistą powierzchnię ściany liści (LWA) i dawkę przestrzenną dla kwatery/sadu, na której /w którym środek ma być zastosowany.

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki środka na 1 ha powierzchni płaskiej sadu, nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (ACh) – wg klasyfikacji IRAC grupa 4A).

W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników zaleca się m. in.:

- stosować środek wyłącznie w zalecanych dawkach i terminach,
- nie przekraczać maksymalnej zalecanej liczby zabiegów w sezonie,
- nie powtarzać w danym sezonie wegetacyjnym zabiegów z użyciem środków, zawierających substancje czynne, które ze względu na mechanizm działania należą do tej samej grupy co acetamipryd (grupa 4A wg klasyfikacji IRAC),
- w przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu (w tym powtórzenia zabiegu celem zwalczania tego samego szkodnika), zastosować środek zawierający substancję czynną o innym mechanizmie działania, z innej grupy wg klasyfikacji IRAC.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Rzepak ozimy, rzepak jary, rzepik – 50 dni,

ziemniak – 30 dni,

jabłoń, jabłoń płonka (syn. dzika), grusza, grusza chińska, nieszpuka zwyczajna, pigwa pospolita – 14 dni,

oberżyna syn. bakłażan (w uprawie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża) – 3 dni,

len zwyczajny (w uprawie na włókno), konopie siewne (w uprawie na włókno), rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych, rośliny szkółkarskie ozdobne, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach, wierzba energetyczna (wiciowa), wierzba purpurowa (syn. wiklina) – nie dotyczy.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji – rośliny następcze można siać lub uprawiać po 30 dniach od ostatniego zabiegu środkiem zawierającym acetamipryd.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wkraczania na obszar po zabiegu przez 24 godziny od jego wykonania.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

Rzepak ozimy, ziemniak, rzepak jary w dawce nieprzekraczającej 0,12 l/ha, rzepik w dawce nieprzekraczającej 0,12 l/ha

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rzepak jary w dawce 0,25 l/ha lub 0,3 l/ha, rzepik w dawce 0,25 l/ha lub 0,3 l/ha

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Len zwyczajny, konopie siewne

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Jabłoń, jabłoń płonka (syn. dzika), grusza, grusza chińska, pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna, wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (z wyłączeniem zastosowań w fazach wzrostu BBCH 71-81 w dawce 0,125 l/ha)

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Jabłoń, jabłoń płonka (syn. dzika), grusza, grusza chińska, pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna, (zastosowania w fazach wzrostu BBCH 71-81 w dawce 0,125 l/ha)

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Oberżyna (syn. bakłażan)

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 5°C - 25°C.

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc/ lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub styczości: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Załącznik nr 8 - POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary, rzepik

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania pędu (brak międzywęźli) do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).

Liczba zabiegów: 1

ślodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy pąkowania do fazy początku kwitnienia rzepaku (BBCH 50-61).

Liczba zabiegów: 1

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodników na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od fazy żółtego pąka do fazy, gdy około 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 59-71).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Len zwyczajny (w uprawie na włókno)

wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się szkodników, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania pędu do fazy początku kwitnienia - 10% kwiatów jest otwartych (BBCH 30-61).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Konopie siewne (w uprawie na włókno)

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy główny pęd osiąga 90% ostatecznej długości do fazy, gdy są wyodrębnione pięcioczętonowe działki kielicha kwiatów męskich, ale pąki kwiatowe nadal zamknięte (BBCH 39-59).

Liczba zabiegów: 1

wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, w momencie pojawienia się szkodników lub zaobserwowaniu pierwszych objawów ich żerowania, od fazy, gdy główny pęd osiąga 90% ostatecznej długości do fazy, gdy są wyodrębnione pięcioczętonowe działki kielicha kwiatów męskich, ale pąki kwiatowe nadal zamknięte (BBCH 39-59).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń płonka (syn. dzika)

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 56-81).

Liczba zabiegów: 1

owocówka jabłkowieczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści – LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego lotu motyli i składania jaj przez samice oraz rozwoju larw na tzw. „czarną główkę”, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

toczyk gruszowiaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000

m²powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy różowego pąka do fazy końca kwitnienia - wszystkie płatki opadły (BBCH 57-69).

Liczba zabiegów: 1

owocnica jabłkowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w okresie lotu szkodnika i składania jaj oraz wylęgu larw, zgodnie z sygnalizacją, od fazy pełni kwitnienia - przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki do końca fazy kwitnienia - wszystkie płatki opadły (BBCH 65-69).

Liczba zabiegów: 1

pryszczarek jabłoniak

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,083 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do fazy początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

ogrodnica niszczylistka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od fazy gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Grusza, grusza chińska

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 56-81).

Liczba zabiegów: 1

zwójki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego wylęgu gąsienic, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego lotu motyli i składania jaj przez samice oraz rozwoju larw na tzw. „czarną główkę”, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

śluzownica ciemna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,135 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych larw, od fazy, zgodnie z sygnalizacją, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 1

pryszczarek gruszowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

kwiecień gruszowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,083 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować na chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają - łuski pąkowe wydłużone, z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 51-59).

Liczba zabiegów: 1

miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,083 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, w okresie występowania owadów dorosłych, a później larw, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają - łuski pąkowe wydłużone, z jasnobrązowymi przebarwieniami, do fazy gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 51-71).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,073 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,11 l/ha)

Termin stosowania: środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 56-81).

Liczba zabiegów: 1

owocówka jabłkowieczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,118 l/10 000 m²

powierzchni ściany liści - LWA (0,125 l/ha)

Termin stosowania: środek stosować w okresie masowego lotu motyli i składania jaj przez samice oraz rozwoju larw na tzw. „czarną główkę”, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm aż do fazy początku dojrzewania - wybarwianie się owoców (BBCH 71- 81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Oberżyna (syn. bakłażan) (w uprawie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie wystąpienia szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów ich żerowania, od początku fazy rozwoju pędów

bocznych–widoczny pierwszy pęd boczny pierwszego rzędu do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 21-89).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 1

Wierzba energetyczna (wiciowa), wierzba purpurowa (syn. wiklina)

mszyce, rynnica topolowa, rynnica wierzbowa, jątrewka pospolita, jątrewka wiklinówka, niekreślanka zielonka (wierzbówka), przyszczarek liściowiec (wierzbowskiak brzeżkowiak)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,11 l/ha

Termin stosowania: środek stosować momencie wystąpienia szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów ich żerowania, od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają, do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach

mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,19 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w momencie wystąpienia szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów ich żerowania, zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 maja 2026 r. spółka Pestila Sp. z o. o., z siedzibą w Studziankach, wystąpiła o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin ARES 200 SL.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy środek ochrony roślin jest identyczny ze środkiem PIORUN 200 SL produkcji spółki Pestila Sp. z o. o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz.

W toku postępowania administracyjnego potwierdzono, że środek ochrony roślin ARES 200 SL jest identyczny ze środkiem PIORUN 200 SL, stąd również spełnia wymogi określone w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁵, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 28 lutego 2034 r.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Pestila Sp. z o. o., z siedzibą w Studziankach, w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)⁶, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 25 sierpnia 2026 r., pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie nie wnosząc uwag.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁷.

⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

⁶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.)

⁷ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 t.j.)

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁸ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia – e-Doręczenia)

⁸ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2026 r. poz. 143 t.j.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych