



Znak sprawy: DHR.oz.8207.440.2025

Postanowienie nr 93/2026

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego¹ (dalej: k.p.a.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin)

postanawiam, z urzędu

sprostować, oczywistą omyłkę, w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-350/2026d z dnia 12 sierpnia 2026 r. znak: DHR.oz.8207.440.2025 zmieniającej zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-17/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Erune**, wydanej na rzecz spółki Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii, polegającą na błędnym podaniu w załączniku nr 2 – **OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** zalecanej ilości wody w uprawie gruszy, w następujący sposób:

1. załącznik nr 2 – **OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** do ww. zezwolenia w brzmieniu nadanym decyzją nr R-350/2026d z dnia 12 sierpnia 2026 r. otrzymuje poniższe brzmienie:

„Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna środka należy do grupy 9.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz polowych.

W przypadku ochrony jabłoni i gruszy można stosować środek również przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

¹ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691);

² ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2026 r., poz. 624).

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha (0,82 l na 10 tys. m² LWA – ściany liści).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha (0,62 – 0,82 l na 10 tys. m² LWA – ściany liści).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji od fazy pęknięcia pąka (BBCH 53) do 56 dni przed zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp

między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 - 1000 l/ha

Grusza *parch*

gruszy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha (0,82 l na 10 tys. m² LWA – ściany liści).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha (0,62 – 0,82 l na 10 tys. m² LWA – ściany liści).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji od fazy pęknięcia pąka (BBCH 53) do 56 dni przed zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 - 1000 l/ha

Winorośl (w uprawie polowej) *szara pleśń*

(średni poziom zwalczania)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha (2,46 l na 10 tys. m² LWA – ściany liści) Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów występowania choroby, od końcowej fazy kwitnienia (80% kołpaczków opadłych) do początku fazy dojrzewania (jagody zaczynają przybierać kolor właściwy dla odmiany) (BBCH 68 – BBCH 81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Groch (na suche nasiona)

szara pleśń (średni poziom zwalczania)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Termin stosowania:

Środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów występowania choroby, od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60 – BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.”

Uzasadnienie

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-350/2026d z dnia 12 sierpnia 2026 r., znak sprawy: DHR.oz.8207.440.2025 wydaną na rzecz spółki Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii zostało zmienione zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-17/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Erune** w zakresie zmiany składu ww. środka ochrony roślin.

Jednocześnie organ w załączniku nr 2 – **OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** do ww. zezwolenia omyłkowo podał w uprawie gruszy zalecaną ilość wody 500-1000 l/ha, zamiast prawidłowej zalecanej ilości wody 700-1000 l/ha.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem e-Doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa – PIB
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych