



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.34.2026

DECYZJA nr R - 331/2026d

Na podstawie art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.¹ (dalej jako: rozporządzenie 1107/2009), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin², po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2026 r. złożonego przez spółkę Agrotecnologías Naturales S.L., Ctra T-214 s/n km 4,125, 43762 La Riera de Gaia, Tarragona, Królestwo Hiszpanii, w tym wniosku na uprawy małoobszarowe

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-86/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **TRICOTEN WP**, w następujący sposób:

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin,

Załącznik nr 4 - Okresy karencji,

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych,

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego,

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin,

otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2025 r. poz. 1709 t.j.).

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD - biologiczny środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), przeznaczony do ochrony roślin uprawnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek ochrony roślin jest klasyfikowany jako niskiego ryzyka w rozumieniu art. 47 rozp. 1107/2009. Substancją czynną środka jest naturalnie występujący, niepatogeniczny grzyb pochodzenia glebowego - *Trichoderma atroviride* AT10.

Grzyby rodzaju *Trichoderma* są organizmami antagonistycznymi wobec wielu gatunków grzybów powodujących choroby roślin. Grzyby te zasiedlają strefę korzeniową roślin uprawnych i ograniczają w ten sposób szkodliwe działanie patogenów. Dlatego też istotne jest stosowanie środka zapobiegawczo, zanim rozpocznie się infekcja i kolonizacja strefy korzeniowej przez patogen.

Grzyby rodzaju *Trichoderma* zwalczają patogeny roślin poprzez konkutowanie o składniki pokarmowe i przestrzeń w strefie korzeniowej, jak również poprzez antybiozę i indukowanie reakcji odpornościowych w roślinach. Grzyby te mogą również pasożytować na patogenach roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania do gleby przy użyciu systemu nawadniającego.

Pomidor (uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

fuzaryjne więdnienie pomidora, fuzaryjna zgorzel pomidora powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały cykl uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po sadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres uprawy (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pomidor, osterżyna, papryka, sałata, cebula, dynia, tytoń, marchew, porzeczka, agrest, porzeczkoagrest, borówka, żurawina, malina, truskawka, poziomka, malinojeżyna, morwa, jeżyna - 1 dzień.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na jego działanie i które zwróciły się o taką informację.

Środek nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub poddawane leczeniu lekami immunosupresyjnymi.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (co najmniej półmaskę filtrującą FFP3) oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

- 6 godzin w przypadku pola,
- 8 godzin w przypadku szklarni i upraw pod osłonami.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stref ochronnych nie wyznacza się, w przypadku zastosowania środka w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pomidor (uprawa w polu)

fuzaryjne więdnienie pomidora, fuzaryjna zgorzel pomidora powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji), ewentualnie jak najszybciej po posadzeniu, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres wegetacji (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Uwaga:

środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Oberżyna, papryka (uprawa w polu, uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

fuzaryjne więdnienie papryki, fuzaryjna zgorzel papryki powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres (cykl) uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres (cykl) uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po

posadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały przez cały pozostały okres wegetacji (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5.

Uwaga:

środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Sałata (uprawa w polu)

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy, od wysiewu do fazy, gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 01-49).

Liczba zabiegów: 5.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Cebula, marchew, borówka, malina, truskawka, poziomka, malinojeżyna, jeżyna (uprawa w polu, uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

*fuzaryjne więdnienie, fuzaryjna zgorzel powodowana przez grzyby rodzaju *Fusarium*; zgnilizna twardzikowa*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując dawkę 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały cykl uprawy rośliny uprawnej wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po

sadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres uprawy (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Metoda aplikacji: Środek stosować do gleby przy użyciu systemu nawadniającego (nawadnianie kropelkowe).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Dynia, tytoń, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, porzeczkoagrest, żurawina, morwa (uprawa w polu)

fuzaryjne więdnienie, fuzaryjna zgorzel powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium; zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując dawkę 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały cykl uprawy rośliny uprawnej wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po sadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres uprawy (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Metoda aplikacji: Środek stosować do gleby przy użyciu systemu nawadniającego (nawadnianie kropelkowe).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 marca 2026 r. spółka Agrotecnologías Naturales S.L., z siedzibą w Królestwie Hiszpanii, zwróciła się w trybie art. 51 rozporządzenia nr 1107/2009 o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Tricoten WP obejmujące zwalczanie fuzaryjnej zgorzeli powodowanej przez grzyby rodzaju *Fusarium*, fuzaryjnego wędnięcia i zgnilizny twardzikowej w uprawianych w polu, w szklarni i pod osłonami cebuli, marchwi, borówki, maliny, truskawki, poziomki, malinojeżyny, jeżyny oraz uprawianych w polu dyni, tytoniu, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, porzeczkoagrestu, żurawiny i morwy.

Środek ochrony roślin Tricoten WP we wnioskowanym zakresie stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt wynikającego z jego stosowania, pozostałości w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni a także nie wykazuje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na gatunki niebędące celem jego działania.

Dla proponowanego zakresu stosowania środka ochrony roślin Tricoten WP maksymalna dawka środka ochrony roślin, liczba wykonywanych zabiegów, odstęp pomiędzy zabiegami, sposób sporządzenie cieczy użytkowej, sposób aplikacji środka ochrony roślin oraz rodzaj sprzętu używanego do jego stosowania są zgodne z warunkami zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-86/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. na wprowadzenie środka ochrony roślin Tricoten WP do obrotu oraz decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 784/2025d z dnia 1 października 2025 r. Tym samym analiza ryzyka została oparta na ocenie ryzyka zawartej w raportach rejestracyjnych wykonanych w ww. zakresach na potrzeby wydania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-86/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. na wprowadzenie środka ochrony roślin Tricoten WP do obrotu oraz decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 784/2025d z dnia 01 października 2025 r.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowy środek ochrony roślin spełnia wymagania określone w art. 29 i w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1107/2009.

Środek ochrony roślin Tricoten WP może być stosowany w rozszerzonym na uprawy małoobszarowe zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Ponadto w związku z wnioskowanym rozszerzeniem zakresu stosowania środka ochrony roślin Tricoten WP na inne niż warzywa rośliny uprawne, załącznik nr 2, który pierwotnie wskazywał, że ww. środek jest do stosowania wyłącznie w uprawie warzyw został zaktualizowany w ww. zakresie.

Pismem z dnia 26.05.2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Agrotecnologías Naturales S.L. z siedzibą w Królestwo Hiszpanii w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 8.06.2026 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wnosi uwag do postępowania.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.).

⁴ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1847 t.j.).

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2026 r., poz.143 t.j.).

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.