

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 234/2023d z dnia 13.04.2023 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 80/2014 z dnia 23.05.2014 r.

Posiadacz zezwolenia: „FREGATA” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa,
tel.: 58 552 00 27 do 29, fax: 58 552 48 31; www.fregata.gda.pl

OBSYDIAN PLUS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

pyretryny /pyretryna I, pyretryna II, cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II/ –
(związki z grupy naturalnych pyretryn) – 1,0 g/l (0,1%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 80/2014 z dnia 23.05.2014r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 234/2023d z dnia 13.04.2023 r.**

	
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Obsydian Plus jest środkiem owadobójczym w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników róży, fuksji, pelargonii, begonii oraz innych roślin ozdobnych o ozdobnych kwiatach oraz ozdobnych drzew i krzewów liściastych i iglastych. Na roślinie działa głębokie.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Róża

Mszycy różano - szczeciowa

Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

Fuksja

Mączlik szklarniowy

Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika. W przypadku osobników dorosłych środek stosować dwukrotnie, w odstępie 7 dni.

Pelargonia

Mszyca ziemniaczana

Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

Begonia

Mszyca ziemniaczana

Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

Stosowanie środka ograniczyć do trzech zabiegów w sezonie, przy zachowaniu odstępu 7 - 21 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek przeznaczony do stosowania w izolowanych szklarniach i pomieszczeniach.

Petunia, surfinia, piwonia, aster, chryzantema, cynia i inne rośliny ozdobne o kwiatach ozdobnych, bukszpan, żywotnik, cyprys, jaśmin, świerk, jałowiec oraz inne ozdobne drzewa i krzewy liściaste i iglaste

Mszyce

Termin stosowania: stosować po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni.

SPOSÓB STOSOWANIA

Opryskiwać rośliny z odległości 20-40 cm. Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople.

Należy także dokładnie i równomiernie opryskać dolną stronę liści.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie wymagany.

1. Środek stosować w temperaturze poniżej 20°C.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Środka nie stosować w czasie silnego nasłonecznienia.
4. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (kombinezon) podczas stosowania środka oraz podczas wykonywania prac na obszarze poddanym zabiegowi.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Środek niebezpieczny dla pszczoł.

Nie zaleca się wprowadzania do szklarni zapylaczy ze względu na owadobójcze działanie środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0 °C - 25°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii –