



ARC Rynek i Opinia

**ANALIZA ANKIET WYPEŁNIANYCH
W PUNKTACH KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNYCH W 2005 ROKU**

RAPORT SPRAWOZDAWCZY

DLA

KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS

Warszawa, 27 czerwca 2006

SPIS TREŚCI

1. METODOLOGIA.....	6
2. PRÓBA BADANIA.....	7
3. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE	8
4. ANALIZA DANYCH Z PKD ZA ROK 2005	10
4.1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH W CELU WYKONANIA TESTU W KIERUNKU HIV W 2005 ROKU	10
4.1.1. Płeć osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	10
4.1.2. Wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	12
4.1.3. Płeć i wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	14
4.1.4. Województwo stałego pobytu osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	16
4.1.5. Miejsce zamieszkania osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	17
4.1.6. Obecna sytuacja zawodowa osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	18
4.1.7. Wykształcenie osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	19
4.1.8. Status rodzinny osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	19
4.1.9. Przynależność religijna osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	21
4.2. SYTUACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TESTY	22
2.2.1 Ocena własnej sytuacji materialnej osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	22
4.2.1. Ocena swojego stanu zdrowia osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	23
4.2.2. Leczenie szpitalne osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	25
4.2.3. Korzystanie z pomocy psychiatry w ciągu ostatnich 5 lat.....	26
4.3. TESTY W KIERUNKU HIV	27
4.3.1. Liczba skierowań na testy w kierunku HIV oraz ich wyniki w każdym PKD	27
4.3.2. Powody skierowania pacjentów na testy w kierunku HIV	30
4.3.3. Powody nie skierowania pacjentów na testy w kierunku HIV.....	31
4.3.4. Miesiąc wykonywania testu, analiza wśród osób zgłaszających się do PKD	32
4.4. TESTY W KIERUNKU HIV W PRZESZŁOŚCI	34

4.4.1. Osoby, które wcześniej kiedykolwiek wykonywały testy w kierunku HIV	34
4.5. NARAŻENIA POZA SEKSUALNE	38
4.5.1. Transfuzja krwi w przeszłości.....	38
4.5.2. Stosowanie narkotyków drogą iniekcji, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	39
4.5.3. Czas, jaki upłynął od stosowania narkotyków drogą iniekcji	40
4.5.4. Stosowanie środków psychostymulujących – alkoholu.....	41
4.5.5. Stosowanie innych środków psychostymulujących,	42
4.5.6. Rodzaje stosowanych środków psychostymulujących innych niż alkohol.....	43
4.5.7. Stosowanie strzykawek wspólnie z innymi osobami.....	44
4.5.8. Czas, jaki upłynął od stosowania strzykawek wspólnie z innymi osobami	45
4.5.9. Orientacja seksualna osób zgłaszających się do PKD	46
4.5.10. Choroby przechodzone w przeszłości lub obecnie.....	47
4.5.11. Narażenia zawodowe osób zgłaszających się do PKD	49
4.5.12. Typ narażenia zawodowego osób zgłaszających się do PKD	49
4.6. RYZKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE	51
4.6.1. Partnerzy seksualni w ciągu ostatniego roku.....	51
4.6.2. Liczba partnerów seksualnych w ciągu ostatniego roku.....	54
4.6.3. Stosowanie prezerwatywy w kontaktach seksualnych.....	63
4.6.4. Kontakty seksualne z partnerami innymi niż stały partner	64
4.6.5. Kontakty z innym partnerem niż stały partner.....	65
4.6.6. Ryzykowne zachowania seksualne	66
4.6.7. Czas, jaki upłynął od zachowania ryzykownego.....	67

SPIS WYKRESÓW

Wykres 4.1 Płeć osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	10
Wykres 4.2 Płeć osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS.....	11
Wykres 4.3 Wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	12
Wykres 4.4 Wiek osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS	13
Wykres 4.5 Płeć i wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	14
Wykres 4.6 Obywatelstwo osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	15
Wykres 4.7 Województwo stałego pobytu.....	16
Wykres 4.8 Miejsce zamieszkania osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	17
Wykres 4.9 Sytuacja zawodowa osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	18
Wykres 4.10 Wykształcenie osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	19
Wykres 4.11 Status rodzinny osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	20
Wykres 4.12 Przynależność religijna osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	21
Wykres 4.13 Ocena własnej sytuacji materialnej osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	22
Wykres 4.14 Ocena swojego stanu zdrowia osób zgłaszających się na test w kierunku HIV	23
Wykres 4.15 Ocena stanu zdrowia osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS	24
Wykres 4.16 Leczenie szpitalne osób zgłaszających się na test w kierunku HIV.....	25
Wykres 4.17 Korzystanie z pomocy psychiatry w ciągu ostatnich 5 lat	26
Wykres 4.18 Ilość skierowanych osób zgłaszających się do PKD na test w kierunku HIV w tym liczba testów w kierunku HIV z wynikami dodatnimi i ujemnymi	28
Wykres 4.19 Powody skierowania na badanie w kierunku HIV	30
Wykres 4.20 Miesiąc wykonywania testu	32
Wykres 4.21 Wykonywanie testu w kierunku HIV w przeszłości	34
Wykres 4.22 Liczba testów w kierunku HIV wykonana w przeszłości,	35
Wykres 4.23 Czas, jaki upłynął od czasu ostatniego testu w kierunku HIV,	35
Wykres 4.24 Płeć osób, które wcześniej wykonywały test w kierunku HIV,	36
Wykres 4.25 Wiek osób, które wcześniej wykonywały test w kierunku HIV,	36
Wykres 4.26 Wcześniejsze testy w kierunku HIV a sytuacja materialna, N=428	37
Wykres 4.27 Wcześniejsze testy w kierunku HIV a województwo,	37
Wykres 4.28 Transfuzja krwi w przeszłości	38
Wykres 4.29 Stosowanie narkotyków drogą iniekcji.....	39
Wykres 4.30 Czas od ostatniego stosowania narkotyków drogą iniekcji.....	40
Wykres 4.31 Stosowanie środków psychostymulujących – alkoholu	41
Wykres 4.32 Stosowanie innych środków psychostymulujących	42
Wykres 4.33 Rodzaje stosowanych środków psychostymulujących innych niż alkohol	43
Wykres 4.34 Stosowanie strzykawek wspólnie z innymi osobami	44
Wykres 4.35 Czas, jaki upłynął od ostatniego stosowania strzykawek wspólnie z innymi osobami.....	45
Wykres 4.36 Orientacja seksualna osób zgłaszających się do PKD	46
Wykres 4.37 Choroby przechodzone w przeszłości lub obecnie	47
Wykres 4.38 Ilość odbytych leceń szpitalnych a zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu C.....	48
Wykres 4.39 Narażenia zawodowe osób zgłaszających się do PKD	49
Wykres 4.40 Typ narażenia zawodowego osób zgłaszających się do PKD.....	50
Wykres 4.41 Partnerzy seksualni w ciągu ostatniego roku	51
Wykres 4.42 Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - KOBIEĆ.....	54
Wykres 4.43 Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - MĘŻCZYŹN.....	55
Wykres 4.44 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	56
Wykres 4.45 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	56
Wykres 4.46 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	57
Wykres 4.47 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	57
Wykres 4.48 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	58
Wykres 4.49 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEĆ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	58

Wykres 4.50 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	59
Wykres 4.51 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	59
Wykres 4.52 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	60
Wykres 4.55 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	60
Wykres 4.56 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	61
Wykres 4.57 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	61
Wykres 4.58 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	61
Wykres 4.59 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	62
Wykres 4.61 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYŹN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn.....	62
Wykres 4.62 Stosowanie prezerwatywy w kontaktach seksualnych.....	63
Wykres 4.63 Kontakty seksualne z partnerami innymi niż stały partner	64
Wykres 4.64 Kontakty z innym partnerem niż stały partner	65
Wykres 4.65 Ryzykowne zachowania seksualne w poszczególnych grupach	66
Wykres 4.66 Czas, jaki upłynął od zachowania ryzykownego	67

1. METODOLOGIA

Analizie poddano dane zebrane od osób, które w 2005 roku zgłosiły się do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w celu wykonania testu w kierunku HIV.

Dane zostały zebrane dwoma technikami. Pierwszą z nich był wywiad standaryzowany przeprowadzony z każdą osobą, która zgłosiła się do Punktu. Wywiad ten prowadzony był przez Konsultanta pracującego w Punkcie i obejmował podstawowe dane demograficzne, a także zagadnienia związane z zachowaniami ryzykownymi podejmowanymi przez osoby zgłaszające się na test.

Drugą techniką zbierania danych była ankieta samodzielnie wypełniana przez osobę, która zgłosiła się do Punktu.

Wywiad i ankieta zostały skonstruowane w ten sposób, aby dostarczyć jak najwięcej informacji o sytuacji społeczno-demograficznej osób zgłaszających się do PKD, o ich kondycji psycho-fizycznej i podejmowanych przez nie zachowaniach ryzykownych.

2. PRÓBA BADANIA

Badaniu poddano reprezentatywną próbę ankiet, N=1389, którą wylosowano z 12 634 ankiet wypełnionych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2005 roku.

Ankiety te zostały poukładane w ramach każdego z ośrodków, w których były przeprowadzane testy na HIV, a w ramach każdego ośrodka – miesiącami. W ten sposób powstały warstwy w obrębie których przeprowadzono losowanie (systematyczne po wylosowaniu punktu startowego). Punkt startowy będzie losowany osobno dla każdej warstwy.

Po przeprowadzeniu losowania został sprawdzony podział badanych na:

- z wynikiem ujemnym,
- z wynikiem dodatnim,
- porady bez zlecenia testu.

Liczba ankiet bez porady zlecenia testu wśród wylosowanych ankiet wynosiła N=5 w związku z tym postanowiono nie poddawać analizie tej grupy, ze względu na znikomą liczebność. Bardzo podobna sytuacja dotyczyła ankiet z dodatnim wynikiem testu, których wylosowano N=7.

Ze względu na charakter zebranego materiału i znaczną liczbę braków odpowiedzi w poszczególnych pytaniach wywiadu i ankiety wypełnianej samodzielnie, zdecydowano się na prezentowanie wyników łącznie z tą kategorią. Znaczna liczba braków danych zbieranych w trakcie konsultacji może wynikać przede wszystkim z drażliwej i intymnej natury niektórych pytań, a także niestarannego wypełniania ankiet przez Konsultanta wypełniającego ankietę.

3. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE

W roku 2005 do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie całej Polski zgłosiło się 12624 osoby. Najwięcej osób skorzystało z możliwości wykonania bezpłatnego testu na obecność wirusa HIV w PKD w Warszawie (3105). Wiele osób zgłosiło się też w PKD w Gdańsku (1126), Poznaniu (1104), Chorzowie (1076) oraz Wrocławiu (955)

Wśród osób zgłaszających się do PKD przeważającą większość stanowili mężczyźni (60,9%). Natomiast, jeśli chodzi o wiek to prawie 2/3 osób, które zgłosiły się do PKD na wykonanie testu były w wieku od 20 do 29 lat. Drugą liczną grupę stanowiły osoby między 30, a 40 rokiem życia (19,8%). Istotnych informacji dostarcza analiza na poziomie płci i wieku osób zgłaszających się na wykonanie testu. Wśród osób poniżej 20tego roku życia zdecydowanie więcej było kobiet, niż mężczyzn. Tendencja ta odwraca się w grupie osób po 20tym roku życia, kiedy to na wykonanie testu w kierunku HIV decyduje się więcej mężczyzn niż kobiet.

Jako powód zgłaszania się na wykonanie testu w kierunku HIV najczęściej podawano:

- Ryzykowne zachowania seksualne (41,8%)
- Brak zabezpieczenia w kontaktach seksualnych (28,4%)
- Chęć poznania swojego statusu serologicznego (12,6%)
- Nowy partner (6,6%)

Największa liczba testów była wykonana w pierwszym miesiącu roku (styczeń). Drugim miesiącem, w którym można było zaobserwować wzrost liczby wykonywanych testów był listopad. Generalnie najwięcej testów zostało wykonanych w okresie zimowym. Prawdopodobnie ma to związek ze społeczną kampanią reklamową kampanią związaną z HIV oraz miesiącem grudniem, w którym obchodzi się Światowy Dzień AIDS.

W 2005 roku osoby, które wykonywały test na obecność wirusa HIV po raz pierwszy stanowiły 1/3 wszystkich osób.

Zdecydowana większość z tych osób nie przechodziła nigdy wcześniej transfuzji krwi (94,7%) oraz nie stosowała narkotyków drogą iniekcji (95,9%). Natomiast ponad 1/3

zadeklarowała stosowanie środków psychostymulujących w postaci alkoholu, a co druga w postaci innej niż alkohol (18,4%) – najczęściej była to marihuana (73,8%) oraz amfetamina (15,6%).

Zdecydowana większość osób, które zgłosiły się do PKD w 2005 roku zadeklarowała, że jest heteroseksualna (84,1%). Co dziesiąty zgłaszający się na wykonanie testu przyznawał, że jest homoseksualistą (częściej też byli to mężczyźni niż kobiety).

Najliczniejszą grupę osób zgłaszających się na testy w kierunku HIV stanowiły osoby mieszkające w miastach (84,2%). Z miejscowości wiejskich było ich jedynie 7,7%. Dodatkowo prawie jedną czwartą- wszystkich osób zgłaszających się w 2005 roku na testy w kierunku HIV stanowili studenci (24,1%). Dominowały również osoby ze średnim wykształceniem (52,6%) oraz osoby stanu wolnego (panna/ kawaler).

Prawie połowa z wszystkich osób, które zgłosiły się na wykonanie testu na obecność wirusa HIV ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą (47,3%), natomiast niewiele mniej jest osób które uznają swoją sytuację materialną za zadowalającą (44,1%). W przypadku oceny kondycji zdrowotnej ponad ¾ osób pozytywnie ocenia swój stan zdrowia.

Leczenie szpitalne (1-2 razy) przechodziło 44,4% osób, które zgłosiły się do PKD w 2005 roku, natomiast, jeśli chodzi o pomoc psychiatry to zdecydowana większość (88,7%) nigdy z nie korzystała z takiej pomocy.


4. ANALIZA DANYCH Z PKD ZA ROK 2005

4.1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PUNKTÓW KONSULTACYJNO- DIAGNOSTYCZNYCH W CELU WYKONANIA TESTU W KIERUNKU HIV W 2005 ROKU

4.1.1. Płeć osób zgłaszających się na test w kierunku HIV


N=1318, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.1 Płeć osób zgłaszających się na test w kierunku HIV



Z analizy danych dotyczących płci, wynika, że znaczną część osób zgłaszających się do PKD w celu wykonania testu w kierunku HIV w roku 2005 stanowili mężczyźni (60,9%). Ponadto liczba ta znacznie odbiega od danych dotyczących płci dostarczonych przez GUS. Kobiety natomiast stanowiły 39,9% ogółu osób, które w analizowanym 2005 roku zgłaszały się na testy.


Wykres 4.2 Płeć osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS



4.1.2. Wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.3 Wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Z analizy danych dotyczących wieku osób zgłaszających się do PKD w roku 2005, wynika, że ponad połowę osób zgłaszających się do PKD (59%) stanowiła grupa osób w przedziale wiekowym 20- 29 lat. Różnica procentowa między następną grupą wiekową (30- 39 lat) jest dość znaczna (różnica rzędu 30 punktów procentowych). Prawie co piąta osoba zgłaszającą się do PKD miała od 30 39 lat.

Struktura wiekowa osób zgłaszających się do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w roku 2005 wyraźnie odbiega od struktury wiekowej ogółu populacji. Największe różnice widoczne są w przypadku osób młodych pomiędzy 20, a 29 rokiem życia. Może to wynikać z wielu kwestii:

- ze wzmożonej aktywności seksualnej tej właśnie grupy,
- braku zabezpieczenia podczas stosunku seksualnego
- relatywnie częstszych zmian partnerów i związanej z tym świadomości ryzyka zakażenia wirusem HIV,

- chęci poznania swojego statusu serologicznego.


Wykres 4.4 Wiek osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS



4.1.3. Płeć i wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.5 Płeć i wiek osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Inne bardzo ciekawe informacje odnośnie struktury społeczno- demograficznej osób zgłaszających się do PKD w roku 2005 przynosi analiza na poziomie powiązania płci i wieku. Jak wynika z danych, w grupie osób w wieku do 18 roku życia włącznie, które zgłosiły się do PKD, przeważają kobiety (różnica rzędu 40 punktów procentowych). Tendencja ta zmienia swój kierunek w przypadku następnej grupy wiekowej (18-19 lat). Zależności te odwracają się nawet do ponad 40 punktów procentowych na korzyść mężczyzn.

Obywatelstwo osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.6 Obywatelstwo osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Zdecydowana większość osób (97,0%) zgłaszających się do PKD celem wykonania testu w kierunku HIV to osoby posiadające obywatelstwo polskie. Bardzo nieznaczna była grupa ludzi posiadająca inne obywatelstwo niż polskie oraz grupa osób, od których nie uzyskano informacji na ten temat.

4.1.4. Województwo stałego pobytu osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.7 Województwo stałego pobytu




Zdecydowana większość (48,8%) testów w kierunku HIV została wykonana w województwie mazowieckim. 49,3 % testów wykonano w pozostałych 15 województwach, natomiast 1,9% stanowią braki danych.

4.1.5. Miejsce zamieszkania osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.8 Miejsce zamieszkania osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Zdecydowana większość (84,2%) zgłaszających się do PKD celem wykonania testu, to osoby mieszkające w miastach. Mniej niż co dziesiąta zgłaszająca się do PKD w roku 2005 osoba mieszkała na wsi. Znaczna była też grupa osób, od których nie uzyskano informacji o miejscu zamieszkania (8,1%).

Rozkład danych otrzymanych z analizy ankiet wypełnianych w PKD w roku 2005 odbiega od rozkładu związanego z miejscem zamieszkania według struktury GUS. Występuje znaczna nadreprezentacja osób pochodzących z miasta, natomiast osoby mieszkające na wsi stanowią niewielką ilość ogółu populacji pochodzących z takich miejscowości.

4.1.6. Obecna sytuacja zawodowa osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.9 Sytuacja zawodowa osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Specyfika grupy osób zgłaszających się do PKD ujawnia się w analizie statusu zawodowego. Największą grupę, bo prawie jedną czwartą- wszystkich osób zgłaszających się w 2005 roku na testy w kierunku HIV stanowili studenci (24,1%).

Znaczną grupę stanowili również specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów (22,3%) oraz osoby, które nie określiły swojej sytuacji zawodowej (18,1%). Relatywnie silnie reprezentowani byli również bezrobotni (11%) oraz technicy, wyspecjalizowani pracownicy usług (6,8%).

4.1.7. Wykształcenie osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.10 Wykształcenie osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Ponad połowa osób, które w 2005 roku chciały wykonać bezpłatny test w kierunku HIV, to osoby z wykształceniem średnim (52,6%). Bardzo duża była również grupa osób z wykształceniem wyższym (39,9%), niewielka zaś z wykształceniem podstawowym.

Dane dotyczące wykształcenia osób, które bezpłatnie wykonywały test w kierunku HIV w 2005 r. znacznie odbiegają od danych ogółu populacji. Znacznie więcej było osób z wykształceniem wyższym i średnim wśród tych, które zgłosiły się do PKD. Prawdopodobnie wynika to stąd, iż zdecydowana większość tych testów była wypełniana przez osoby mieszkające w miastach, w których przeważają osoby z takim wykształceniem. W związku z tym zrozumiała jest również różnica między danymi z PKD, a GUS dotyczącymi wykształcenia podstawowego, która wynosi ponad 23 punkty procentowe na korzyść danych z GUS.

4.1.8. Status rodzinny osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.11 Status rodzinny osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Większość osób zgłaszających się do PKD (69%) w celu wykonania testu w kierunku HIV to osoby stanu wolnego (panna/ kawaler). 17% wszystkich osób, które zgłosiły się na test stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim. Co dwudziesta osoba była rozwiedziona (5,1%), natomiast 7% osób zgłaszających się do PKD to osoby żyjące w związkach nieformalnych.

Mniej niż 1% spośród wykonujących test w PKD (0,7%) to wdowy/wdowcy. 1% całej grupy nie podało informacji o stanie cywilnym.

4.1.9. Przynależność religijna osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N= 1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.12 Przynależność religijna osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Zdecydowana większość (77,6%) zgłaszających się do PKD celem wykonania testu podała, że jest związana z religią. Natomiast, co piąty zgłaszający zadeklarował brak jakiegokolwiek przynależności religijnej.

4.2. SYTUACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA TESTY

2.2.1 Ocena własnej sytuacji materialnej osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.13 Ocena własnej sytuacji materialnej osób zgłaszających się na test w kierunku HIV




Największą grupę osób (47,3%) zgłaszających się do PKD w celu wykonania testu w roku 2005 stanowiły osoby określające swoją sytuację materialną jako dobrą. Niewielka grupa osób uznała swoją sytuację materialną za złą (7,7%). Osób niezadowolonych ze swojego statusu materialnego było niewiele.

4.2.1. Ocena swojego stanu zdrowia osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)


Wykres 4.14 Ocena swojego stanu zdrowia osób zgłaszających się na test w kierunku HIV



Zdecydowana większość osób, które zgłosiły się do PKD na wykonanie testu w kierunku HIV dobrze oceniło swoją sytuację zdrowotną (78,2%). Co piąta osoba deklarowała, że jej stan zdrowia jest średni. Niewiele jest osób uznających swoją kondycję zdrowotną za złą (2,1%).

Struktura danych wynikająca z analizy ankiet wypełnionych w PKD w roku 2005 odbiega od danych związanych z oceną swojego stanu zdrowia pochodzących z danych GUS. Duże różnice występują na poziomie oceny swojego stanu zdrowia jako bardzo dobrym i dobrym. Oceny te są wyższe w przypadku osób zgłaszających się na bezpłatny test w kierunku HIV, niż oceny ogółu populacji. Pozostałe oceny charakteryzuje tendencja odwrotna.


Wykres 4.15 Ocena stanu zdrowia osób zgłaszających się do PKD w 2005 r., a struktura GUS



4.2.2. Leczenie szpitalne osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.16 Leczenie szpitalne osób zgłaszających się na test w kierunku HIV



Największą grupę spośród osób, które zgłosiły się w 2005 roku na test w kierunku HIV stanowią osoby, które przeszły 1-2 krotnie leczenie szpitalne. Prawie taki sam odsetek badanych nie był nigdy leczony szpitalnie.


Istotnie częściej nie były leczone w szpitalu osoby:

- z średnim wykształceniem (45,1%),
- dobrze oceniający swoją sytuację materialną (44,5%)
- bardzo dobrze oceniający swoją sytuację zdrowotną (55,9%)

4.2.3. Korzystanie z pomocy psychiatry w ciągu ostatnich 5 lat

N=1069, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 (ankieta samodzielnie wypełniana)

Wykres 4.17 Korzystanie z pomocy psychiatry w ciągu ostatnich 5 lat



Co dziesiąta osoba odwiedzająca w 2005 roku Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny korzystała z opieki psychiatrycznej w przeszłości.


W grupie osób, które korzystały z pomocy psychiatrycznej w ciągu ostatnich 5 lat i zgłosiły się na test w kierunku HIV do PKD istotnie najczęściej tego typu konsultację psychiatryczną odbywały:

- osoby w wieku powyżej 60 lat (36,4%)
- z wykształceniem podstawowym (24,1%)
- rozwiedzione (18,5%)
- bardzo źle oceniające swoją sytuację materialną (46,2%)
- oceniające swój stan zdrowia jako zły (38,1%).


4.3. TESTY W KIERUNKU HIV

4.3.1. Liczba skierowań na testy w kierunku HIV oraz ich wyniki w każdym PKD

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005



Wykres 4.18 Ilość skierowanych osób zgłaszających się do PKD na test w kierunku HIV w tym liczba testów w kierunku HIV z wynikami dodatnimi i ujemnymi



W przypadku 9 PKD (Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Gdańsk, Chorzów, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., szczecin, Koszalin) konsultacje za każdym razem skutkowały skierowaniem na test w kierunku HIV. W pozostałych przypadkach odsetek ten utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie i wynosił ponad 85%.

Wśród niewielu osób, które wykonały w 2005 roku test w kierunku HIV stwierdzono obecność anty-ciał HIV. Najwięcej dodatnich wyników testów odnotowano w województwie dolnośląskim (4,4%) i śląskim (3,2%).


W województwie mazowieckim tylko wśród 0,1% stwierdzono dodatni wynik testu.

W pozostałych Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych nie zanotowano przypadków dodatnich testów.

4.3.2. Powody skierowania pacjentów na testy w kierunku HIV

N=1358, analiza wśród osób skierowanych na testy w kierunku HIV

Wykres 4.19 Powody skierowania na badanie w kierunku HIV



Z analizy danych otrzymanych ze wszystkich Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych w roku 2005, wynika, że głównym powodem wydawania skierowania na test w kierunku HIV było utrzymywanie ryzykownych kontaktów seksualnych (41,8%) przez osoby zgłaszające się do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. Drugim dość znaczącym powodem do wystawienia skierowania na test w kierunku HIV był seks bez zabezpieczeń (28,4%) jak również chęć poznania swojego statusu serologicznego (12,7%). Nowy partner był w 5,6% przypadków powodem do wystawienia skierowania na powyższy test. Pozostałe powody (widoczne na wykresie) były podane przez niewiele osób (każdy z nich nie przekraczał 2%). Znaczna była ilość braku danych (7,6%).

4.3.3. Powody nie skierowania pacjentów na testy w kierunku HIV

Z pośród 1389 osób zgłaszających się do PKD, 9 osób nie otrzymało skierowania na test w kierunku HIV. W trzech przypadkach nie podano powodów odmowy skierowania.


W pozostałych powodem nie zlecenia przez Konsultant atestu w kierunku HIV było:

- zbyt krótki okres czasu od kontaktu seksualnego
- niepełnoletność osoby zgłaszającej się do PKD
- brak okienka serologicznego
- wykonanie kilku testów w przeszłości z wynikiem ujemnym.

4.3.4. Miesiąc wykonywania testu, analiza wśród osób zgłaszających się do PKD

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.20 Miesiąc wykonywania testu



W okresie działalności PKD zauważane jest znaczne zróżnicowanie liczby testów wykonywanych w poszczególnych miesiącach roku.

Największa liczba testów była wykonana w pierwszym miesiącu roku (styczeń). Drugim miesiącem, w którym można było zaobserwować wzrost liczby wykonywanych testów był listopad. Generalnie najwięcej testów zostało wykonanych w okresie zimowym.


Prawdopodobnie ma to związek ze społeczną kampanią reklamową kampanią związaną z HIV oraz miesiącem grudniem, w którym obchodzi się Światowy Dzień AIDS.

4.4. TESTY W KIERUNKU HIV W PRZESZŁOŚCI

4.4.1. Osoby, które wcześniej kiedykolwiek wykonywały testy w kierunku HIV

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.21 Wykonywanie testu w kierunku HIV w przeszłości




Większość osób zgłaszających się na test w kierunku HIV wykonywała ten test po raz pierwszy (69,2%). Jednak ponad 1/3 (30,8%) osób już wcześniej choć raz w przeszłości poddała się temu testowi.


Istotnie częściej test w kierunku HIV wykonywali już wcześniej:

- mężczyźni (36,5%),
- osoby w wieku 30-39 lat (40,4%),
- osoby oceniające swoją sytuację materialną jako bardzo złą (61,5%),
- osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat korzystały z pomocy psychiatry (46,4%).


**Wykres 4.22 Liczba testów w kierunku HIV wykonana w przeszłości,
N=428 – analiza wśród osób, które w przeszłości wykonywały test**




**Wykres 4.23 Czas, jaki upłynął od czasu ostatniego testu w kierunku HIV,
N=428 – analiza wśród osób, które w przeszłości wykonywały test**




**Wykres 4.24 Płeć osób, które wcześniej wykonywały test w kierunku HIV,
N=428 – analiza wśród osób, które w przeszłości wykonywały test**




**Wykres 4.25 Wiek osób, które wcześniej wykonywały test w kierunku HIV,
N=428 – analiza wśród osób, które w przeszłości wykonywały test**



Wykres 4.26 Wcześniejsze testy w kierunku HIV a sytuacja materialna, N=428



Wykres 4.27 Wcześniejsze testy w kierunku HIV a województwo, N=428 – analiza wśród osób, które w przeszłości wykonywały test




4.5. NARAŻENIA POZA SEKSUALNE

4.5.1. Transfuzja krwi w przeszłości

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.28 Transfuzja krwi w przeszłości



Wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, najliczniejszą grupę (94,7%) stanowiły osoby, które w przeszłości nie miały transfuzji krwi.


Spośród osób, które deklarowały, że w przeszłości miały zabieg transfuzji krwi istotnie częściej były to osoby, które:

- były wcześniej leczone w szpitalu 6 razy i więcej (29,6%)
- swój stan zdrowia oceniły jako zły (18,2%).
- są rozwiedzione (11,1%)

4.5.2. Stosowanie narkotyków drogą iniekcji, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.29 Stosowanie narkotyków drogą iniekcji



Zdecydowana większość (95,9%) osób zgłaszających się na test w kierunku HIV nigdy nie stosowała narkotyków dożylnie.


Wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV oraz tych, które deklarowały stosowanie narkotyków dożylnie najczęściej miało to miejsce w przypadku osób:

- z wykształceniem podstawowy (16,4%)
- leczonych szpitalnie co najmniej 6 krotnie (11,1%)
- nie związane z żadną religią (7,1%)
- bardzo źle oceniających swoją sytuację materialną (46,2%)
- średnio oceniających swój stan zdrowia (8,1%).

4.5.3. Czas, jaki upłynął od stosowania narkotyków drogą iniekcji

N=46, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 i stosowały narkotyki dożylne

Wykres 4.30 Czas od ostatniego stosowania narkotyków droga iniekcji




Co trzecia osoba, która stosowała narkotyki dożylne przyznała, że od czasu ostatniego przyjmowania narkotyków drogą iniekcji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Tylko nieznacznie mniejsza liczba badanych stosowała narkotyki dożylne w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

4.5.4. Stosowanie środków psychostymulujących – alkoholu

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.31 Stosowanie środków psychostymulujących – alkoholu




Ponad połowa osób spośród zgłaszających się na test w kierunku HIV, nie stosowała alkoholu. Używanie alkoholu zadeklarowało 32,3% osób zgłaszających się na testy w kierunku HIV w roku 2005.

W grupie osób stosujących alkohol jako środek psychostymulujący istotnie częściej z tej używki korzystali mężczyźni (35,6%) oraz osoby nie związane z żadną religią (40,6%).

4.5.5. Stosowanie innych środków psychostymulujących,

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.32 Stosowanie innych środków psychostymulujących




Prawie dwie trzecie osób zgłaszających się na test w kierunku HIV zadeklarowała, że nie stosuje innych środków psychostymulujących. Do przyjmowania takich środków przyznała się prawie co piąta osoba.

4.5.6. Rodzaje stosowanych środków psychostymulujących innych niż alkohol

N=256, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 i stosujących środki psychostymulujące inne niż alkohol

Wykres 4.33 Rodzaje stosowanych środków psychostymulujących innych niż alkohol




Wśród osób stosujących środki psychosymulujące (inne niż alkohol) najliczniejszą grupę stanowiły osoby używające marihuany oraz haszyszu (73,8%). Drugą pod względem liczebności grupą były osoby (15,6%) stosujące amfetaminę.

4.5.7. Stosowanie strzykawek wspólnie z innymi osobami

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.34 Stosowanie strzykawek wspólnie z innymi osobami



Zdecydowana większość osób (95,0%) zgłaszających się na test w kierunku HIV nie stosowała strzykawek wspólnie z innymi osobami.


Osoby deklarujące stosowanie strzykawek/igieł wspólnie z innymi osobami na tle pozostałych osób zgłaszających się na test w kierunku HIV wyróżniają się następującymi cechami:

- mają wykształcenie podstawowe (9,6%)
- nie są związane z żadną religią (4,7%)
- bardzo źle oceniają swoją sytuację materialną (23,1%)
- byli wcześniej leczeni szpitalnie co najmniej 6 razy (16%).

4.5.8. Czas, jaki upłynął od stosowania strzykawek wspólnie z innymi osobami

N=29, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV i stosowały strzykawki wspólnie z innymi

Wykres 4.35 Czas, jaki upłynął od ostatniego stosowania strzykawek wspólnie z innymi osobami




Spośród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV oraz deklarujących stosowanie strzykawek wspólnie z innymi osobami przyznało, że od ostatniego wspólnego używania strzykawek minęło ponad 12 miesięcy (31%). Prawie co czwarta osoba dzieliła strzykawki z innymi od 3 do 12 miesięcy, a co piąta w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

4.5.9. Orientacja seksualna osób zgłaszających się do PKD

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.36 Orientacja seksualna osób zgłaszających się do PKD




Wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, przeważającą większość stanowią osoby heteroseksualne (84,1%) natomiast osób o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej jest 14,1%.

4.5.10. Choroby przechodzone w przeszłości lub obecnie

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.37 Choroby przechodzone w przeszłości lub obecnie



Wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, największą grupę stanowią osoby, które przechodziły choroby przenoszone drogą płciową (6,1%). Na wirusowe zapalenie wątroby typu nieokreślonego chorowała o połowę mniejsza liczba badanych.

Najczęstszą chorobą, którą przechodziły osoby zgłaszające się na test w kierunku HIV są choroby przenoszone drogą płciową (6%).

Statystycznie częściej na choroby weneryczne zapadają następujące grupy osób:


- o orientacji biseksualnej (11,5%)
- rozwiedzione (16,7%)
- źle oceniające swój stan zdrowia (18,2%).

Jeśli chodzi o WZW nieokreślone i WZW typu B nie znaleziono cech różnicujących osoby przechodzące te choroby.

Jednakże jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C stwierdzono zależność między tą liczbą, a dolegliwościami związanymi z odbytych w przeszłości leceń szpitalnych.

N=236, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV i chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu C


Wykres 4.38 Ilość odbytych leczenia szpitalnych a zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu C



4.5.11. Narażenia zawodowe osób zgłaszających się do PKD

N=1389, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005

Wykres 4.39 Narażenia zawodowe osób zgłaszających się do PKD




Najwięcej osób zgłaszających się na test w kierunku HIV (83,3%) deklaruje, że nie jest narażona na zakażenie wirusem HIV w swoim środowisku pracy. Osoby pracujące w miejscach narażonych na zakażenie wirusem HIV stanowią 4,8% ogółu osób, które zgłosiły się do PKD.

4.5.12. Typ narażenia zawodowego osób zgłaszających się do PKD

N=66, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, które były zawodowo narażone na zakażenie HIV

Wykres 4.40 Typ narażenia zawodowego osób zgłaszających się do PKD




Co druga osoba spośród osób, deklarujących narażenie na zarażenie wirusem HIV w swoim środowisku pracy, związana jest z sektorem medycznym, natomiast prawie co piąta z usługami seksualnymi.

4.6. RYZKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE

4.6.1. Partnerzy seksualni w ciągu ostatniego roku

N=1381, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005 z pominięciem osób, które nigdy nie miały kontaktów seksualnych

Wykres 4.41 Partnerzy seksualni w ciągu ostatniego roku



Prawie 70% osób zgłaszających się do PKD miało w 2005 roku kontakty heteroseksualne.

Istotnie częściej tego typu kontakty deklarowany był przez:

- kobiety – 92%
- osoby związane z religią – 89,7%

- osoby w związku małżeńskim – 96,8%.

Co trzecia osoba odbywająca rozmowę z konsultantem w PKD deklarowała, że w roku 2005 zmieniała partnerów seksualnych. Tego typu zachowanie było częstsze w przypadku:

- mężczyzn – 56,2%
- osób rozwiedzionych – 65,7%.

Spośród osób, które zgłosiły się w 2005 roku do punktu konsultacyjnego 15% miała w zeszłym roku kontakty seksualne z osobami, które wyjeżdżają za granicę.

Istotnie częściej tego typu kontakty deklarowany był przez:

- osoby rozwiedzione – 41,4%
- osoby nie związane z religią – 32,4%.

Co dziesiąta osoba zgłaszająca się na test w kierunku HIV w punkcie PKD miała w 2005 roku kontakty seksualne z obcokrajowcami. Tego typu zachowanie częstsze było w przypadku:

- osób z wyższym wykształceniem – 22,5%
- osób nie związanych z żadną religią – 24,9%.

Do kontaktów homoseksualnych w 2005 roku przyznało się prawie 9% osób odwiedzających PKD. Tego typu zachowanie częściej charakteryzowało :

- mężczyzn - 25,9%
- osoby pozostające w związku nieformalnym – 34,8%.

Z osób odbywających rozmowę konsultacyjną w punkcie PKD 7% miało w 2005 roku kontakt seksualny z osobami świadczących usługi seksualne. Istotnie częściej z takimi partnerami mieli do czynienia:

- mężczyźni – 17,3%
- osoby z wykształceniem wyższym – 13,4%.

4% wykonujących testy w 2005 roku miało w okresie 12 miesięcy przed testem kontakty seksualne z partnerami stosującymi narkotyki dożylnie. Tego typu kontakt występował statystycznie częściej u następujących grup osób:

- kobiet – 9,2%
- osób z wykształceniem podstawowym – 19,4%.


Kontakty biseksualne miało prawie 4% osób, które zgłosiły się do PKD w 2005 roku. Istotnie częściej tego typu kontakty występowały w grupie osób nie związanych z żadną religią (16,5%).

Do kontaktów seksualnych z partnerami zakażonymi HIV przyznało się 2% osób odbywających rozmowę konsultacyjną w PKD.

4.6.2. Liczba partnerów seksualnych w ciągu ostatniego roku


Mężczyźni = 842, Kobiety N=539, Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - KOBIEĆ, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, z pominięciem osób, które nigdy nie miały kontaktów seksualnych.

Wykres 4.42 Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - KOBIEĆ




Mężczyźni = 842, Kobiety N=539, Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - KOBIEC, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, z pominięciem osób, które nigdy nie miały kontaktów seksualnych.


Wykres 4.43 Liczba partnerów seksualnych z ostatniego roku - MĘŻCZYŻN




Wykres 4.44 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.45 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.46 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.47 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.48 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.49 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.50 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.51 Liczba partnerów seksualnych – KOBIEŃ a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.52 Liczba partnerów seksualnych – MEŹCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.53 Wykres 4.54 Liczba partnerów seksualnych – MEŹCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.55 Liczba partnerów seksualnych – MEŹCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.56 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.57 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.58 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.59 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn



Wykres 4.60 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn




Wykres 4.61 Liczba partnerów seksualnych – MĘŻCZYZN a partnerzy seksualni w 2005 roku – analiza wśród kobiet i mężczyzn



4.6.3. Stosowanie prezerwatywy w kontaktach seksualnych

N=1381, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV, z pominięciem osób, które nigdy nie miały partnerów seksualnych.

Wykres 4.62 Stosowanie prezerwatywy w kontaktach seksualnych



Wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV i mających kontakty seksualne największą grupę (34,3%) stanowią osoby, które często stosują zabezpieczenie w postaci prezerwatywy. Jednakże niewiele mniejszą grupę stanowią osoby używające prezerwatywy sporadycznie.

Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn najliczniejsze grupy (ok. 36%) stanowią osoby stosujące prezerwatywy często.

Spośród osób z wyższym wykształceniem największą grupę (prawie 40%) stanowią osoby deklarujące częste używanie prezerwatywy podczas stosunku płciowego. Natomiast osoby z wykształceniem średnim oraz podstawowym najczęściej używają prezerwatywy sporadycznie.


W grupie osób deklarujących, że nigdy nie stosowały prezerwatywy istotnie częściej tego typu zachowanie występowało w przypadku:

- kobiet (17,1%)
- osób z wykształceniem podstawowym (30%)
- osób pozostających w związku małżeńskim (21,5%)
- osób oceniających swoją sytuację materialną jako bardzo złą (33,3%).

4.6.4. Kontakty seksualne z partnerami innymi niż stały partner

N=1381, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005, z pominięciem osób, które nigdy nie miały partnerów seksualnych.

Wykres 4.63 Kontakty seksualne z partnerami innymi niż stały partner




Kontakty seksualne z innymi partnerami niż stały partner deklaruje ponad 1/3 osób, które zgłosiły się do PKD.

4.6.5. Kontakty z innym partnerem niż stały partner

N=452, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005, z pominięciem osób, które mają stałych partnerów seksualnych.

Wykres 4.64 Kontakty z innym partnerem niż stały partner




Wśród osób deklarujących kontakty seksualne z innym partnerem niż stały partner 36,3% stanowią mężczyźni. Rzadziej takie kontakty utrzymują kobiety (26,7%).

4.6.6. Ryzykowne zachowania seksualne

N=1381, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005, z pominięciem osób które nigdy nie miały partnerów seksualnych.

Wykres 4.65 Ryzykowne zachowania seksualne w poszczególnych grupach




90,0% osób, które zgłosiły się do PKD w roku 2005 utrzymywało różnego rodzaju kontakty seksualne. Z grupy tej najwięcej było osób utrzymujących kontakty heteroseksualne (77,2%). Drugą liczną grupę stanowili mężczyźni utrzymujący kontakty męsko-męskie (19,5%). Z analizy danych wynika również, że znacznie częściej relacje homoseksualne utrzymują mężczyźni niż kobiety.

4.6.7. Czas, jaki upłynął od zachowania ryzykownego

N=1243, analiza wśród osób zgłaszających się na test w kierunku HIV w roku 2005, które utrzymywały ryzykowne zachowania seksualne

Wykres 4.66 Czas, jaki upłynął od zachowania ryzykownego



Znaczna grupa osób utrzymywała ryzykowne kontakty seksualne od 3 do 12 miesięcy. Drugą najliczniejszą grupę stanowiły osoby utrzymujące ryzykowne kontakty seksualne mniej niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia się do PKD.