

KOMUNIKAT

Informacja nr 3/2026 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – ustanowienie obszaru wyznaczonego w związku z wykryciem bakterii *Ralstonia solanacearum* w wodach rzeki Warty.

W związku z kolejnymi wykryciami w wodach rzeki Warty obecności agrofaga kwarantannowego bakterii *Ralstonia solanacearum*

określam obszar wyznaczony obejmujący strefę porażenia,

w której za zakażony uznaje się odcinek rzeki Warty o długości ok. 215 km, oznaczone na mapie współrzędnymi 52°01'06.5"N, 18°43'41.2"E - 50°56'50.9"N, 19°26'08.7"E. Odcinek ten przebiega przez województwo łódzkie, na terenie powiatów poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego oraz radomszczańskiego, a także obejmuje fragment rzeki Warty położony w województwie wielkopolskim, na terenie powiatu tureckiego, oznaczony na mapie współrzędnymi 51°52'50.1"N, 18°43'29.3"E - 51°52'13.0"N, 18°42'52.9"E) oraz fragmenty rzeki Warty położone w województwie śląskim, na terenie powiatów kłobuckiego i częstochowskiego, oznaczone na mapie współrzędnymi 51°05'25.4"N, 18°56'57.2"E - 51°05'11.3"N, 18°57'36.7"E; 51°04'34.8"N, 18°59'29.4"E - 51°03'38.2"N, 19°00'32.9"E oraz 51°01'55.6"N, 19°15'59.3"E - 51°01'37.0"N, 19°19'09.1"E).

Bakteria może przenosić się z zakażonymi wodami powierzchniowymi, dlatego nie należy stosować wody pochodzącej z wyżej wskazanych obrębów rzeki Warty do nawadniania oraz opryskiwania roślin ziemniaka i pomidora oraz innych żywicielskich roślin z rodziny psiankowatych.

Z uwagi na biologię bakterii nie zaleca się również stosowania nawadniania wodami z rzeki Warta na polach, na których w najbliższych 3 latach planuje się uprawę ziemniaków, pomidorów i innych roślin żywicielskich z rodziny psiankowatych.

Bakteria nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, ale jest agrofagiem kwarantannowym porażającym niektóre gatunki roślin uprawnych i dzikorosnących m. in. ziemniaki, pomidory, psianki. W związku z tym ma duże znaczenie gospodarcze, a podejmowane przez PIORiN działania mają na celu zapobieganie wystąpieniu strat w rolnictwie.

Pozostałe drogi rozprzestrzeniania się bakterii to zainfekowane:

- rośliny, w tym bulwy ziemniaka;
- narzędzia, środki transportu i gleba przylegająca do sprzętu używanego przy produkcji roślin żywicielskich.

W przypadku, gdy zainfekowane zostaną rośliny ziemniaka lub pomidora, porażenie w większości przypadków jest bezobjawowe, a objawy chorobowe obserwuje się dopiero w kolejnych sezonach uprawy w następujących postaciach:

- na częściach zielonych roślin żywicielskich:

- więdnienia pojedynczych liści na końcach łodyg;
- brązowych przebarwień łodyg i liści prowadzących do zamierania roślin;
- wycieku białego śluzu bakteryjnego po przekrojeniu łodygi;

- *na bulwach ziemniaka po ich przekrojeniu:*

- brązowych przebarwień tkanki;
- wycieku kremowego śluzu bakteryjnego i gnicia bulw.

Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się bakterii zaleca się dokładne obserwacje upraw ziemniaków i pomidorów pod kątem objawów powodowanych przez bakterię. W przypadku ich zaobserwowania należy skontaktować się niezwłocznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi (tel:42 633 99 72, e-mail: dnf-lodz@piorin.gov.pl). Szczegółowe informacje nt. bakterii można uzyskać na stronie www.piorin.gov.pl oraz pobrać ulotkę pod linkiem: <https://www.gov.pl/attachment/ba3b35f2-5943-4fca-ba88-b58a68fa4ce1>