



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.68.2025

DHR.rs2.8202.69.2025

DHR.rs2.8207.7.2026

DHR.rs2.8207.8.2026

DECYZJA nr R - 273/2026d

Na podstawie art. 45 i art. 51 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o *środkach ochrony roślin*² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosków z 19 lutego 2026 r. i z 22 lipca 2025 r. spółki Innvigo Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa dotyczących poniżej wskazanych zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

L.p.	Nazwa środka ochrony roślin	Nr zezwolenia
1.	Etiuda 250 EC	R-112/2023 z dn.06.07.2023 r.
2.	Fermata 250 EC	R-113/2023 z dn.06.07.2023 r.

zmieniam

powyżej wskazane zezwolenia, w następujący sposób:

- 1) Poniżej wskazane załączniki do przedmiotowych zezwoleń:
 - Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.
 - Załącznik nr 4 - Okresy karencji.
 - Załącznik nr 5 – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.
 - Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

²Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1709 t.j.).

- Załącznik nr 7 – Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.
 - Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin.
- otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4:
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
2. Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2:
H315 - Działa drażniąco na skórę.
3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1:
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
4. Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4:
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
5. Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe:
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
6. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2:
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
7. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 2:
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
8. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1:
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
9. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1:
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302, H315, H318, H332, H335, H361d, H373, H410

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 – Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy.

P264 – Dokładnie umyć zanieczyszczone części ciała po użyciu.

P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto jare – 35 dni.

Plantacje nasienne soczewicy jadalnej, plantacje nasienne grochu zwyczajnego, plantacje nasienne grochu pastewnego, plantacje nasienne grochu zielonego łuskowego, plantacje nasienne grochu zielonego cukrowego, plantacje nasienne łubinu - 21 dni.

Groch siewny zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch siewny zwyczajny uprawiany na suche nasiona, groch siewny pastewny uprawiany na suche nasiona, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, fasola wielokwiatowa uprawiana na świeże nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona, fasola zwykła uprawiana na świeże nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa – 21 dni.

Szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, krzewy ozdobne, tytoń – nie dotyczy.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Po użyciu środka dokładnie umyć zanieczyszczone nim części ciała.

Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą podczas wchodzenia na obszar poddany zabiegowi.

W czasie oprysku należy zastosować strefę ochronną od zabudowań mieszkalnych/siedlisk oraz osób postronnych:

- 5 m dla zbóż, soczewicy, grochu, fasoli, łubinu, szkótek drzew iglastych i liściastych, krzewów ozdobnych i tytoniu.

Podczas stosowania na zbożach, soczewicy, grochu, fasoli, łubinu, stosować dodatkowo rozpylacze redukujące znoszenie cieczy przynajmniej o 50%.

Po wykonanym zabiegu na zbożach umieścić w widocznych miejscach wokół pola tablice ostrzegawcze o brzmieniu: *Zakaz wstępu osobom postronnym na teren poddany zabiegom środkami ochrony roślin*. Tablice powinny pozostać do czasu zbioru roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

W przypadku szkółki drzew iglastych i liściastych, krzewów ozdobnych i tytoniu prace prowadzące do kontaktu z rośliną dozwolone są po 7 dniach.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W przypadku uprawy zbóż:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy bobowatych i strączkowych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy tytoniu, szkółek drzew iglastych, szkółek drzew liściastych oraz krzewów ozdobnych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 40 m zadarnionej na szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

- 1 m w przypadku zastosowania opryskiwaczy polowych lub
- 3 m w przypadku zastosowania opryskiwaczy sadowniczych.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc, lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/ lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.***

Żyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Plantacje nasienne soczewicy jadalnej, plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego, plantacje nasienne grochu zwyczajnego pastewnego, plantacje nasienne grochu zielonego łuskowego, plantacje nasienne grochu zielonego cukrowego

zgorzelowa plamistość grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,268 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty do początku dojrzewania nasion (BBCH 60-80).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Plantacje nasienne łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego

zgorzelowa plamistość grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,268 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty do początku dojrzewania nasion (BBCH 60-80).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Groch zwyczajny siewny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, fasola wielokwiatowa uprawiana na świeże nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona, fasola zwykła uprawiana na świeże nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa

zgorzelowa plamistość grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,268 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty do początku dojrzewania nasion (BBCH 60-80).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, krzewy ozdobne

alternarioza, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego 2 liścia do zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 12-85).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Tytoń

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 2 liści do 50% torebek nasiennych brązowych (BBCH 12-85).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Uzasadnienie

Wnioskami z 22 lipca 2025 r. spółka Innvigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się w trybie art. 51 rozporządzenie nr 1107/2009 o rozszerzenie zakresu stosowania środków ochrony roślin Etiuda 250 EC i Fermata 250 EC obejmujące zwalczanie czerni krzyżowych w uprawie kapusty brukselskiej, brokuła i kalafiora, rdzy pora, fytoftorazy pora i alternariozy w uprawie cebuli i czosnku, mączniaka rzekomego cebuli, alternariozy, stemphylium (ograniczenie występowania) w uprawie szalotki, rdzy cykorii i alternariozy w uprawie cykorii korzeniowej, alternariozy naci marchwi, mączniaka prawdziwego baldaszkowatych w uprawie marchwi, pasternaka, pietruszki korzeniowej, alternariozy i mączniaka prawdziwego w uprawie słonecznika bulwiastego, salsefii, brukwi, rzepy i chrzanu, mączniaka prawdziwego buraka w uprawie buraka ćwikłowego, zgnilizny twardzikowej w uprawie selera korzeniowego, szarej pleśni w uprawie rzodkwi, szarej pleśni, zarazy ziemniaka w uprawie pod osłonami pomidora, zgorzelowej plamistości grochu na plantacjach nasiennej soczewicy jadalnej, grochu zwyczajnego siewnego, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zielonego łuskowego, grochu zielonego cukrowego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego oraz w uprawie grochu zwyczajnego siewnego uprawianego na świeże nasiona, grochu zwyczajnego siewnego uprawianego na suche nasiona, groch zwyczajnego pastewnego uprawianego na suche nasiona, grochu zielonego łuskowego, grochu zielonego cukrowego, fasoli wielokwiatowej uprawianej na świeże nasiona, fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona, fasoli zwykłej uprawianej na świeże nasiona, fasoli zwykłej uprawianej na suche nasiona, fasoli szparagowej, antraknozy liści porzeczek, rdzy wejmutkowo-porzeczkowej w uprawie porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej i agrestu, szarej pleśni w uprawie borówki czarnej, żurawiny, morwy i bzu czarnego, szarej pleśni w uprawie aronii i dzikiej róży, szarej pleśni, przypąkowego zamieranie pędów maliny w uprawie borówki wysokiej, maliny i malinojeżyny, szarej pleśni, białej plamistości liści truskawki i mączniaka prawdziwego truskawki w uprawie truskawki, brunatnej zgnilizny drzew pestkowych w uprawie czereśni, wiśni, moreli, brzoskwini i śliwy antraknozy w uprawie orzecha włoskiego i orzecha laskowego, zgorzeli kory jabłoni, gorzkiej zgnilizny jabłek w uprawie gruszy, gruszy azjatyckiej, nieszpuki i pigwy, alternariozy, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej w uprawie szkółek drzew iglastych i liściastych i uprawie krzewów ozdobnych oraz zgnilizny twardzikowej w uprawie tytoniu.

Wnioskowane rozszerzenie zakresu stosowania zostało ocenione w zakresie toksykologii, metabolizmu i pozostałości, losu i zachowania środka w środowisku i ekotoksykologii – raport rejestracyjny sporządzony przez spółkę 3P Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z listopada 2025 r.

Na podstawie przeprowadzonej w ww. zakresach oceny, pozytywnie zaakceptowane zostały zastosowania środków ochrony roślin Etiuda 250 EC i Fermata 250 EC dotyczące zwalczania

zgorzelowej plamistości grochu na plantacjach nasiennych soczewicy jadalnej, grochu zwyczajnego siewnego, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zielonego łuskowego, grochu zielonego cukrowego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego oraz w uprawie grochu zwyczajnego siewnego uprawianego na świeże nasiona, grochu zwyczajnego siewnego uprawianego na suche nasiona, groch zwyczajnego pastewnego uprawianego na suche nasiona, grochu zielonego łuskowego, grochu zielonego cukrowego, fasoli wielokwiatowej uprawianej na świeże nasiona, fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona, fasoli zwykłej uprawianej na świeże nasiona, fasoli zwykłej uprawianej na suche nasiona, fasoli szparagowej oraz alternariozy, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej w uprawie szkółek drzew iglastych i liściastych i uprawie krzewów ozdobnych oraz zgnilizny twardzikowej w uprawie tytoniu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowe środki ochrony roślin spełniają wymagania określone w art. 29 i w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenie nr 1107/2009.

Środek Etiuda 250 EC i środek Fermata 250 EC mogą być stosowane w rozszerzonym na uprawy małoobszarowe zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Ponadto wnioskami z 19 lutego 2026 r. spółka Innvigo Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę klasyfikacji środka ochrony roślin Etiuda 250 EC i środka ochrony roślin Fermata 250 EC związaną ze zmianą klasyfikacji substancji czynnej – pyraklostrobiny na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2024/2564 z dnia 19 czerwca 2024 r. *zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji*. Wnioskowana zmiana klasyfikacji ww. środków ochrony roślin została oceniona w raporcie rejestracyjnym wykonanym przez spółkę 3P Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z listopada 2025 r.

Pismem z dnia 6 marca 2026 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki Innvigo Sp. z o.o. w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.³ (dalej jako: k.p.a.), został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. Pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagi, które ostatecznie w dniu 20 kwietnia 2026 r. zostały zaakceptowane.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.)

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a..

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

⁴ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1847 t.j.).

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2026 r., poz.143 t.j.).

(za zwrotnym dowodem doręczenia – e-Doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

([zezwolenia.sor@piorin.gov.pl](mailto:zezwozenia.sor@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych