



Znak sprawy: DHR.rs1.8200.21.2023

ZEZWOLENIE nr R-28/2025

Na podstawie art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 Października 2023 r. złożonego przez spółkę ORO Agri Europe S.A., Estrada Municipal 533, Estrada do Lau 2950-401 Palmela, Republika Portugalska, zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009.

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Prev-Gold**

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	ORO Agri Europe S.A., Estrada Municipal 533, Estrada do Lau 2950-401 Palmela, Republika Portugalska
Producent środka ochrony roślin:	ORO Agri Europe S.A., Estrada Municipal 533, Estrada do Lau 2950-401 Palmela, Republika Portugalska
Rodzaj środka ochrony roślin:	fungicyd, insektycyd
Kategoria użytkowników środka	użytkownicy profesjonalni

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

ochrony roślin:	
Substancja czynna:	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)– 60 g/l (5,90%)
Państwo członkowskie odniesienia, z którego następuje wzajemne uznanie zezwolenia:	Republika Francuska
Numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin w państwie członkowskim odniesienia, wraz z datą jego wydania:	2190538 z 07 października 2019 r. wraz z decyzjami z dnia: 30 kwietnia 2020 r., 26 czerwca 2020 r oraz 26 maja 2023 r.
Nazwa handlowa środka ochrony roślin, wprowadzanego do obrotu w państwie członkowskim odniesienia:	Prev-Gold
Okres ważności środka ochrony roślin	2 lata

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
5 l; 20 l	HDPE
1 l - 10 l	HDPE/PA/HDPE
1 l; 10 l	HDPE/EVOH/HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 31 grudnia 2027 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EEG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2:
H315 - Działa drażniąco na skórę
2. Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2:
H319 - Działa drażniąco na oczy.
3. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2:
H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS 07, GHS 09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H 315, H319, H411

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH 208 - Zawiera olejek pomarańczowy (D-limonen) oraz 1,2-benzitiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD o działaniu kontaktowym i FUNGICYD o działaniu powierzchniowym w postaci mikro-emulsji (ME).

Na roślinie środek działa powierzchniowo.

Substancja czynna środka (olejek pomarańczowy) uszkadza woskową warstwę egzoszkieletu szkodników o miękkich ciałach, powodując efekt desykacji (wysuszenia). Ponadto ma ona zdolność wnikania do układu oddechowego szkodników (tchawek) utrudniając pobieranie tlenu.

Działanie grzybobójcze olejku pomarańczowego polega na wysuszeniu ścian komórkowych grzybnii oraz zarodników grzybów.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy szklarniowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Por (w uprawie w polu)

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub objawów ich żerowania od fazy, gdy wyraźnie jest widoczny 2. liść do fazy, gdy wzrost jest zakończony (długość i średnica łodygi typowa dla odmiany) (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (cyklu uprawy): 6

Uwaga: środek tylko ogranicza występowanie wciornastka tytoniowca.

Cebula (w uprawie w polu)

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub objawów ich żerowania od fazy, gdy wyraźnie jest widoczny 2. liść do fazy, gdy liście zamierają, a szczyt cebuli usycha (okres zbioru) (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Uwaga: środek tylko ogranicza występowanie wciornastka tytoniowca.

Jabłoń

Mączniak jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha (4,5 l / 10 000 m² ściany liści (ściany owoconośnej) –LWA)

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy nabrzmiewają pąki kwiatowe (łuski pąkowe wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami) do fazy początku dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku kolor), z wyłączeniem fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Liczba zabiegów: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie mączniaka jabłoni.

Bawełnica korówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha (4,5 l / 10 000 m² ściany liści (ściany owoconośnej) –LWA)

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy rozwoju pąków liściowych do fazy początku dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku kolor) (BBCH 00-81), z wyłączeniem fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Uwaga: środek tylko ogranicza występowanie bawełnicy korówki.

Zalecana ilość wody: 400 - 1000 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Grusza

Miodówki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,8 l/ha (3,6 l /10 000 m² ściany liści (ściany owoconośnej) –LWA)

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników (w tym jaj i larw) lub objawów ich żerowania, od początku fazy rozwoju pąków liściowych do fazy początku dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku kolor) (BBCH 00-81), z wyłączeniem fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie miodówek.

Zalecana ilość wody: 400 - 800 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Truskawka (w uprawie w polu, w uprawie w szklarni i pod osłonami)

Mączniak prawdziwy truskawki

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,4 l/100 wody (0,4%)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (BBCH 69-89).

Liczba zabiegów: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 6

Zalecana ilość wody: 500 - 800 l/ha

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności (uprawa w szklarni i pod osłonami) lub tylko ogranicza występowanie (uprawa w polu) mącznika prawdziwego truskawki.

Kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka (w uprawie w polu)

Mączliki

Maksymalne/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%)

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub uszkodzeń przez nie powodowanych od fazy 2. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 12-49).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie mączlików.

Załącznik nr 3 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek zawiera jako substancję czynną związek pochodzenia naturalnego i może wykazywać zmienny poziom działania. Z tego względu nie we wszystkich przypadkach można oczekiwać zadowalającej skuteczności.

Ilość cieczy użytkowej środka dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin na opryskiwanej plantacji.

Celem uniknięcia ewentualnych objawów fitotoksyczności zaleca się, aby stężenie środka w cieczy użytkowej wynosiło maksymalnie 0,4% (ochrona truskawki) lub 0,6% (ochrona pozostałych upraw).

Zabieg należy wykonywać przy umiarkowanych temperaturach powietrza (np. w godzinach porannych lub wieczornych). W przypadku zabiegu wykonanego w wyższych temperaturach powietrza ciecz użytkowa zbyt szybko odparowuje, co może prowadzić do wytworzenia się nadmiernie stężonego osadu zwłaszcza na brzegach opryskiwanych części roślin, i w konsekwencji prowadzić do powstawania uszkodzeń na chronionych roślinach.

W przypadku uprawy z wykorzystaniem folii, włókniny itp. do okrywania/ściółkowania podłoża ilość cieczy użytkowej dostosować w taki sposób, aby nie doprowadzić do jej zalegania na powierzchni okrytego podłoża ponieważ może to prowadzić do nasiąkania owoców (np. w uprawie truskawki) cieczą użytkową i ich uszkodzeń (oparzeń).

Zalecana dawka środka w ochronie jabłoni i gruszy pionowo w szklarni odniesiona jest do faktycznego obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany liści (ściany owoconośnej)” - LWA:

$$\text{Powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]} = \frac{2 \times \text{wysokość opryskiwanej korony drzewa [m]} \times 10\,000}{\text{rozstawa rzędów [m]}} \quad [\text{m}^2\text{/ha}]$$

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha uprawy (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

$$\text{Ilość środka [l/ha]} = \frac{\text{zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [l/10\,000 m}^2\text{]} \times \text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}{10\,000 [\text{m}^2\text{/ha}]}$$

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki środka 6,0 l/ha (jabłoni) i 4,8 l/ha (grusza) nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki.

Załącznik nr 4 - OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

cebula, jabłoń, grusza – 3 dni,

por, truskawka, kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka – 1 dzień.

Załącznik nr 5 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas pracy na obszarze po zabiegu.

Podczas stosowania na rośliny sadownicze: W czasie oprysku należy zastosować co najmniej 10 m strefę ochronną od zabudowań mieszkalnych/siedlisk oraz osób postronnych.

Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Dla ludzi - 24 godziny

Załącznik nr 6 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Środek może być niebezpieczne dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku zastosowań w uprawach pod osłonami, nie należy stosować środka, gdy:

- znajdują się tam owady zapylające,
- wprowadzono pożyteczne owady.

Jabłoń, grusza

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pozostałe uprawy wskazane w etykiecie.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej.

Załącznik nr 7 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 5-25°C, z dala od źródeł ciepła, promieniowania, elektryczności statycznej,

Chronić przed światłem słonecznym i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego kontaktu z materiałami utleniającymi i mocnymi kwasami.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Załącznik nr 8 - POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia z uwzględnieniem informacji o konieczności wstrząśnięcia zawartością opakowania przed otwarciem oraz informacji o zaleceniu dodania środka zapobiegającego nadmienianemu pienieniu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 października 2023 r. złożonym zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka ORO Agri Europe S.A., Estrada Municipal 533, Estrada do Lau 2950-401 Palmela, Republika Portugalska wystąpiła o wzajemne uznanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Prev-Gold.

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 29 przedmiotowego rozporządzenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenie dla tego samego środka ochrony roślin, takiego samego zastosowania i przy zastosowaniu porównywalnych praktyk rolnych w innym państwie członkowskim.

Przedmiotowy środek pod nazwą handlową Prev-Gold dopuszczony jest do obrotu w Republice Francuskiej zezwoleniem nr 2190538 z dnia 07 października 2019 r.

W toku postępowania administracyjnego stwierdzono spełnienie wymagań w zakresie wzajemnego uznania zezwolenia określonych w art. 40-42 rozporządzenia nr 1107/2009.

Ponadto na podstawie oceny sporządzonej przez podmiot upoważniony Eko-Futura Sp. z o. o. z dnia 14 lutego 2025 r. potwierdzono, że w skład środka nie wchodzi składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Pismem z dnia 21 lutego 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce ORO Agri Europe S.A., z siedzibą w Republika Portugalskiej w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)⁵, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 27 lutego 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wniósł uwag.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku,

⁵ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.);

określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁶, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 31 grudnia 2027 r.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁷.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 §3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 §1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁸ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 §1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

⁶ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

⁷ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z późn. zm.)

⁸ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935 t.j.)

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych