

**Posiadacz zezwolenia:**

Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii, tel.: +32 473 349 885, fax: +32 24633658, e-mail: regn@shardaintl.com

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa, tel.: +48 17 240 13 07, e-mail: eu.sales@shardaintl.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: (...)**

## LIMA ORO 3 GB

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

**metaldehyd** (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3 %)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 195/2015 z dnia 30.10.2015 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -778/2020d z dnia 28.10.2020. r.**

**Środek ochrony roślin w przypadku spożycia może być śmiertelny dla psów i innych zwierząt domowych oraz gospodarskich. Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin.  
W przypadku podejrzenia spożycia: skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.**

EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P262	Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
Nie wyklądać w kupkach.	

### OPIS DZIAŁANIA

LIMA ORO 3 GB jest środkiem ślimakobójczym w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków nagich.

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

### STOSOWANIE ŚRODKA

#### Zboża

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia ( do BBCH 29).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### Rzepak ozimy, rzepak jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia ( do BBCH29).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Kukurydza**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy 5 liści ( do BBCH15).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Salata, rukieta siewna**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować od sadzenia do fazy, gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub główny pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (do BBCH39).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

## **STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik*

### **Kapusta głowiasta**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 5 liścia (do BBCH 15).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Len oleisty uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia ( do BBCH 17).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Mak uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia ( do BBCH 17).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### **Lnicznik siewny (Inianka siewna)**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### **Słonecznik uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (do BBCH 17).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### **Gorzycza biała, gorzycza sarepska**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca formowania pędów bocznych, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych ( do BBCH 29).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### **Soja**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu ( do BBCH 29).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

#### **Winorośl**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować od posadzenia do końca fazy kwitnienia ( do BBCH 69).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Pigwa pospolita, nieszpulka zwyczajna**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do końca fazy 9 lub więcej widocznych pędów (do BBCH 29).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

### **Rośliny ozdobne**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

1. Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.
2. Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie, gdy ślimaki są najbardziej aktywne. W przypadku dużego nasilenia występowania ślimaków nagich może być konieczne powtarzanie zabiegów.
3. Nie stosować podczas silnych opadów deszczu, który może zmniejszyć trwałość granul.
4. Późne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie granul na liściach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas zbiorów roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zebrać rozsypany przypadkowo produkt.

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w chłodnym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji – .....

Zawartość netto – .....

Nr partii – .....