

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 926/2019d z dnia 19.12.2019 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 24/2017wu z dnia 15.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04 - 041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, e-mail: infopl@evergreengarden.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (...):

ROUNDUP ŻEL MAX

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 72 g/l (6,72%).

**Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2017wu z dnia 15.05.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 926/2019d z dnia 19.12.2019 r.**

EUH208	Zawiera 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3-on i 2-metyl-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Roundup Żel Max jest herbicydem, w formie żelu, do bezpośredniego stosowania na liście chwastów, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych chwastów (rocznych i wieloletnich) w ogrodach przydomowych i działkowych, w tym na powierzchniach wyłączonych z uprawy oraz zapobieganiu powstawania odrostów z pniaków drzew i krzewów świeżo ściętych nad powierzchnią gleby.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Żel Max jest herbicydem dolistnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnienie) są widoczne po upływie 10-15 dni od zabiegu. Zniszczenie systemu korzeniowego chwastu trwa do 28 dni w zależności od chwastu i warunków atmosferycznych. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Niskie temperatury i mała wilgotność spowalniają działanie środka.

Jednorazowy zabieg środkiem Roundup Żel Max niszczy większość chwastów, wyrastających na przejściach, przejazdach, ścieżkach ogrodowych, jak również na powierzchniach utwardzonych lub wyłożonych żwirem, wzdłuż krawędzi trawników i ogrodzeń.

Środek Roundup Żel Max jest szczególnie przydatny do zwalczania chwastów uciążliwych, rosnących w miejscach trudno dostępnych, chwastów w późniejszych fazach rozwojowych czy też chwastów o zdrewniałych łodygach. Stosowanie środka Roundup Żel Max zapobiega również powstawaniu odrostów ze świeżo ściętych pniaków drzew i krzewów jednocześnie nie powodując przyspieszenia procesu rozkładu pnia. Na pniakach można nie zauważyć skuteczności działania środka, nie mniej w następnym sezonie nie powinny pojawiać się odrosty.

Roundup Żel Max zwalcza chwasty takie jak: szczawie, pokrzywy, powój polny, osty, ostrożeń, niezdrewniałe siewki drzew i krzewów, odrosty czarnego bzu, jeżyny, bluszczy, dzikiej wiśni, jesionu, rododendronu i innych gatunków inwazyjnych drzew i krzewów.

STOSOWANIE ŚRODKA

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Ogrody przydomowe i działkowe, w tym powierzchnie wyłączone z uprawy.

Otwarcie pojemnika: Ścisnąć dwa dolne brzegi niebieskiej pokrywki zamykającej pojemnik. Pokrywki wysunąć i odłożyć. Usunąć aluminiową folię zabezpieczającą otwory pojemnika. Przed pierwszym użyciem środka nacisnąć około 20 krotnie niebieski przycisk umieszczony w dolnej części pojemnika, dopóki żel pojawi się w odbezpieczonych otworach pojemnika.

Po pracy: oczyścić z żelu powierzchnię aplikatora liśćmi chwastów, dokładnie zamknąć pojemnik nakładając szczelnie niebieską pokrywki.

Zwalczanie chwastów oraz zbędnej roślinności

Stosowanie: Naciśnięcie niebieskiego przycisku umieszczonego przy dnie pojemnika powoduje pojawienie się żelu, którym delikatnie dotykać/mazać liście chwastów. Nie ma potrzeby dokładnego pokrycia żelem całej powierzchni liści chwastu. Jedno lub dwukrotne naciśnięcie przycisku uwalnia żel wystarczający na przeniesienie środka na rośliny według poniższego schematu:

- 1 naciśnięcie w celu zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych (szczawii, pokrywki, ostów, ostrożeń, powoju polnego,)
- 2 naciśnięcia w celu zwalczania chwastów o zdrewniałych łodygach oraz czarnego bzu, jeżyny, młodych siewek drzewek i krzewów.

Stosując środek Roundup Gel Max należy pokryć powierzchnię liści o wymiarach 30 x 40 cm, zaczynając najpierw od liści najstarszych, a następnie aplikować środek co trzeci liść.

Roundup Gel Max stosować najlepiej gdy chwasty rosną i mają odpowiednio rozwiniętą powierzchnię liści zdolną do absorpcji środka, ale najpóźniej do momentu kwitnienia.

Odczekać co najmniej 5 dni przed wzruszaniem gleby lub z innymi pracami uprawowymi pozwalając tym samym na przemieszczenie się substancji czynnej środka do systemu korzeniowego i skuteczne zniszczenie chwastu.

Ponowne zastosowanie środka może okazać się konieczne, gdy odrosty pojawią się w następnym sezonie wegetacyjnym.

Zwalczanie odrostów wyrastających powyżej powierzchni gleby ze świeżo ściętych pniaków drzew i krzewów

Stosowanie: Należy pomazać całą powierzchnię pniaka:

- 1 naciśnięcie przycisku, żel przenieść na pniak o średnicy 2 - 4 cm,
- 3 naciśnięcia na powierzchnię o średnicy 5 cm,
- więcej naciśnieć na większe pniaki.

Środek Roundup Gel Max stosować najlepiej w okresie lata i jesieni.

Odczekać 7 dni przed kopaniem/wzruszeniem/rekultywacją gleby pozwalając aby środek przemieścił się do całej strefy korzeniowej pniaka.

W przypadku pojawienia się odrostów w następnym roku po zastosowaniu środka konieczne może być ponowne zastosowanie środka.

Uwaga:

Round Żel Max zapobiega odrostom z pniaków, nie przyspiesza procesu degradacji pniaka, który następuje w wyniku procesów naturalnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Unikać kontaktu środka z roślinami nie będącymi celem zwalczania, zwłaszcza częściami jadalnymi roślin uprawnych.

1. Chcąc nie dopuścić do przenoszenia środka na trawniki lub inne rośliny uprawne, nie chodzić po traktowanym środkiem terenie dopóki żel naniesiony na chwasty nie wyschnie – dotyczy szczególnie dzieci oraz zwierząt domowych.
2. Unikać stosowania środka, gdy spodziewane są opady deszczu. Deszcz do 6 godzin od zastosowania może zredukować skuteczność działania i spowodować konieczność ponownego zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -