

Posiadacz pozwolenia:

Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 66 80 471, fax (48) 66 80 468,
e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:

Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 0118 wew. 136,
e-mail: biuro@pakon-konin.pl

VOXAMYL 10 G

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

oksamyl - (związek z grupy karbaminianów) - 100 g w 1 kilogramie środka (13,89%).

**Pozwolenie MRiRW nr R- 124/2020 h.r. z dnia 26.11.2020 r.
zmienione decyzji MRiRW nr R - 22/2022d z dnia 19.01.2022 r.**



Niebezpieczeństwo

H300 - Połknięcie grozi śmiercią.

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania pyłu.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

OPIS DZIAŁANIA

VOXAMYL 10 G jest środkiem działającym układowo w formie granul do bezpośredniego stosowania, posiadającym właściwości zwalczające owady i nicienie. Środek do stosowania doglebowego, skąd pobierany jest przez korzenie, w roślinie działa układowo.

Stosować tylko za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Ziemniak

nicienie

a) stosowanie rzędowe

Środek stosować rzędowo do redliny w czasie sadzenia ziemniaków stosując aplikator do granulowanych środków ochrony roślin połączony z sadzarką. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu środka VOXAMYL 10 G wzmacnia się początkowy rozwój roślin, co później – podczas okresu wzrostu – wzmacnia ich odporność. Ten sposób stosowania środka VOXAMYL 10 G pozwala w dużej mierze zapobiec stratom w ilości jak i jakości zbiorów wywołanych przez nicienie.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

b) równomierny wysiew na powierzchni pola

Środek należy rozsiewać na całym polu przed lub w czasie uprawy gleby przed sadzeniem ziemniaków. Środek rozsiewać równomiernie na powierzchni gleby przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i natychmiast wymieszać z glebą na głębokość 10 - 15 cm.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. Burak cukrowy

drobnica burakowa, skoczogonki, nicienie

Środek stosować podczas siewu buraków doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin. Dzięki temu zapobiega się szkodom wywołanym przez nicienie przede wszystkim w początkowym wzroście roślin.

mątwik burakowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 25 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 25 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

guzaki korzeniowe

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

nicienie wolnożyjące

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

drobnica burakowa, skoczogonki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

3. Truskawki (produkcja sadzonek)

nicienie

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek rozsiać tuż przed sadzeniem truskawki równomiernie na całym polu przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i wymieszać na głębokość ok. 10 - 15 cm, najlepiej przy użyciu glebogryzarki.

4. Marchew

nicienie migrujące, korzeniaki szkodliwe, guzaki korzeniowe

VOXAMYL 10 G może być stosowany w rzędach podczas siewu nasion marchwi przy założeniu odstępu między redlinami o szerokości co najmniej 50 cm oraz na całym polu tuż przed siewem lub podczas siewu nasion marchwi.

a) stosowanie rzędowe

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 10 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek można stosować podczas siewu marchwi przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin.

b) równomierny wysiew na powierzchni pola

Środek należy rozsiewać na całym polu tuż przed przygotowaniem lub podczas przygotowania gleby do siewu nasion marchwi. Środek rozsiewać jak najbardziej równomiernie na powierzchni przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i natychmiast wymieszać z glebą do głębokości 10 - 15 cm.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Stosować tylko za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15⁰ C.

3. W celu ochrony ptaków i wolnożyjących ssaków produkt powinien zostać w całości przykryty glebą (także przy brzegach pola), a omyłkowo rozsypany produkt powinien zostać z tego miejsca usunięty.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Po zastosowaniu środka, umyć całą odzież ochronną.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki od odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

ziemniak – nie dotyczy

burak cukrowy – nie dotyczy

truskawka - nie dotyczy

marchew – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

ziemniak – nie dotyczy

marchew – nie dotyczy

burak cukrowy – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0° C i nie wyższej niż 30° C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Objawy zatrucia

Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpił którykolwiek spośród wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna zatrucia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, unikać wysiłku; natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza

Leczenie

Podawać siarczan atropiny jako odtrutkę do pełnej atropinizacji. 2 - PAM może być użyty jako antidotum z siarczanu atropiny ale nie może być stosowany oddzielnie. Nie dopuścić do dalszego narażenia na inhibitory cholinesterazy aż do momentu całkowitego powrotu do zdrowia. Przeciwwskazanie: oksymy (pralidoksym), sukcynylocholina i inne środki cholinergiczne, stymulatory oddychania i fizostygmina. Niewskazana jest terapia morfiną.

Okres ważności: - 2 lata.

Data produkcji: -

Zawartość netto: -

Nr partii: -