# Opis taksacyjny

# Nadleśnictwa TRZCIEL

# Obręb TRZCIEL

# Część 1

# Oddziały od 1 do 124

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 80 | 34 | 25 | I | 27,95 | 1,09 | 0,9 | 2 | 317 | 370 | 6,4 | 7,5 | TP | 1,16 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 80 | 30 | 26 | I | 27,82 | | KĘP | 2 | 45 | 50 | 0,5 | 0,6 | | |
| | | | | | BRZ | 2 | 30 | 14 | 13 | II | 26,33 | | | 4 | 17 | 20 | 1,9 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 45 | 18 | 18 | II | 26,16 | | | 4 | 17 | 20 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 396 | 460 | 9,7 | 11,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1b | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 28 | 24 | IA | 31,83 | 1,05 | 0,9 | 12 | 430 | 385 | 12,7 | 11,4 | TP | 0,90 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 430 | 385 | 12,7 | 11,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 1c | I | 1,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 32 | 25 | I | 27,95 | 1,17 | 0,9 | 2 | 487 | 720 | 11,3 | 16,7 | TP | 1,48 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 487 | 720 | 11,3 | 16,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1d | II | 0,71 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 25 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 50 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | | 25 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1f | II | 0,37 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | WIK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 20 | 8 | 8 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BRZ | | 20 | 12 | 12 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 3 | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1g | IV | 0,80 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | DB | | 25 | 19 | 11 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 1h | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 60 | 25 | 24 | IA | 31,05 | 1,08 | 0,9 | 12 | 265 | 360 | 7,5 | 10,2 | TP | 1,36 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 75 | 34 | 28 | IA | 31,81 | | WKĘP | | 110 | 150 | 2,4 | 3,2 | | |
| | | | CZ ZG | | SO | 2 | 43 | 20 | 20 | IA | 32,09 | | | | 66 | 90 | 2,7 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ORZ.C | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 441 | 600 | 12,6 | 17,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1i | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 34 | 25 | I | 27,95 | 1,05 | 0,9 | 2 | 317 | 645 | 7,3 | 14,8 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 3 | 40 | 19 | 19 | I | 28,99 | | WKĘP | 4 | 68 | 140 | 2,9 | 5,8 | | |
| | | | TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 385 | 785 | 10,2 | 20,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW bagno o pow. 0,14 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1j | IV | 2,06 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | AK | | 30 | 16 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | SO | | 12 | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | 12 | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 1k | I | 0,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 32 | 16 | 15 | IA | 31,20 | 1,28 | 0,9 | 11 | 284 | 110 | 15,1 | 5,9 | TW | 0,39 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 32 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 110 | 15,1 | 5,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PRZES | DB.S | | 110 | 42 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1l | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 43 | 21 | 20 | IA | 32,09 | 1,21 | 0,9 | 11 | 295 | 505 | 10,3 | 17,8 | TP | 1,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 3 | 55 | 25 | 23 | I | 27,15 | | WKĘP | | 88 | 150 | 2,6 | 4,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 383 | 655 | 12,9 | 22,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 1m | I | 1,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 34 | 26 | IA | 31,22 | 1,03 | 0,9 | 22 | 458 | 870 | 11,8 | 22,3 | TP | 1,90 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 870 | 11,8 | 22,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1n | II | 0,24 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO | | SO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1o | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: BUD INNE | ZADRZEW | KSZ | | 75 | 40 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1p | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 63 | 26 | 24 | IA | 30,33 | 1,07 | 0,9 | 11 | 360 | 610 | 9,7 | 16,5 | TP | 1,70 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 75 | 33 | 28 | IA | 31,81 | | WKĘP | | 87 | 150 | 2,4 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 760 | 12,0 | 20,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 8 l., BRZ 4 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N luka o pow. 0,1 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1r | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 54 | 25 | 24 | IA | 32,66 | 1,06 | 0,9 | 12 | 386 | 300 | 11,8 | 9,2 | TP | 0,78 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 1 | 54 | 24 | 22 | I | 28,02 | | GRP | | 33 | 25 | 0,8 | 0,6 | | |
| | | | TD: ZG | | OL | MJS | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 325 | 12,6 | 9,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 1s | I | 0,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 85 | 30 | 23 | III | 24,55 | 0,80 | 0,9 | 3 | 317 | 155 | 7,9 | 3,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 317 | 155 | 7,9 | 3,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //ił średni //// POROL | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, nerecznica błotna, sit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1t | I | 4,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 2,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 3 | | | | | | WKĘP | | | | | | CP | 1,17 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 18 | | 6 | II | 28,12 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | JW | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | GB | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | JB | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | PRZES | OL | | 99 | 35 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,24 ha: OL 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w | I | 0,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 5 | 80 | 33 | 26 | I | 27,82 | 0,85 | 0,9 | 3 | 147 | 100 | 2,2 | 1,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 4 | 80 | 33 | 25 | II | 26,86 | | KĘP | 3 | 170 | 115 | 3,9 | 2,6 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | SO | 1 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | | | 3 | 34 | 25 | 0,9 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 351 | 240 | 6,9 | 4,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 7 | | 3 | IA | 32,76 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 7 | | 3 | I | 35,97 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | KL.P | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DER.Ś | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 99 | 31 | 23 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | 75 | 30 | 19 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | Razem: | | | 32 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1y | I | 2,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 45 | 22 | 20 | II | 27,82 | 0,91 | 0,9 | 21 | 284 | 615 | 11,1 | 24,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 615 | 11,1 | 24,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //piasek luźny //// POROL | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, sit, nerecznica błotna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N dolesiona luka o pow. 0,21 ha: ŚW 17 l., BRZ 17 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1z | IV | 0,02 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ax | IV | 0,02 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1bx | IV | 0,06 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1cx | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1dx | IV | 0,07 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1fx | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Służebność przejazdu w cz. Ls 0,0496 ha / całk. 0,0544 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1gx | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1~a | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1~b | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1~c | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna:<br>I – zalesiona<br>II – niezalesiona<br>III – związana z gosp. leśną<br>Nieleśna:<br>IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,55** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 818** | | | | |
| | **I** | **21,83** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,32** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 680** | | | | |
| | **III** | **0,35** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **72** | | | | |
| | **IV** | **3,05** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **63** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 815** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **1** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **2** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 203** | | | | |
| | **I** | **19,67** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,32** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 065** | | | | |
| | **III** | **0,35** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **72** | | | | |
| | **IV** | **3,05** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **63** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 200** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **1** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **2** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **2,16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **615** | | | | |
| | **I** | **2,16** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **615** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2a | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 90 | 35 | 22 | IV | 23,07 | 1,08 | 0,9 | 3 | 164 | 105 | 3,6 | 2,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 90 | 38 | 24 | II | 24,81 | | DKĘP | 3 | 59 | 40 | 0,8 | 0,5 | | |
| | | | | | SO | 1 | 90 | 35 | 24 | II | 25,37 | | | 3 | 47 | 30 | 1,0 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 3 | 60 | 20 | 19 | III | 24,45 | | | 4 | 82 | 50 | 3,0 | 1,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 352 | 225 | 8,4 | 5,4 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - WODNE | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,29 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2b | I | 1,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 30 | 26 | I | 28,94 | 1,10 | 0,9 | 2 | 476 | 475 | 11,0 | 11,0 | TP | 1,00 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 475 | 11,0 | 11,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 2c | I | 0,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 56 | 28 | 25 | IA | 33,11 | 0,99 | 0,9 | 12 | 309 | 160 | 8,8 | 4,6 | TP | 0,52 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 3 | 56 | 25 | 23 | II | 28,14 | | KĘP | | 110 | 55 | 3,7 | 1,9 | | |
| | | | TD: ZG | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 215 | 12,5 | 6,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2d | I | 0,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 40 | 21 | 20 | I | 28,82 | 0,59 | 0,9 | 12 | 109 | 65 | 6,7 | 4,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z | | OL | 2 | 55 | 28 | 22 | II | 27,55 | | GRP | | 87 | 50 | 1,6 | 0,9 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 196 | 115 | 8,3 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - WODNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, sit, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 2f | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 15 | | 7 | IA | 31,54 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,40 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 15 | | 6 | I | 30,99 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 15 | | 5 | I | 40,45 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 115 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2g | I | 0,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 24 | I | 26,95 | 0,83 | 0,9 | 2 | 329 | 205 | 8,6 | 5,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 205 | 8,6 | 5,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2h | I | 1,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 56 | 25 | 25 | IA | 33,11 | 1,19 | 0,9 | 11 | 254 | 400 | 7,2 | 11,3 | TP | 1,58 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 2 | 56 | 25 | 23 | II | 28,14 | | KĘP | | 88 | 140 | 2,8 | 4,5 | | |
| | | | | | SO | 3 | 80 | 35 | 29 | IA | 31,91 | | | | 188 | 295 | 3,7 | 5,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 530 | 835 | 13,7 | 21,7 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 2i | I | 2,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 15 | | 5 | I | 26,52 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,00 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 15 | | 8 | I | 31,38 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 25 | 13 | 13 | III | 22,02 | | | | 10 | 20 | 0,7 | 1,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 10 | 20 | 0,7 | 1,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 115 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2j | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 26 | I | 28,94 | 1,04 | 0,9 | 2 | 453 | 615 | 10,6 | 14,4 | TP | 1,36 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 615 | 10,6 | 14,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2k | I | 2,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 8 | | 3 | IA | 30,25 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,98 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 8 | | 5 | I | 38,60 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 67 | 23 | 23 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | 99 | 30 | 22 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | 120 | 55 | 23 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | 67 | 24 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 115 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,14 ha: DB 120 l., BRZ 67 l., SO 67 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 2l | I | 1,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 32 | 24 | II | 25,37 | 1,15 | 0,9 | 3 | 411 | 680 | 8,9 | 14,8 | IB (95%) | 1,66 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 60 | 25 | 24 | IA | 31,05 | | KĘP | 3 | 35 | 60 | 1,3 | 2,2 | AGROT | 1,66 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,66 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 740 | 10,3 | 17,0 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2m | IV | 0,54 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | OL | | 55 | 22 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | OL | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2n | I | 1,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 30 | 27 | IA | 32,21 | 1,04 | 0,9 | 11 | 480 | 930 | 12,1 | 23,5 | TP | 1,94 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 480 | 930 | 12,1 | 23,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODR | BK | 8 | 25 | | 7 | I | 30,99 | 0,50 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | JW | 2 | 25 | | 8 | I | 33,98 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2o | I | 1,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 7 | | 3 | IA | 32,76 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,96 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 7 | | 2 | I | 31,35 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 7 | | 6 | I | 33,61 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | JW | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SZK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | BRZ | | 79 | 27 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 79 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N bagno o pow. 0,08 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 79 l., BRZ 79 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2p | I | 1,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 30 | 25 | I | 27,95 | 1,04 | 0,9 | 2 | 431 | 680 | 10,4 | 16,4 | TP | 1,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 680 | 10,4 | 16,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, malina właściwa, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2r | I | 3,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 72 | 30 | 28 | IA | 32,38 | 1,07 | 0,9 | 2 | 510 | 1 590 | 12,1 | 37,9 | TP | 3,12 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 72 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 510 | 1 590 | 12,1 | 37,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2s | I | 1,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 43 | 20 | 19 | IA | 31,00 | 1,28 | 0,9 | 11 | 197 | 300 | 7,5 | 11,4 | TP | 1,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 43 | 22 | 20 | II | 25,89 | | WKĘP | | 66 | 100 | 2,0 | 3,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 43 | 20 | 19 | I | 27,90 | | | | 22 | 35 | 1,0 | 1,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | 2 | 75 | 35 | 29 | IA | 32,80 | | | | 109 | 165 | 2,8 | 4,2 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 394 | 600 | 13,3 | 20,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2t | IV | 2,17 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | LP | | 110 | 44 | 24 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 3 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2w | I | 1,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 29 | IA | 32,80 | 1,08 | 0,9 | 2 | 533 | 900 | 12,1 | 20,5 | TP | 1,69 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 533 | 900 | 12,1 | 20,5 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~b | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~c | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~d | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,41** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 333** | | | | | |
| | **I** | **26,18** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,52** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 145** | | | | | |
| | **IV** | **2,71** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **180** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 325** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **8** | | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 35 | 29 | IA | 31,91 | 1,11 | 0,9 | 2 | 408 | 445 | 8,3 | 9,0 | TP | 1,09 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 60 | 25 | 24 | IA | 31,05 | | WKĘP | 3 | 113 | 125 | 3,8 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 521 | 570 | 12,1 | 13,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3b | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 0,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 2 | 2 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 99 | 31 | 27 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c | I | 2,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 35 | 29 | IA | 31,91 | 1,15 | 0,9 | 2 | 408 | 1 145 | 8,5 | 23,9 | TP | 2,81 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 80 | 33 | 26 | I | 27,82 | | DKĘP | 2 | 79 | 220 | 1,1 | 3,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 80 | 30 | 25 | II | 26,86 | | | 2 | 45 | 125 | 1,2 | 3,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 532 | 1 490 | 10,8 | 30,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3d | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 16 | | 6 | I | 28,03 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,86 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 16 | | 8 | I | 29,97 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 120 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | Razem: | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 3f | I | 2,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 33 | 26 | I | 28,12 | 0,96 | 0,9 | 3 | 411 | 1 195 | 9,6 | 27,8 | IB (95%) | 2,91 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,91 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,91 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | AK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 1 195 | 9,6 | 27,8 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3g | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 28 | 23 | IA | 30,55 | 1,02 | 0,9 | 11 | 397 | 540 | 12,0 | 16,3 | TP | 1,36 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 540 | 12,0 | 16,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3h | I | 2,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 18 | | 6 | II | 28,12 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,62 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | CP | 0,57 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | PRZES | SO | | 120 | 37 | 28 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, malina właściwa, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i | I | 5,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 70 | 35 | 27 | IA | 31,79 | 1,20 | 0,9 | 12 | 392 | 2 345 | 9,2 | 55,1 | TP | 5,98 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 3 | 85 | 35 | 27 | I | 28,06 | | WKĘP | | 131 | 785 | 1,5 | 9,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 523 | 3 130 | 10,8 | 64,4 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3j | I | 0,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 32 | 22 | 20 | I | 30,69 | 1,10 | 0,9 | 12 | 185 | 155 | 9,4 | 7,9 | TW | 0,84 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 32 | 18 | 15 | IA | 31,20 | | KĘP | | 33 | 30 | 2,7 | 2,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | ŚW | 1 | 32 | 18 | 17 | I | 36,89 | | | | 22 | 20 | 1,5 | 1,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | 1 | 32 | 18 | 17 | I | 30,33 | | | | 44 | 35 | 1,1 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //torf niski //glina piaszczysta //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 240 | 14,7 | 12,3 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 3k | I | 1,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 75 | 33 | 27 | I | 29,08 | 1,08 | 0,9 | 3 | 476 | 545 | 10,6 | 12,1 | IIIB (40%) | 1,14 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | OL | 2 | 50 | 26 | 25 | I | 30,48 | | WKĘP | 4 | 102 | 115 | 3,1 | 3,5 | AGROT | 0,57 |
| | | | TD: CZ ZG | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,57 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //torf niski //glina | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | piaszczysta //// POROL | | JS | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JS | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 578 | 660 | 13,7 | 15,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3l | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 6 | 75 | 36 | 26 | I | 27,92 | 1,00 | 0,9 | 3 | 227 | 345 | 3,3 | 5,0 | IIIB (30%)/1 | 1,39 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 75 | 33 | 28 | IA | 31,81 | | WKĘP | 3 | 102 | 155 | 2,3 | 3,4 | AGROT/1 | 0,42 |
| | | | CZ ZG | | WZ | 1 | 75 | 33 | 27 | I | 30,30 | | | 3 | 34 | 50 | 1,3 | 2,0 | ODN-ZŁOŻ/1 | 0,42 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | 1 | 75 | 33 | 27 | I | 29,43 | | | 3 | 23 | 35 | 0,5 | 0,8 | BRAK WSK/2 | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 585 | 7,3 | 11,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, jeżyna, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 3m | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 42 | 22 | 19 | IA | 31,38 | 1,13 | 0,9 | 11 | 175 | 210 | 6,9 | 8,4 | TP | 1,21 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | 2 | 42 | 24 | 21 | I | 31,20 | | WKĘP | | 77 | 95 | 2,8 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | 1 | 42 | 21 | 19 | I | 28,25 | | | | 22 | 25 | 1,0 | 1,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | 1 | 42 | 18 | 18 | II | 23,76 | | | | 22 | 25 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | 1 | 60 | 25 | 23 | IA | 30,04 | | | | 33 | 40 | 1,3 | 1,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 395 | 12,8 | 15,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3n | I | 1,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 26 | I | 29,83 | 0,98 | 0,9 | 2 | 431 | 445 | 10,6 | 10,9 | TP | 1,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 445 | 10,6 | 10,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3o | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 0,88 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 5 | | 2 | I | 37,39 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3p | IV | 0,47 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3~a | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 3~b | III | 0,29 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 330** | | | | |
| | **I** | **24,82** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,39** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 250** | | | | |
| | **IV** | **0,47** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **80** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 330** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 52 | 27 | 23 | IA | 32,22 | 0,83 | 0,9 | 12 | 221 | 265 | 7,7 | 9,3 | TP | 1,21 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; | | BRZ | 2 | 52 | 27 | 22 | I | 28,50 | | GRP | | 55 | 65 | 1,4 | 1,7 | | |
| | | | Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 52 | 23 | 19 | III | 25,80 | | | | 22 | 25 | 0,9 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// POROL | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 298 | 355 | 9,9 | 12,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 4b | I | 1,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 52 | 23 | 22 | IA | 31,19 | 0,95 | 0,9 | 11 | 353 | 545 | 11,8 | 18,2 | TP | 1,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 545 | 11,8 | 18,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4c | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 130 | 39 | 22 | III | 18,75 | 0,84 | 0,9 | 3 | 253 | 195 | 5,3 | 4,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 253 | 195 | 5,3 | 4,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 4d | I | 0,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 10 | 90 | 36 | 25 | II | 25,65 | 1,02 | 0,9 | 3 | 341 | 15 | 4,1 | 0,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 341 | 15 | 4,1 | 0,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: niecierpek, jasnota, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4f | I | 2,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | 1,00 | 0,9 | 11 | 342 | 745 | 9,5 | 20,7 | TP | 2,18 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | 1 | 60 | 29 | 26 | I | 31,90 | | WKĘP | | 55 | 120 | 1,2 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | 1 | 90 | 38 | 25 | II | 25,65 | | | | 11 | 25 | 0,4 | 0,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 890 | 11,1 | 24,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4g | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 3 | 55 | 26 | 22 | I | 29,73 | 0,94 | 0,9 | 11 | 88 | 70 | 3,5 | 2,7 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; | | BRZ | 2 | 55 | 26 | 23 | I | 28,83 | | GRP | | 55 | 40 | 1,4 | 1,1 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 55 | 24 | 23 | II | 28,29 | | | | 66 | 50 | 2,4 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | 1 | 55 | 26 | 24 | IA | 32,37 | | | | 33 | 25 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OS | 1 | 55 | 28 | 24 | I | 30,81 | | | | 44 | 35 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OL | 1 | 70 | 26 | 20 | III | 23,77 | | | | 33 | 25 | 0,9 | 0,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowaty z przewarstwieniami | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 319 | 245 | 10,5 | 8,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4h | I | 1,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 35 | 25 | I | 27,95 | 1,12 | 0,9 | 2 | 465 | 595 | 10,9 | 14,0 | TP | 1,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 595 | 10,9 | 14,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4i | I | 3,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 22 | 11 | 10 | IA | 30,49 | 1,25 | 1,0 | 11 | 108 | 335 | 9,8 | 30,7 | TW | 3,12 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 22 | 8 | 8 | II | 28,36 | | WKĘP | | 16 | 50 | 2,4 | 7,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 124 | 385 | 12,2 | 38,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 85 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 4j | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 140 | 44 | 24 | III | 19,87 | 0,85 | 0,9 | 3 | 192 | 310 | 3,1 | 5,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | 1 | 110 | 40 | 24 | III | 22,83 | | GRP | 3 | 20 | 30 | 0,9 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 90 | 36 | 24 | II | 24,81 | | | 3 | 20 | 30 | 0,4 | 0,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | 1 | 90 | 27 | 20 | IV | 21,16 | | | 3 | 30 | 50 | 0,6 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | 1 | 90 | 24 | 22 | III | 23,35 | | | 4 | 10 | 15 | 0,9 | 1,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 272 | 435 | 5,8 | 9,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l. | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF, Bobry | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4k | I | 2,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 33 | 25 | I | 27,13 | 1,09 | 0,9 | 3 | 446 | 930 | 10,2 | 21,3 | IB (95%)/1 | 1,69 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 1,69 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 1,69 |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa W | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 930 | 10,2 | 21,3 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 4n | I | 0,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 130 | 44 | 18 | IV | 14,87 | 0,84 | 0,9 | 3 | 121 | 70 | 2,8 | 1,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 105 | 34 | 23 | II | 22,38 | | DKĘP | 3 | 51 | 30 | 1,4 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | LP | 1 | 105 | 37 | 23 | III | 22,62 | | | 3 | 20 | 10 | 1,2 | 0,7 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | AK | 1 | 105 | 37 | 21 | III | 20,74 | | | 4 | 30 | 20 | 0,3 | 0,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny kamienisty z | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | CZR.P | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 222 | 130 | 5,6 | 3,3 | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. | | ŚNG.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: niecierpek, śmiałek pogięty, jasnota | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4o | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4~a | III | 0,06 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4~b | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4~c | III | 0,03 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **20,92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 200** | | | | |
| | **I** | **20,74** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,17** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 195** | | | | |
| | **IV** | **0,01** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **5** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 200** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5a | IV | 0,84 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | TP | | 70 | 68 | 28 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 90 | 35 | 34 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | OL | | 50 | 22 | 19 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | OL | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5b | IV | 1,38 | Rodzaj powierzchni: PS | ZADRZEW | AK | | 100 | 45 | 25 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | | | AK | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 120 | 68 | 26 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 16 | 16 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 30 | 16 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | MD | | 30 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 47 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5c | I | 0,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 50 | 21 | 21 | II | 27,63 | 0,79 | 0,9 | 23 | 142 | 90 | 4,9 | 3,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z | | TP | 3 | 70 | 78 | 27 | I | 30,94 | | WKĘP | | 88 | 55 | 2,9 | 1,8 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 2 | 90 | 36 | 24 | III | 24,96 | | | | 77 | 50 | 1,6 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 307 | 195 | 9,4 | 5,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek luźny //// POROL | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 5d | IV | 0,83 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | OL | | 25 | 16 | 15 | | | | | 4 | | 30 | | | | |
| | | | | | DB | | 25 | 13 | 13 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | OS | | 25 | 18 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 80 | 35 | 21 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 47 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5f | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 85 | 35 | 26 | I | 28,12 | 1,24 | 0,9 | 3 | 493 | 1 125 | 10,4 | 23,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 60 | 26 | 24 | IA | 31,05 | | WKĘP | 3 | 35 | 80 | 1,4 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 528 | 1 205 | 11,7 | 26,8 | | |
| | | | | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5g | IV | 2,40 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 60 | 24 | 20 | | | | | 4 | | 300 | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,4 ha | | BRZ | | 60 | 22 | 19 | | | | | 4 | | 60 | | | | |
| | | | | | SO | | 60 | 25 | 21 | | | | | 4 | | 80 | | | | |
| | | | Informacje: REF | | OS | | 60 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | WB | | 60 | 32 | 21 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 470 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 5h | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 61 | 26 | 24 | IA | 30,81 | 1,10 | 0,9 | 21 | 382 | 650 | 10,1 | 17,1 | TP | 1,70 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 85 | 35 | 27 | I | 29,12 | | WKĘP | | 76 | 130 | 2,2 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OL | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 780 | 12,2 | 20,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5i | I | 2,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 33 | 25 | I | 27,13 | 1,17 | 0,9 | 3 | 481 | 1 115 | 10,8 | 25,0 | IB (95%) | 2,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,32 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,32 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 481 | 1 115 | 10,8 | 25,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5j | I | 6,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 42 | 18 | 18 | IA | 30,26 | 1,26 | 0,9 | 11 | 328 | 2 125 | 13,1 | 84,6 | TP | 6,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 42 | 17 | 16 | II | 24,88 | | GRP | | 22 | 145 | 1,0 | 6,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 2 270 | 14,0 | 90,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 5k | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 26 | 22 | I | 26,79 | 0,86 | 0,9 | 12 | 316 | 170 | 9,2 | 5,0 | TP | 0,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 170 | 9,2 | 5,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5~a | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,47** | | | | | | | | | | | | | | **6 324** | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | | | | |
| | **I** | **13,95** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,07** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 735** | | | | |
| | **IV** | **5,45** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 735** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **589** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6a | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 7 | 15 | | 6 | II | 26,71 | 0,80 | 0,9 | 13 | | | | | TW | 1,92 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 15 | | 7 | IA | 31,54 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 15 | | 7 | IV | 16,93 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 120 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | 100 | 32 | 21 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,11 ha: AK 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 6b | I | 2,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 55 | 23 | 24 | IA | 32,37 | 0,94 | 0,8 | 23 | 331 | 820 | 10,7 | 26,6 | TP | 2,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | 1 | 45 | 19 | 18 | III | 23,19 | | KĘP | | 22 | 55 | 0,7 | 1,8 | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 353 | 875 | 11,5 | 28,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 16 | | 2 | IV | 20,53 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6c | I | 2,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 18 | | 8 | IA | 30,38 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 2,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 18 | | 6 | I | 38,28 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | SO | | 80 | 29 | 23 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 25 l., ŚW 25 l., BK 25 l., w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6d | I | 1,27 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 30 | 26 | I | 27,36 | 1,11 | 0,9 | 3 | 399 | 505 | 9,1 | 11,6 | IB (95%) | 1,27 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 45 | 16 | 16 | III | 20,87 | | GRP | 4 | 23 | 30 | 0,8 | 1,0 | AGROT | 1,27 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | 422 | 535 | 9,9 | 12,6 | ODN-ZRB | 1,27 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 6f | I | 1,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,42 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 104 | 32 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6g | I | 1,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 22 | 22 | IA | 30,05 | 1,07 | 0,9 | 13 | 397 | 615 | 12,4 | 19,2 | TP | 1,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 615 | 12,4 | 19,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6h | I | 1,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 6 | 50 | 23 | 21 | II | 25,73 | 1,09 | 0,9 | 13 | 186 | 225 | 4,9 | 6,0 | TP | 1,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | SO | 3 | 50 | 22 | 21 | IA | 30,75 | | WKĘP | | 71 | 85 | 3,9 | 4,8 | | |
| | | | NIEZG | | BRZ | 1 | 50 | 20 | 19 | II | 25,84 | | | | 22 | 25 | 0,8 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 279 | 335 | 9,6 | 11,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 6i | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 26 | 23 | IA | 30,55 | 0,96 | 0,9 | 22 | 375 | 380 | 11,5 | 11,6 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | TP | PJD | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 380 | 11,5 | 11,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6j | I | 0,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 53 | 25 | 22 | IA | 30,89 | 0,95 | 0,9 | 12 | 309 | 150 | 10,5 | 5,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 53 | 25 | 22 | I | 28,26 | | DKĘP | | 33 | 15 | 0,7 | 0,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | PJD | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 165 | 11,3 | 5,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6k | I | 2,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 12 | | 4 | I | 27,17 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 12 | | 3 | II | 26,99 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | | | BK | 1 | 12 | | 2 | II | 27,76 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 110 | 34 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | | 50 | 16 | 16 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 12 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 50 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 6l | I | 3,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 34 | 25 | I | 26,37 | 1,10 | 0,9 | 3 | 446 | 1 570 | 9,9 | 34,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 570 | 9,9 | 34,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6m | I | 0,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 39 | 18 | 18 | IA | 31,47 | 1,03 | 0,9 | 12 | 153 | 105 | 6,5 | 4,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 2 | 39 | 19 | 19 | I | 32,40 | | KĘP | | 49 | 35 | 2,4 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 2 | 39 | 19 | 18 | II | 27,66 | | | | 44 | 30 | 2,4 | 1,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | 1 | 35 | 14 | 16 | I | 34,81 | | | | 27 | 20 | 1,4 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OS | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 190 | 12,7 | 8,7 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6n | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 60 | 27 | 24 | IA | 31,05 | 1,01 | 0,9 | 22 | 254 | 205 | 7,2 | 5,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 80 | 33 | 27 | I | 29,93 | | WKĘP | | 177 | 145 | 4,2 | 3,4 | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 350 | 11,4 | 9,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 6o | I | 1,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 31 | 14 | 14 | IA | 30,45 | 1,04 | 0,9 | 13 | 153 | 185 | 8,9 | 10,8 | TW | 1,22 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 2 | 31 | 15 | 16 | I | 29,65 | | WKĘP | | 33 | 40 | 2,1 | 2,5 | | |
| | | | TD: ZG | | DB.S | 1 | 31 | 13 | 13 | II | 29,38 | | | | 11 | 15 | 1,0 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WB | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 197 | 240 | 11,9 | 14,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | DB.S | | 80 | 30 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6p | I | 1,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 34 | 16 | 15 | IA | 30,18 | 0,97 | 0,9 | 12 | 131 | 140 | 7,2 | 7,6 | TW | 1,06 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | ŚW | 2 | 34 | 14 | 15 | I | 34,41 | | DKĘP | | 33 | 35 | 2,7 | 2,8 | | |
| | | | ZG | | MD | 1 | 34 | 19 | 19 | I | 34,15 | | | | 27 | 30 | 1,2 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 34 | 18 | 18 | I | 28,86 | | | | 27 | 30 | 1,2 | 1,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 218 | 235 | 12,3 | 13,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | OS | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 6r | I | 0,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 100 | 36 | 27 | I | 27,00 | 0,86 | 0,7 | 3 | 191 | 95 | 3,9 | 1,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 100 | 31 | 27 | I | 27,00 | | DKĘP | 3 | 90 | 45 | 0,9 | 0,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 2 | 55 | 22 | 22 | I | 27,79 | | | 4 | 50 | 25 | 1,3 | 0,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 331 | 165 | 6,1 | 3,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6s | I | 0,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 6 | 55 | 24 | 23 | I | 28,83 | 0,83 | 0,9 | 4 | 155 | 35 | 3,9 | 0,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 55 | 25 | 22 | IA | 30,32 | | KĘP | 4 | 121 | 30 | 4,2 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 276 | 65 | 8,1 | 1,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | WB | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, poziomka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 6t | I | 5,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 85 | 35 | 28 | IA | 30,11 | 0,97 | 0,8 | 3 | 282 | 1 540 | 6,0 | 32,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 85 | 33 | 27 | I | 28,29 | | WKĘP | 3 | 70 | 380 | 0,9 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 85 | 31 | 25 | II | 26,37 | | | 3 | 47 | 255 | 1,0 | 5,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | SO | 1 | 100 | 42 | 28 | I | 28,00 | | | 4 | 35 | 190 | 0,9 | 4,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 2 365 | 8,8 | 48,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,32 ha: BRZ 30 l., OL 30 l., ŚW 30 l., SO 30 l., | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6~a | III | 0,50 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,51** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 212** | | | | |
| | **I** | **29,01** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 085** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **127** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 212** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7a | I | 0,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 29 | 25 | IA | 31,33 | 0,94 | 0,9 | 23 | 403 | 395 | 11,3 | 11,1 | TP | 0,98 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | Razem: | | | | | | | | | | 403 | 395 | 11,3 | 11,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7b | I | 3,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 8 | | 2 | II | 24,80 | 0,90 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 3,35 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 2 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | 1 | 8 | | 1 | II | 26,70 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | 1 | 8 | | 2 | III | 25,42 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | GB | PJD | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 119 | 33 | 28 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | Razem: | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E bagno o pow. 0,09 ha: BRZ 40 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 119 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 119 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 7c | I | 10,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 26 | I | 29,83 | 1,01 | 0,9 | 3 | 442 | 4 475 | 10,9 | 109,8 | TP | 10,12 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 4 475 | 10,9 | 109,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 27 | | 7 | II | 28,76 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7d | I | 2,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 36 | 28 | I | 28,00 | 0,70 | 0,3 | 3 | 313 | 840 | 6,9 | 18,6 | IIIAU (90%) | 2,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,86 |
| | | | | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,86 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 840 | 6,9 | 18,6 | CW | 0,82 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODS | DB.S | 10 | 6 | | | | | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,82 ha: DB.S 6 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 7f | I | 0,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 29 | 25 | IA | 30,87 | 1,08 | 0,9 | 23 | 458 | 235 | 12,2 | 6,2 | TP | 0,51 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 235 | 12,2 | 6,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7g | I | 10,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 30 | 26 | IA | 31,87 | 0,96 | 0,9 | 32 | 425 | 4 575 | 11,5 | 123,7 | TP | 10,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 4 575 | 11,5 | 123,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 27 | | 8 | I | 31,58 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek luźny z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C luka o pow. 0,1 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 560** | | | | |
| | **I** | **28,41** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,23** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 520** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 560** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8a | I | 1,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 1,19 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 4 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 100 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | 60 | 24 | 23 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 26 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8b | I | 3,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 26 | 24 | I | 29,87 | 0,94 | 0,9 | 23 | 382 | 1 520 | 10,8 | 43,0 | TP | 3,98 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,05 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 1 520 | 10,8 | 43,0 | ODN-LUK | 0,05 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8c | I | 6,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 37 | 17 | 16 | IA | 30,01 | 1,12 | 0,9 | 12 | 273 | 1 700 | 13,3 | 82,5 | TW | 6,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 37 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,11 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 1 700 | 13,3 | 82,5 | ODN-LUK | 0,11 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 8d | I | 1,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 33 | 27 | I | 29,12 | 1,02 | 0,9 | 3 | 458 | 825 | 10,2 | 18,4 | IIIA (40%) | 1,80 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,72 |
| | | | CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 825 | 10,2 | 18,4 | ODN-ZŁOŻ | 0,72 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8f | I | 1,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 34 | 26 | I | 29,83 | 0,91 | 0,9 | 3 | 397 | 550 | 10,1 | 14,0 | TP | 1,39 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 550 | 10,1 | 14,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8g | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 9 | | 3 | I | 28,15 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,64 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 3 | 9 | | 2 | II | 27,33 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | 1 | 9 | | 1 | III | 23,59 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h | I | 3,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 34 | 27 | I | 29,12 | 0,92 | 0,9 | 3 | 411 | 1 480 | 9,5 | 34,1 | IIIA (40%) | 3,60 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | AGROT | 1,46 |
| | | | CZ ZG | | AK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,46 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 1 480 | 9,5 | 34,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 28 | | 9 | I | 33,13 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8i | I | 3,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 30 | 25 | IA | 30,87 | 1,00 | 0,9 | 23 | 425 | 1 370 | 11,6 | 37,2 | TP | 3,22 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 1 370 | 11,6 | 37,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 30 | | 8 | II | 28,53 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 8j | I | 5,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 77 | 33 | 27 | IA | 30,46 | 1,03 | 0,9 | 3 | 419 | 2 495 | 9,9 | 59,2 | TP | 5,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | SO | 1 | 58 | 28 | 24 | IA | 31,56 | | WKĘP | 4 | 45 | 270 | 1,2 | 7,4 | AGROT | 0,70 |
| | | | CZ ZG | | BRZ | MJS | 77 | | | | | | | | | | | | ODN-LUK | 0,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 464 | 2 765 | 11,2 | 66,5 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | PODR | BK | 10 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW luka o pow. 0,09 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E luka o pow. 0,31 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE luka o pow. 0,3 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8k | III | 1,34 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8~a | III | 1,14 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8~b | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 236** | | | | |
| | **I** | **27,99** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **2,62** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 210** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **26** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 236** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9a | I | 2,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 25 | 10 | 10 | I | 28,30 | 1,03 | 1,0 | 12 | 108 | 245 | 10,3 | 23,7 | TW | 2,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 25 | 9 | 11 | II | 26,62 | | DKĘP | | 11 | 25 | 0,9 | 2,1 | AGROT | 0,12 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | ODN-LUK | 0,12 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 270 | 11,3 | 25,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 125 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 80 | 35 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OS | | 50 | 23 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | Razem: | | | 14 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E luka o pow. 0,12 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9b | I | 0,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 110 | 34 | 25 | II | 23,80 | 0,85 | 0,9 | 3 | 323 | 25 | 6,8 | 0,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 323 | 25 | 6,8 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 9c | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 34 | 27 | I | 28,36 | 0,98 | 0,9 | 3 | 434 | 335 | 9,5 | 7,3 | IB (100%) | 0,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,77 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 335 | 9,5 | 7,3 | ODN-ZRB | 0,77 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9d | I | 2,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 23 | 21 | I | 28,75 | 1,03 | 0,9 | 12 | 364 | 835 | 11,6 | 26,6 | TP | 2,30 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 835 | 11,6 | 26,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9f | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 29 | 23 | II | 25,13 | 1,07 | 0,9 | 3 | 399 | 465 | 9,6 | 11,2 | IB (95%) | 1,16 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,16 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 399 | 465 | 9,6 | 11,2 | ODN-ZRB | 1,16 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 9g | I | 1,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | 0,95 | 0,9 | 3 | 397 | 600 | 10,1 | 15,3 | TP | 1,51 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 600 | 10,1 | 15,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9h | I | 3,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 18 | 8 | 8 | IA | 30,38 | 1,00 | 1,0 | 12 | 50 | 160 | 8,1 | 26,1 | TW | 3,24 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 18 | | 5 | II | 26,13 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 18 | | 7 | I | 42,33 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | MD | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | PJD | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 50 | 160 | 8,1 | 26,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,3 ha: OL 70 l., BK 70 l., SO 110 l., BRZ 70 l., | PRZES | SO | | 110 | 34 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | | | OL | | 70 | 28 | 21 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 70 | 28 | 22 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | BK | | 70 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 57 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 9i | I | 0,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 110 | 36 | 25 | II | 23,80 | 0,85 | 0,9 | 3 | 323 | 35 | 6,8 | 0,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 323 | 35 | 6,8 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9j | I | 4,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 23 | 23 | I | 29,09 | 0,95 | 0,9 | 12 | 371 | 1 595 | 10,7 | 46,1 | TP | 4,30 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 1 595 | 10,7 | 46,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9k | I | 1,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 9 | | 2 | II | 22,92 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 1,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 9 | | 2 | II | 27,33 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 100 | 40 | 28 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | | 100 | 42 | 23 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 23 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,21 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 9l | I | 0,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 60 | 29 | 25 | IA | 32,06 | 1,02 | 0,9 | 23 | 364 | 270 | 11,1 | 8,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 60 | 26 | 24 | I | 28,80 | | DKĘP | | 55 | 40 | 0,7 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 310 | 11,8 | 8,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9m | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 32 | 25 | II | 25,66 | 0,84 | 0,9 | 3 | 337 | 575 | 7,7 | 13,2 | IB (90%) | 1,70 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,70 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 337 | 575 | 7,7 | 13,2 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 9n | I | 1,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 85 | 34 | 24 | III | 25,46 | 0,65 | 0,5 | 3 | 153 | 305 | 4,3 | 8,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 4 | 85 | 31 | 24 | II | 25,28 | | GRP | 3 | 94 | 185 | 1,3 | 2,5 | | |
| | | | | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 247 | 490 | 5,5 | 10,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - WODNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9o | I | 6,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 9 | 105 | 33 | 24 | II | 23,65 | 0,55 | 0,5 | 3 | 152 | 940 | 1,7 | 10,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 105 | 34 | 24 | III | 23,54 | | GRP | 4 | 20 | 125 | 0,5 | 3,3 | | |
| | | | | | SO | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | ŚL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 172 | 1 065 | 2,2 | 13,5 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: listera jajowata 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9p | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 7 | 62 | 23 | 22 | II | 26,37 | 0,71 | 0,9 | 4 | 164 | 190 | 3,5 | 4,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 3 | 62 | 26 | 22 | II | 26,53 | | DKĘP | 4 | 55 | 65 | 2,5 | 2,9 | | |
| | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 219 | 255 | 6,1 | 7,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - WODNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)<br>Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9r | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | ŚW | 6 | 35 | 16 | 15 | I | 33,97 | 0,62 | 0,7 | 33 | 82 | 65 | 5,6 | 4,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG | | SO | 4 | 35 | 17 | 18 | IA | 33,30 | | KĘP | | 65 | 55 | 3,8 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | MD | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JS | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 147 | 120 | 9,4 | 7,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042)<br>Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9s | III | 0,52 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9~a | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9~b | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **7 229** | | | | |
| | **I** | **30,07** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,88** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **7 135** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | **94** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **7 229** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **0,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **120** | | | | |
| | **I** | **0,82** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **120** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **7 109** | | | | |
| | **I** | **29,25** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,88** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **7 015** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | **94** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **7 109** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | I | 6,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 67 | 34 | 26 | IA | 31,43 | 1,06 | 0,9 | 22 | 469 | 2 895 | 12,1 | 74,7 | TP | 6,17 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 67 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,50 |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 469 | 2 895 | 12,1 | 74,7 | ODN-LUK | 0,50 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 8 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | 2 | 25 | | 4 | III | 23,83 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glina | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | piaszczysta ///piasek luźny //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,5 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 10b | I | 3,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 42 | 20 | 19 | IA | 31,38 | 0,86 | 0,9 | 22 | 164 | 500 | 6,8 | 20,7 | TP | 3,05 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 3 | 48 | 24 | 21 | IA | 31,40 | | KĘP | | 88 | 270 | 3,4 | 10,2 | AGROT | 0,37 |
| | | | ZG | | SO | 1 | 65 | 32 | 26 | IA | 31,87 | | | | 33 | 100 | 1,1 | 3,2 | ODN-LUK | 0,37 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 285 | 870 | 11,2 | 34,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW luka o pow. 0,37 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10c | III | 1,62 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | SAMOS | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10d | I | 2,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 36 | 28 | IA | 31,81 | 1,03 | 0,9 | 3 | 487 | 1 265 | 11,5 | 29,9 | TP | 2,60 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,48 |
| | | | ZG | | SO | PJD | 130 | | | | | | | | | | | | ODN-LUK | 0,48 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 487 | 1 265 | 11,5 | 29,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE luka o pow. 0,48 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 10f | I | 3,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 32 | 27 | IA | 32,87 | 0,94 | 0,9 | 22 | 436 | 1 500 | 11,6 | 39,8 | TP | 3,44 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,38 |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 1 500 | 11,6 | 39,8 | ODN-LUK | 0,38 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E luka o pow. 0,38 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10g | IV | 1,41 | Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R | ZADRZEW | SO | | 65 | 26 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| 10h | II | 0,99 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | OL | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PRZES | OL | | 47 | 17 | 16 | | | | | 4 | | 35 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | | 60 | 22 | 20 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10~a | III | 0,38 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,66** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 600** | | | | |
| | **I** | **15,26** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,99** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 530** | | | | |
| | **III** | **2,00** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **55** | | | | |
| | **IV** | **1,41** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 585** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **15** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11a | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 32 | 26 | IA | 31,87 | 0,86 | 0,9 | 12 | 382 | 495 | 10,6 | 13,7 | TP | 1,29 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,30 |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 495 | 10,6 | 13,7 | ODN-LUK | 0,30 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny ///utwory | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | piaszczysto-kamieniste //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S luka o pow. 0,26 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11b | III | 0,76 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11c | I | 8,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 35 | 27 | IA | 30,82 | 1,15 | 0,9 | 2 | 487 | 4 100 | 11,0 | 92,4 | TP | 8,42 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 1 | 65 | 30 | 25 | IA | 30,87 | | KĘP | 2 | 34 | 285 | 1,3 | 10,8 | AGROT | 0,39 |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-LUK | 0,39 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 521 | 4 385 | 12,3 | 103,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE luka o pow. 0,39 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 11d | I | 1,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 62 | 30 | 25 | IA | 31,57 | 0,89 | 0,9 | 12 | 185 | 370 | 5,5 | 10,9 | TP | 1,99 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 62 | 22 | 21 | II | 25,35 | | DKĘP | | 44 | 90 | 1,2 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 62 | 21 | 22 | II | 30,70 | | | | 33 | 65 | 1,4 | 2,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | 1 | 62 | 25 | 23 | II | 27,31 | | | | 44 | 90 | 1,1 | 2,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | 1 | 135 | 37 | 26 | II | 22,32 | | | | 44 | 90 | 0,6 | 1,2 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 705 | 9,7 | 19,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11f | I | 0,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 26 | 25 | IA | 30,87 | 1,13 | 0,9 | 12 | 480 | 455 | 12,6 | 12,0 | TP | 0,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 480 | 455 | 12,6 | 12,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11g | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 33 | 26 | I | 27,36 | 1,22 | 0,9 | 3 | 517 | 750 | 10,9 | 15,8 | IB (95%) | 1,45 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,45 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,45 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 517 | 750 | 10,9 | 15,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 11h | I | 2,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 24 | 23 | IA | 31,08 | 1,07 | 0,9 | 11 | 419 | 920 | 12,7 | 27,9 | TP | 2,20 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 920 | 12,7 | 27,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11i | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 40 | 18 | 17 | I | 29,91 | 0,82 | 0,9 | 11 | 174 | 335 | 8,4 | 16,2 | TP | 1,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 40 | 17 | 17 | II | 26,72 | | DKĘP | | 33 | 65 | 1,5 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 400 | 9,9 | 19,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11j | I | 3,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 36 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,9 | 2 | 442 | 1 540 | 10,8 | 37,5 | TP | 3,48 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 1 540 | 10,8 | 37,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 11k | IV | 0,52 | Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-Ł | ZADRZEW | SO | | 75 | 29 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11l | IV | 0,87 | Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R | ZADRZEW | SO | | 75 | 29 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| 11m | I | 1,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 36 | 27 | I | 28,36 | 1,06 | 0,9 | 3 | 470 | 745 | 10,0 | 15,9 | IIIA (40%) | 1,58 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,64 |
| | | | | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,64 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 470 | 745 | 10,0 | 15,9 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11n | I | 0,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CP | 0,71 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11~a | III | 0,35 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11~b | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **26,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **23,99** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **III** | **1,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **IV** | **1,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Grubizna ogółem:** | **10 425** | |
| **w tym:** | | |
| **I - drzewostany:** | **10 395** | |
| **razem:** | **10 395** | |
| **IV - zadrzewienia:** | **30** | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12a | I | 0,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 52 | 21 | 20 | I | 29,09 | 1,06 | 0,9 | 11 | 353 | 245 | 12,1 | 8,4 | TP | 0,69 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 245 | 12,1 | 8,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12b | I | 1,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 33 | 26 | IA | 31,87 | 0,91 | 0,9 | 22 | 360 | 630 | 9,9 | 17,4 | TP | 1,75 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 65 | 33 | 25 | I | 28,90 | | GRP | | 33 | 60 | 0,6 | 1,0 | | |
| | | | | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 690 | 10,5 | 18,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 12c | I | 0,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 35 | 16 | 16 | IA | 30,93 | 0,87 | 0,9 | 12 | 164 | 70 | 9,1 | 4,0 | TW | 0,44 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 35 | 14 | 13 | II | 27,59 | | DKĘP | | 22 | 10 | 1,6 | 0,7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 186 | 80 | 10,7 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12d | I | 1,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 85 | 38 | 28 | IA | 30,11 | 1,02 | 0,9 | 2 | 294 | 415 | 6,3 | 8,9 | IIIA (30%) | 1,42 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 85 | 35 | 27 | I | 28,29 | | DKĘP | 2 | 35 | 50 | 0,5 | 0,6 | AGROT | 0,43 |
| | | | | | SO | 1 | 62 | 28 | 25 | IA | 31,57 | | | 3 | 47 | 65 | 1,2 | 1,7 | ODN-ZŁOŻ | 0,43 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 62 | 25 | 25 | I | 33,17 | | | 4 | 47 | 65 | 1,6 | 2,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | 1 | 62 | 26 | 24 | II | 28,08 | | | 4 | 47 | 65 | 1,2 | 1,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 470 | 660 | 10,7 | 15,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 12f | I | 2,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 14 | 12 | 11 | I | 31,85 | 0,80 | 0,9 | 11 | 95 | 280 | 11,5 | 33,9 | TW | 2,95 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 14 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 95 | 280 | 11,5 | 33,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | OL | | 90 | 30 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12g | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 40 | 21 | 19 | IA | 32,18 | 0,91 | 0,9 | 12 | 251 | 215 | 10,9 | 9,4 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 40 | 20 | 19 | I | 28,99 | | DKĘP | | 22 | 20 | 0,9 | 0,7 | | |
| | | | | | MD | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JS | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 235 | 11,7 | 10,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12h | IV | 0,28 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 90 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 12i | I | 3,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 28 | IA | 31,81 | 1,03 | 0,9 | 2 | 487 | 1 645 | 11,5 | 38,8 | TP | 3,38 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 487 | 1 645 | 11,5 | 38,8 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,28 ha: SO 18 l., BRZ 18 l., DB.S 18 l., OL 18 l., | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12j | I | 0,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 6 | 25 | 12 | 11 | I | 30,38 | 1,19 | 0,9 | 11 | 70 | 50 | 5,9 | 4,0 | TW | 0,68 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 25 | 13 | 13 | IA | 32,84 | | KĘP | | 65 | 45 | 6,0 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 95 | 11,8 | 8,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | DB.S | | 80 | 35 | 21 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12k | I | 3,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 30 | 24 | II | 25,37 | 1,06 | 0,9 | 3 | 411 | 1 350 | 9,4 | 30,8 | IB (90%) | 3,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,29 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 3,29 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 1 350 | 9,4 | 30,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)<br>Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12l | IV | 0,26 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12m | IV | 1,44 | Rodzaj powierzchni: Ł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12n | I | 5,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | 1,14 | 0,9 | 11 | 364 | 2 175 | 10,7 | 64,1 | TP | 5,98 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 55 | 23 | 23 | I | 28,83 | | DKĘP | | 33 | 195 | 0,8 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 75 | 35 | 27 | IA | 30,82 | | | | 44 | 265 | 1,2 | 7,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 441 | 2 635 | 12,8 | 76,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042)<br>Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12~a | III | 0,35 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12~b | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)<br>Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12~c | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 970** | | | | |
| | **I** | **21,44** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,73** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 915** | | | | |
| | **IV** | **1,98** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **25** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 940** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **30** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **7,88** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 635** | | | | |
| | **I** | **5,98** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,20** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 635** | | | | |
| | **IV** | **1,70** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 635** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,27** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **15,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **III** | **0,53** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **IV** | **0,28** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Grubizna ogółem:** 5 335
**w tym:**
**I - drzewostany:** 5 280
**I - przestoje:** 25
**razem:** 5 305
**IV - zadrzewienia:** 30

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | IV | 1,00 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | SO | | 65 | 26 | 21 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 65 | 24 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 25 | 10 | 12 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 21 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13b | I | 0,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 33 | 26 | IA | 31,87 | 1,01 | 0,9 | 12 | 425 | 320 | 10,7 | 8,0 | TP | 0,75 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | OL | 1 | 65 | 28 | 24 | II | 27,70 | | KĘP | | 22 | 15 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 335 | 11,9 | 8,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 13c | I | 0,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 0,75 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 5 | | 1 | I | 29,67 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13d | I | 1,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 15 | 7 | 7 | IA | 31,54 | 1,00 | 1,0 | 11 | 40 | 65 | 7,0 | 11,0 | CP | 1,58 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 15 | | 5 | II | 28,93 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | 3 | 26 | 9 | 9 | II | 27,25 | | | | 10 | 15 | 2,1 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | GB | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 50 | 80 | 9,1 | 14,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | OL | | 50 | 22 | 21 | | | | | 4 | | 50 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.B | | 90 | 43 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 65 | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: OL 50 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13f | I | 2,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 65 | 33 | 26 | IA | 31,87 | 0,90 | 0,9 | 12 | 294 | 870 | 7,7 | 22,7 | TP | 2,96 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 2 | 65 | 32 | 25 | I | 28,90 | | DKĘP | | 65 | 190 | 1,2 | 3,5 | | |
| | | | | | OL | 1 | 65 | 27 | 23 | II | 26,91 | | | | 22 | 65 | 1,0 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 1 125 | 9,9 | 29,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 13g | I | 1,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 34 | 17 | 17 | II | 28,18 | 0,93 | 0,9 | 11 | 207 | 285 | 11,2 | 15,4 | TW | 1,37 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 285 | 11,2 | 15,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13h | I | 1,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 52 | 22 | 23 | II | 28,74 | 0,68 | 0,9 | 4 | 143 | 285 | 4,7 | 9,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 52 | 25 | 20 | II | 26,40 | | KĘP | 4 | 33 | 65 | 1,1 | 2,2 | | |
| | | | | | OL | 3 | 43 | 19 | 19 | II | 27,51 | | | 4 | 55 | 110 | 2,6 | 5,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 231 | 460 | 8,4 | 16,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna //// POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: OL 19 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,11 ha: OL 19 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 13i | I | 0,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 65 | 29 | 24 | II | 27,70 | 0,83 | 0,9 | 3 | 305 | 225 | 8,2 | 6,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 47 | 22 | 22 | I | 28,85 | | KĘP | 4 | 55 | 40 | 2,2 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | PJD | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 360 | 265 | 10,4 | 7,7 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13j | I | 0,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | 1,06 | 0,9 | 2 | 442 | 250 | 10,5 | 5,9 | TP | 0,56 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 250 | 10,5 | 5,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13k | I | 1,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 81 | 36 | 28 | IA | 30,75 | 1,25 | 0,9 | 2 | 399 | 740 | 8,8 | 16,3 | IIIA (40%) | 1,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 81 | 33 | 26 | I | 27,71 | | DKĘP | 3 | 47 | 85 | 0,6 | 1,1 | AGROT | 0,75 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 100 | 41 | 27 | I | 27,00 | | | 2 | 117 | 220 | 2,1 | 3,9 | ODN-ZŁOŻ | 0,75 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | OL | MJS | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 563 | 1 045 | 11,4 | 21,2 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 13l | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 23 | 20 | I | 27,71 | 1,03 | 0,9 | 12 | 342 | 295 | 11,3 | 9,7 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 295 | 11,3 | 9,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13m | I | 1,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 65 | 30 | 26 | IA | 31,87 | 0,66 | 0,9 | 12 | 164 | 325 | 5,2 | 10,4 | TP | 1,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | 3 | 65 | 27 | 24 | II | 27,70 | | DKĘP | | 98 | 195 | 2,6 | 5,1 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 65 | 28 | 23 | I | 26,87 | | | | 22 | 45 | 0,5 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 565 | 8,3 | 16,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, rokiet | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13~a | III | 0,96 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **17,36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 791** | | | | |
| | **I** | **15,40** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,96** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 705** | | | | |
| | **IV** | **1,00** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **65** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 770** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **21** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14a | I | 5,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 30 | 26 | I | 28,94 | 1,14 | 0,9 | 2 | 397 | 1 995 | 7,9 | 39,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 55 | 25 | 24 | IA | 32,37 | | WKĘP | 3 | 57 | 285 | 2,8 | 13,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 110 | 35 | 26 | II | 24,80 | | | 2 | 34 | 170 | 0,9 | 4,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 488 | 2 450 | 11,5 | 58,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14b | I | 2,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 35 | 28 | IA | 30,92 | 1,16 | 0,9 | 2 | 544 | 1 480 | 12,0 | 32,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | OL | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 1 480 | 12,0 | 32,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14c | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 2 | 60 | 26 | 23 | IA | 30,04 | 0,98 | 0,9 | 11 | 77 | 110 | 2,3 | 3,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 60 | 25 | 23 | I | 27,77 | | KĘP | | 66 | 95 | 1,4 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 75 | 33 | 24 | I | 27,84 | | | | 77 | 110 | 2,0 | 2,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | 1 | 75 | 28 | 22 | III | 24,82 | | | | 33 | 50 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | 1 | 75 | 33 | 24 | II | 26,42 | | | | 22 | 30 | 0,5 | 0,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.S | 1 | 75 | 28 | 23 | II | 26,62 | | | | 33 | 50 | 1,1 | 1,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | 1 | 120 | 44 | 25 | II | 22,72 | | | | 44 | 65 | 0,7 | 1,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 352 | 510 | 9,0 | 13,0 | | |
| | | | Gosp.: S | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14d | I | 1,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | 1,16 | 0,9 | 11 | 475 | 845 | 13,2 | 23,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 475 | 845 | 13,2 | 23,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 14f | I | 0,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 14 | | 7 | IA | 32,82 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 14 | | 5 | I | 30,01 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO.WE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14g | I | 0,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 14 | | 7 | IA | 32,82 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,60 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 14 | | 4 | II | 27,60 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 14 | | 4 | I | 37,44 | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | 1 | 14 | | 6 | I | 28,09 | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | MD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14~a | III | 0,01 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 285** | | | | |
| | **I** | **12,17** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,01** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 285** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 285** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **4,42** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 355** | | | | |
| | **I** | **4,42** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 355** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| **Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **7,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **3 930** | | | | |
| | **I** | **7,75** | | | | | | | | | | | | | | **3 930** | | | | |
| | **III** | **0,01** | | | | | | | | | | | | | | **3 930** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15a | I | 1,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 17 | | 8 | IA | 31,41 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 1,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 1 | 17 | | 6 | II | 29,01 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | DB.B | 1 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 110 | 29 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | | 90 | 35 | 23 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: LP 40 l., DB.S 90 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15b | I | 0,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 17 | | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 0,74 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 3 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | LP | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | KL | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PRZES | SO | | 110 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | | 110 | 45 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek darniowy, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 110 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15c | I | 3,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 28 | 24 | I | 29,22 | 0,94 | 0,9 | 21 | 382 | 1 335 | 10,5 | 36,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 1 335 | 10,5 | 36,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15d | IV | 0,17 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **5,99** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 385** | | | | |
| | **I** | **5,82** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **IV** | **0,17** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 335** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **50** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **1 385** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **3,67** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 335** | | | | |
| | **I** | **3,50** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **IV** | **0,17** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 335** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **1 335** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **2,32** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **50** | | | | |
| | **I** | **2,32** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **50** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16a | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 115 | 37 | 25 | II | 23,24 | 1,11 | 0,9 | 3 | 243 | 190 | 4,8 | 3,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 145 | 43 | 26 | III | 21,49 | | WKĘP | 3 | 162 | 125 | 2,5 | 2,0 | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | DB.S | MJS | 145 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 33% równe 18.26 st, wystawa W | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 405 | 315 | 7,3 | 5,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16b | I | 2,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 13 | 12 | IA | 31,38 | 1,18 | 1,0 | 11 | 141 | 295 | 11,3 | 23,5 | TW | 2,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 25 | 12 | 12 | I | 31,55 | | KĘP | | 16 | 35 | 1,1 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 25 | 14 | 13 | I | 29,57 | | | | 16 | 35 | 1,1 | 2,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | | | | | | | | | Razem: | | 173 | 365 | 13,5 | 28,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 145 | 42 | 26 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 145 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 16c | I | 1,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 26 | I | 28,94 | 1,10 | 0,9 | 2 | 476 | 785 | 11,0 | 18,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 785 | 11,0 | 18,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16d | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 34 | 20 | 20 | I | 30,18 | 1,03 | 0,9 | 12 | 142 | 120 | 5,7 | 4,9 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 34 | 16 | 16 | IA | 31,41 | | PAS | | 76 | 65 | 5,2 | 4,5 | | |
| | | | | | BRZ | 2 | 34 | 16 | 16 | I | 28,08 | | | | 44 | 40 | 1,9 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 225 | 12,9 | 11,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, jeżyna, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 16f | I | 2,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 65 | 27 | 24 | II | 27,70 | 1,04 | 0,9 | 3 | 240 | 575 | 6,1 | 14,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z | | OL | 3 | 55 | 23 | 22 | II | 27,55 | | KĘP | 4 | 109 | 260 | 3,7 | 8,8 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 2 | 80 | 34 | 26 | II | 27,74 | | | 3 | 109 | 260 | 2,4 | 5,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 1 095 | 12,2 | 29,1 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nerecznica błotna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16g | I | 0,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 27 | 25 | IA | 33,39 | 1,13 | 0,9 | 11 | 486 | 475 | 14,0 | 13,7 | TP | 0,98 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 486 | 475 | 14,0 | 13,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 16h | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 115 | 39 | 26 | II | 24,25 | 1,18 | 0,9 | 3 | 283 | 355 | 5,1 | 6,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 145 | 43 | 26 | III | 21,49 | | WKĘP | 3 | 162 | 205 | 2,6 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | DB.S | MJS | 145 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa W | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 445 | 560 | 7,7 | 9,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF, Bobry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16i | I | 1,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 22 | 10 | 10 | IA | 30,49 | 1,15 | 1,0 | 11 | 108 | 160 | 10,6 | 15,8 | TW | 1,49 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 22 | 8 | 8 | II | 28,36 | | KĘP | | 11 | 15 | 1,5 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | Razem: | | | | | | | | | | 119 | 175 | 12,1 | 18,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek luźny żwirowy //pył piaszczysty ///piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | SO | | 115 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | Razem: | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 16j | I | 6,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 34 | 28 | IA | 31,81 | 1,15 | 0,9 | 2 | 544 | 3 780 | 12,5 | 86,5 | TP | 6,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | DB | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 3 780 | 12,5 | 86,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | gliniasty ///piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16k | I | 2,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 28 | 25 | I | 28,84 | 1,17 | 0,9 | 2 | 385 | 865 | 9,5 | 21,3 | TP | 2,25 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 105 | 36 | 26 | II | 25,38 | | WKĘP | 2 | 102 | 230 | 1,9 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt | | | | | | | | | | Razem: | | 487 | 1 095 | 11,3 | 25,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16l | I | 2,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 42 | 18 | 18 | IA | 30,26 | 1,18 | 0,9 | 11 | 339 | 865 | 13,8 | 35,3 | TP | 2,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 865 | 13,8 | 35,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16m | I | 0,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 28 | 25 | I | 28,84 | 1,17 | 0,9 | 2 | 397 | 240 | 9,5 | 5,7 | TP | 0,60 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 105 | 36 | 26 | II | 25,38 | | WKĘP | 2 | 91 | 55 | 1,9 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 488 | 295 | 11,3 | 6,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16n | I | 2,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 30 | 28 | IA | 31,81 | 1,12 | 0,9 | 2 | 533 | 1 475 | 12,2 | 33,8 | TP | 2,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 533 | 1 475 | 12,2 | 33,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16o | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 22 | 10 | 10 | IA | 30,49 | 1,23 | 0,9 | 11 | 54 | 50 | 8,3 | 7,5 | TW | 0,90 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 22 | 8 | 8 | II | 28,36 | | KĘP | | 38 | 35 | 3,1 | 2,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 92 | 85 | 11,4 | 10,3 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 70 | 28 | 25 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 70 | 32 | 19 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 34 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 16p | I | 0,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 42 | 18 | 18 | IA | 30,26 | 0,95 | 0,9 | 11 | 273 | 140 | 11,8 | 6,1 | TP | 0,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 140 | 11,8 | 6,1 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16r | III | 0,12 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16s | III | 0,41 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | SAMOS | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16t | I | 0,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 22 | 11 | 11 | IA | 32,12 | 0,87 | 1,0 | 11 | 119 | 45 | 11,4 | 4,3 | TW | 0,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 22 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 45 | 11,4 | 4,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 16w | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 40 | 18 | 18 | IA | 31,06 | 0,96 | 0,9 | 11 | 207 | 150 | 8,5 | 6,2 | TP | 0,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | | KĘP | | 98 | 70 | 2,9 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 220 | 11,5 | 8,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16x | IV | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16y | IV | 0,12 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16z | I | 0,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 22 | 11 | 11 | IA | 32,12 | 0,87 | 1,0 | 11 | 119 | 35 | 11,4 | 3,3 | TW | 0,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 35 | 11,4 | 3,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16ax | I | 0,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | 1,10 | 0,9 | 2 | 419 | 60 | 9,7 | 1,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 60 | 24 | 22 | I | 29,02 | | DKĘP | 4 | 34 | 5 | 1,2 | 0,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 65 | 10,9 | 1,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16~a | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16~b | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,67** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 209** | | | | | | |
| | **I** | **29,56** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,86** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 095** | | | | | | |
| | **IV** | **0,25** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **114** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 209** | | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17a | I | 18,34 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego<br>Kat. ochr.: wodochronne<br>Teren: nizinny równy, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL<br>Pokrywa: zadarniona<br>Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABIL OBN<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych<br>Gosp.: OS<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.<br>Runo: borówka czarna, malina właściwa, nerecznica<br>PNSW: w części S luka o pow. 0,09 ha | DRZEW | SO | 10 | 66 | 27 | 25 | IA | 30,65 | 1,00 | 0,9 | 22 | 425 | 7 795 | 11,5 | 210,1 | TP | 18,34 |
| | | | | | OL | MJS | 66 | | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 7 795 | 11,5 | 210,1 | | |
| | | | | PODR | BK | 10 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17b | IV | 0,24 | Rodzaj powierzchni: LZ | ZADRZEW | SO | | 40 | 16 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | ORZ.C | | 60 | 32 | 10 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 17c | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 28 | 25 | I | 27,95 | 0,87 | 0,9 | 2 | 363 | 320 | 9,1 | 8,0 | TP | 0,88 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.C | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | TP | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 363 | 320 | 9,1 | 8,0 | | |
| | | | | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 60 l., SO 22 l., BRZ 22 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17d | I | 0,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 48 | 23 | 22 | IA | 32,45 | 0,98 | 0,9 | 22 | 361 | 330 | 12,6 | 11,6 | TP | 0,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 48 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 361 | 330 | 12,6 | 11,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17f | II | 0,59 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PRZES | SO | | 35 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 17g | I | 1,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 50 | 21 | 21 | II | 27,63 | 0,88 | 0,9 | 12 | 186 | 195 | 6,4 | 6,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność | | OL | 2 | 80 | 30 | 23 | III | 25,11 | | WKĘP | | 66 | 70 | 1,8 | 1,9 | | |
| | | | z TD: ZG | | BRZ | 2 | 80 | 35 | 24 | II | 25,82 | | | | 55 | 60 | 0,9 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 307 | 325 | 9,1 | 9,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, nerecznica błotna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17h | IV | 0,26 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | SO | | 30 | 16 | 12 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | SAMOS | SO | | 5 | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 17i | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 32 | 26 | I | 28,12 | 0,96 | 0,8 | 3 | 411 | 660 | 9,6 | 15,4 | IIIB (30%) | 1,61 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: | | SO | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,49 |
| | | | CZ ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,49 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 660 | 9,6 | 15,4 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, konwalia majowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17j | IV | 0,02 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17k | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17~a | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 435** | | | | | | |
| | **I** | **22,80** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **II** | **0,59** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 430** | | | | | | |
| | **III** | **0,27** | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **2** | | | | | | |
| | **IV** | **0,53** | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 432** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **3** | | | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18a | I | 2,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 27 | 25 | IA | 30,87 | 0,87 | 0,8 | 21 | 371 | 755 | 10,5 | 21,3 | TP | 2,04 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | KL | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | LP | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 755 | 10,5 | 21,3 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, malina właściwa, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18b | I | 3,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 40 | 17 | 18 | IA | 31,06 | 1,17 | 1,0 | 11 | 294 | 1 135 | 12,7 | 48,9 | TP | 3,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 40 | 15 | 17 | III | 22,99 | | WKĘP | | 22 | 85 | 0,9 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 1 220 | 13,6 | 52,3 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 15 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 18c | I | 4,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 34 | 15 | 15 | IA | 30,18 | 1,18 | 1,0 | 11 | 229 | 950 | 12,5 | 51,6 | TW | 4,14 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 34 | 13 | 14 | II | 25,61 | | DKĘP | | 22 | 90 | 1,0 | 4,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 1 040 | 13,4 | 55,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | DB.B | | 110 | 25 | 19 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,05 ha: SO 60 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18d | I | 14,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 28 | 24 | I | 29,87 | 0,91 | 0,9 | 21 | 371 | 5 205 | 10,6 | 148,0 | TP | 14,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 5 205 | 10,6 | 148,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18f | I | 2,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 34 | 27 | I | 27,00 | 0,73 | 0,3 | 2 | 313 | 800 | 7,0 | 17,8 | IIIAU (90%) | 2,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,78 |
| | | | Teren: nizinny równy | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | CW | 0,77 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 800 | 7,0 | 17,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | PODR | DB.B | 7 | 8 | | 1 | III | 22,45 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BK | 3 | 7 | | 1 | I | 30,63 | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,77 ha: BK 7 l., DB.B 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 18~a | III | 0,42 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **9 021** | | | | |
| | **I** | **26,62** | | | | | | | | | | | | | | **9 020** | | | | |
| | **III** | **0,42** | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **9 021** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19a | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 17 | | 8 | IA | 31,41 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 17 | | 7 | I | 30,79 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | 1 | 17 | | 6 | II | 29,01 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 110 | 27 | 23 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | Razem: | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 19b | I | 10,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 63 | 26 | 24 | IA | 30,33 | 0,99 | 0,9 | 22 | 360 | 3 875 | 10,3 | 110,9 | TP | 10,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 50 | 23 | 22 | IA | 31,80 | | WKĘP | | 38 | 410 | 1,2 | 13,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | LP | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | OS | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | 398 | 4 285 | 11,5 | 124,3 | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 110 l., | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW luka o pow. 0,1 ha | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 15 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19c | I | 1,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 35 | 16 | 16 | IA | 30,93 | 0,97 | 0,9 | 11 | 207 | 215 | 11,1 | 11,6 | TW | 1,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 35 | 15 | 16 | I | 27,61 | | WKĘP | | 22 | 25 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 240 | 12,0 | 12,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 19d | I | 2,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 90 | 30 | 24 | II | 25,37 | 0,91 | 0,9 | 3 | 258 | 590 | 5,9 | 13,4 | IB (95%) | 2,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 130 | 38 | 25 | III | 21,76 | | WKĘP | 3 | 59 | 135 | 1,2 | 2,8 | AGROT | 2,29 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 70 | 28 | 26 | IA | 30,80 | | | 3 | 35 | 80 | 1,1 | 2,4 | ODN-ZRB | 2,29 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 352 | 805 | 8,1 | 18,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: AK 40 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19f | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 50 | 24 | 23 | I | 29,06 | 0,99 | 0,9 | 12 | 175 | 130 | 6,5 | 4,8 | TP | 0,73 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 3 | 22 | 12 | 13 | I | 32,12 | | KĘP | | 49 | 35 | 3,3 | 2,4 | | |
| | | | | | BRZ | 2 | 40 | 18 | 18 | I | 27,86 | | | | 44 | 30 | 1,8 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 268 | 195 | 11,6 | 8,4 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, nerecznica, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 19g | I | 0,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 60 | 28 | 22 | I | 29,02 | 0,40 | 0,5 | 13 | 88 | 10 | 3,5 | 0,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 4 | 60 | 25 | 21 | II | 25,72 | | DKĘP | | 44 | 5 | 1,3 | 0,2 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 132 | 15 | 4,8 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19h | I | 0,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 45 | 28 | 20 | IA | 31,36 | 0,40 | 0,7 | 13 | 109 | 25 | 5,8 | 1,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | AK | 1 | 45 | 17 | 17 | III | 22,03 | | GRP | | 11 | | 0,4 | 0,1 | | |
| | | | CZ ZG | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | | | | | | | | | Razem: | | 120 | 25 | 6,2 | 1,4 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 19i | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 80 | 28 | 22 | III | 24,22 | 0,73 | 0,7 | 4 | 204 | 220 | 5,8 | 6,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 100 | 32 | 25 | II | 25,00 | | KĘP | 4 | 68 | 75 | 1,3 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 272 | 295 | 7,1 | 7,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19j | I | 0,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 60 | 25 | 22 | I | 29,02 | 0,88 | 0,9 | 12 | 199 | 160 | 6,2 | 4,9 | TP | 0,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 120 | 38 | 23 | III | 20,72 | | WKĘP | | 83 | 65 | 1,8 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 50 | 19 | 19 | I | 28,62 | | | | 28 | 20 | 1,1 | 0,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 310 | 245 | 9,1 | 7,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19k | IV | 0,05 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19l | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19~a | III | 0,01 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19~b | III | 0,34 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19~c | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19~d | III | 0,00 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **18,84** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **18,09** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | | | |
| | **III** | **0,70** | | | | | | | | | | | | | | **6 130** | | | | |
| | **IV** | **0,05** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **6 105** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **25** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **6 130** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | I | 2,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 70 | 30 | 27 | IA | 31,79 | 0,92 | 0,9 | 22 | 218 | 630 | 5,4 | 15,6 | TP | 2,88 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 3 | 80 | 29 | 25 | I | 27,95 | | WKĘP | | 98 | 280 | 2,8 | 8,2 | | |
| | | | ZG | | SO | 2 | 38 | 16 | 17 | IA | 30,75 | | | | 55 | 160 | 2,4 | 6,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //// POROL | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 1 070 | 10,6 | 30,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20b | IV | 3,67 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | BRZ | | 70 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20c | I | 0,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | 0,78 | 0,8 | 3 | 329 | 120 | 8,8 | 3,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 120 | 8,8 | 3,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, poziomka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20d | I | 0,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 70 | 26 | 21 | III | 24,62 | 0,81 | 0,9 | 4 | 251 | 190 | 7,3 | 5,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 70 | 28 | 24 | I | 27,10 | | GRP | 3 | 22 | 15 | 0,5 | 0,4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 205 | 7,8 | 5,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna, sit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 20f | I | 0,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 26 | 23 | II | 26,28 | 0,85 | 0,9 | 4 | 349 | 40 | 9,5 | 1,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 349 | 40 | 9,5 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | WB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20g | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 85 | 27 | 23 | III | 24,55 | 0,99 | 0,9 | 4 | 352 | 410 | 8,4 | 9,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | BRZ | 1 | 85 | 30 | 25 | II | 26,28 | | GRP | 3 | 35 | 40 | 0,4 | 0,5 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 387 | 450 | 8,9 | 10,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna, trzęślica modra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20h | IV | 0,62 | Rodzaj powierzchni: PS | ZADRZEW | DB.S | | 120 | 65 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 70 | 29 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 14 | 16 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 20 | 13 | 10 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 13 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | LSZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 20i | II | 0,07 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA<br>TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Kat. ochr.: wodochronne<br>Teren: nizinny równy, płaski<br>Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////<br>Pokrywa: zadarniona<br>Gosp.: P-Z<br>Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20j | I | 0,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Kat. ochr.: wodochronne<br>Teren: nizinny równy, płaski<br>Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL<br>Pokrywa: silnie zadarniona<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych<br>Gosp.: S<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.<br>Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, turzyca | DRZEW | OL | 10 | 50 | 23 | 21 | II | 27,63 | 1,14 | 0,9 | 12 | 394 | 380 | 13,2 | 12,8 | TP | 0,97 |
| | | | | | OL.S | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 394 | 380 | 13,2 | 12,8 | | |
| | | | | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20k | I | 2,27 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Teren: nizinny falisty<br>Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL<br>Pokrywa: silnie zadarniona<br>Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABIL OBN<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych<br>Gosp.: Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.<br>Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | DRZEW | SO | 10 | 62 | 28 | 26 | IA | 32,57 | 0,83 | 0,8 | 23 | 371 | 840 | 10,6 | 24,1 | TP | 2,27 |
| | | | | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 840 | 10,6 | 24,1 | | |
| | | | | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 20l | I | 0,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 65 | 28 | 25 | II | 28,49 | 0,67 | 0,7 | 3 | 207 | 190 | 6,3 | 5,8 | IIIA (40%) | 0,92 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | BRZ | 3 | 65 | 26 | 25 | I | 28,90 | | KĘP | 4 | 82 | 75 | 1,4 | 1,3 | AGROT | 0,37 |
| | | | TD: CZ ZG | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,37 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 289 | 265 | 7,7 | 7,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek luźny i słabogliniasty ///torf niski ////piasek | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | luźny //// POROL | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE bagno o pow. 0,11 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20m | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 20 | 19 | IA | 32,18 | 0,99 | 0,9 | 12 | 305 | 240 | 12,9 | 10,2 | TP | 0,79 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 240 | 12,9 | 10,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 20n | I | 1,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 85 | 37 | 28 | IA | 30,11 | 0,94 | 0,8 | 3 | 258 | 505 | 5,9 | 11,6 | IIIA (40%) | 1,96 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 1 | 85 | 35 | 25 | II | 26,37 | | WKĘP | 3 | 41 | 80 | 1,0 | 2,0 | AGROT | 0,79 |
| | | | TD: ZG | | SO | 2 | 57 | 25 | 24 | IA | 31,83 | | | 3 | 82 | 160 | 2,3 | 4,6 | ODN-ZŁOŻ | 0,79 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 57 | 24 | 24 | I | 33,66 | | | 4 | 53 | 105 | 1,5 | 2,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | AK | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | AK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 850 | 10,7 | 21,0 | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20o | II | 0,63 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PRZES | BRZ | | 85 | 27 | 26 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | POROL | | SO | | 25 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | 25 | 13 | 13 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 7 | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20p | I | 0,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 60 | 27 | 25 | IA | 32,06 | 0,87 | 0,9 | 12 | 276 | 140 | 7,7 | 3,8 | TP | 0,50 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | OL | 3 | 60 | 28 | 25 | I | 29,10 | | WKĘP | | 110 | 55 | 3,5 | 1,7 | | |
| | | | CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 195 | 11,2 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | DB.S | 5 | 19 | | 6 | II | 27,30 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | 5 | 19 | | 6 | I | 36,36 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 20r | I | 0,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 75 | 29 | 23 | III | 25,68 | 0,89 | 0,9 | 3 | 363 | 60 | 9,4 | 1,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 363 | 60 | 9,4 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20s | IV | 0,56 | Rodzaj powierzchni: PS | ZADRZEW | SO | | 85 | 39 | 27 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 85 | 32 | 26 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 12 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | CZM | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20t | II | 0,03 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~a | III | 0,17 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~b | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~c | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **18,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 752** | | | | |
| | **I** | **12,86** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,73** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 715** | | | | |
| | **III** | **0,33** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **7** | | | | |
| | **IV** | **4,85** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 722** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **30** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21a | I | 0,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 60 | 24 | 22 | II | 26,81 | 1,07 | 0,9 | 4 | 309 | 210 | 8,3 | 5,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | SO | 1 | 60 | 32 | 25 | IA | 32,06 | | KĘP | 3 | 39 | 25 | 1,3 | 0,9 | | |
| | | | Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 2 | 80 | 32 | 24 | III | 25,99 | | | 3 | 72 | 50 | 2,2 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 420 | 285 | 11,8 | 8,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna, sit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21b | I | 0,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 30 | 25 | I | 28,84 | 0,76 | 0,7 | 4 | 238 | 120 | 6,9 | 3,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 120 | 37 | 24 | III | 21,72 | | KĘP | 4 | 68 | 35 | 1,1 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LP | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 155 | 8,0 | 4,0 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 21c | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 17 | 10 | 10 | I | 29,24 | 1,00 | 1,0 | 12 | 100 | 85 | 9,0 | 7,8 | TW | 0,87 |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | DB.S | 2 | 17 | | 7 | I | 30,79 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 100 | 85 | 9,0 | 7,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 120 | 45 | 24 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | OL | | 85 | 27 | 22 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | LP | | 85 | 45 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB.S | | 85 | 35 | 22 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 42 | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,32 ha: DB.S 85 l., LP 85 l., SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21d | IV | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21f | IV | 0,07 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21g | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,8 | 2 | 442 | 750 | 10,8 | 18,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | WZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | OS | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 750 | 10,8 | 18,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21h | IV | 1,96 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 80 | 26 | 20 | | | | | 3 | | 100 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 80 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 16 | 15 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 125 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 21i | I | 3,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 85 | 27 | 23 | III | 24,55 | 1,00 | 0,9 | 3 | 352 | 1 310 | 8,5 | 31,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 85 | 35 | 27 | I | 28,29 | | KĘP | 3 | 41 | 155 | 0,4 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | WZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | OS | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OL | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 1 465 | 8,9 | 33,2 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21j | I | 0,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 85 | 34 | 24 | III | 25,46 | 1,03 | 0,9 | 3 | 446 | 75 | 10,2 | 1,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 75 | 10,2 | 1,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | | |
| 21k | I | 1,27 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | | CW | 0,84 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 5 | | | | | | WKĘP | | | | | | | CP | 0,43 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 2 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | AK | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 120 | 49 | 29 | | | | | 3 | | 20 | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | DB.S | | 120 | 58 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | | |
| | | | | | WZ | | 80 | 38 | 25 | | | | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | CZR.P | | 60 | 29 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | Razem: | | | | | | | | | | | 34 | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 119 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21l | I | 1,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 4 | | 1 | II | 26,75 | 1,00 | 0,8 | 11 | | | | | | CP | 1,69 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 1 | 5 | | | | | | WKĘP | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PRZES | OL | | 85 | 29 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | WZ | | 60 | 25 | 21 | | | | | 4 | | 3 | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | SO | | 85 | 35 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: OL 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21m | I | 2,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 81 | 31 | 27 | I | 29,76 | 0,99 | 0,8 | 3 | 446 | 1 330 | 10,4 | 30,8 | IIIA (30%) | 2,98 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | BRZ | MJS | 81 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,90 |
| | | | ZG | | DB.S | MJS | 81 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,90 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 330 | 10,4 | 30,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21n | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 31 | 25 | I | 27,95 | 0,96 | 0,9 | 3 | 272 | 300 | 6,8 | 7,5 | AGROT | 0,21 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 55 | 24 | 22 | IA | 30,32 | | WKĘP | 4 | 113 | 125 | 3,5 | 3,8 | ODN-LUK | 0,21 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 385 | 425 | 10,3 | 11,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,21 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21o | I | 0,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 55 | 23 | 23 | IA | 31,35 | 0,63 | 0,9 | 22 | 143 | 55 | 5,2 | 2,0 | AGROT | 0,17 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 80 | 28 | 25 | I | 27,95 | | WKĘP | | 110 | 45 | 2,9 | 1,1 | ODN-LUK | 0,17 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 253 | 100 | 8,1 | 3,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N luka o pow. 0,17 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21p | I | 0,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 50 | 22 | 21 | II | 27,63 | 1,01 | 1,0 | 12 | 284 | 115 | 9,6 | 3,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | OS | 2 | 50 | 25 | 23 | I | 31,01 | | KĘP | | 66 | 25 | 2,5 | 1,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 140 | 12,0 | 4,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 21r | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 55 | 24 | 22 | II | 27,55 | 1,02 | 1,0 | 4 | 353 | 280 | 10,8 | 8,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 80 | 31 | 24 | III | 25,99 | | GRP | 3 | 39 | 30 | 1,1 | 0,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 310 | 11,9 | 9,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21s | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21t | III | 0,34 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21w | IV | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21x | III | 0,38 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21~a | III | 0,51 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21~b | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,78** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 345** | | | | |
| | **I** | **16,27** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **1,29** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 120** | | | | |
| | **IV** | **2,22** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **100** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 220** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **125** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22a | I | 3,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 56 | 26 | 23 | IA | 31,08 | 0,97 | 0,9 | 22 | 309 | 1 035 | 9,4 | 31,6 | TP | 3,35 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 80 | 33 | 23 | II | 24,38 | | KĘP | | 28 | 95 | 0,5 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 95 | 30 | 26 | I | 26,66 | | | | 33 | 110 | 0,9 | 3,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | TP | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | WB | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | 370 | 1 240 | 10,8 | 36,1 | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, przytulia | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 22 l., BRZ 22 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 32 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22b | II | 2,97 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 95 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 55 | | | ODN-ZRB | 2,97 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | PIEL | 2,97 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 22c | I | 12,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 27 | 24 | IA | 30,33 | 1,01 | 0,9 | 22 | 414 | 5 330 | 11,6 | 149,4 | TP | 12,87 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | OS | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 5 330 | 11,6 | 149,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 10 | 16 | | 4 | I | 32,86 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: OL 32 l., BRZ 32 l., w części S kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 32 l., OL 32 l., w części C kępa o pow. 0,33 ha: BRZ 42 l., w części SE bagno o pow. 0,06 ha | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22d | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 26 | I | 28,94 | 0,94 | 0,9 | 3 | 408 | 410 | 9,8 | 9,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 410 | 9,8 | 9,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 22f | I | 0,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 65 | 23 | 23 | II | 26,91 | 0,82 | 0,9 | 4 | 207 | 115 | 5,8 | 3,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 4 | 80 | 30 | 26 | II | 27,74 | | KĘP | 3 | 164 | 90 | 3,9 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 205 | 9,7 | 5,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słaboglinisty //pył ilasty ///piasek luźny //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, chmiel zwyczajny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22g | I | 0,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 7 | 58 | 26 | 24 | I | 29,20 | 0,86 | 0,9 | 4 | 221 | 135 | 4,5 | 2,7 | TP | 0,60 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | 3 | 58 | 19 | 17 | II | 27,30 | | GRP | 4 | 66 | 40 | 3,9 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 287 | 175 | 8,4 | 5,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 150 | 45 | 22 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 22h | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 75 | 29 | 26 | I | 29,83 | 0,87 | 0,9 | 3 | 272 | 245 | 6,8 | 6,1 | TP | 0,90 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 90 | 34 | 25 | I | 26,37 | | KĘP | 3 | 102 | 90 | 2,5 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 374 | 335 | 9,3 | 8,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22~a | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 780** | | | | |
| | **I** | **19,29** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **2,97** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 695** | | | | |
| | **III** | **0,14** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **30** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **55** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 780** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **1,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **540** | | | | |
| | **I** | **1,50** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **510** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **30** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **20,9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 240** | | | | |
| | **I** | **17,79** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **2,97** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 185** | | | | |
| | **III** | **0,14** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **55** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 240** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23a | I | 6,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 65 | 32 | 27 | IA | 32,87 | 1,06 | 0,9 | 11 | 338 | 2 240 | 8,8 | 58,5 | TP | 6,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 65 | 32 | 26 | I | 29,92 | | WKĘP | | 87 | 575 | 1,4 | 9,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 75 | 33 | 28 | IA | 31,81 | | | | 44 | 290 | 1,2 | 7,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 469 | 3 105 | 11,4 | 75,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODR | BK | 5 | 25 | | 4 | IV | 20,88 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | 5 | 25 | | 4 | III | 23,83 | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23b | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 34 | 28 | IA | 31,81 | 1,15 | 0,9 | 2 | 544 | 505 | 12,5 | 11,6 | TP | 0,93 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 505 | 12,5 | 11,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 23c | I | 1,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 41 | 25 | 23 | I | 30,64 | 1,01 | 0,9 | 12 | 252 | 265 | 8,8 | 9,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 50 | 26 | 22 | I | 29,02 | | DKĘP | | 77 | 80 | 2,5 | 2,6 | | |
| | | | | | OL | 1 | 32 | 16 | 17 | II | 28,71 | | | | 22 | 25 | 1,2 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL.S | MJS | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 351 | 370 | 12,5 | 13,2 | | |
| | | | POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23d | IV | 0,36 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | BRZ | | 65 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | DB | | 65 | 25 | 19 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 12 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23f | I | 0,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 35 | 27 | I | 29,12 | 1,13 | 0,9 | 3 | 505 | 295 | 11,0 | 6,4 | TP | 0,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 505 | 295 | 11,0 | 6,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 23g | I | 2,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 18 | 7 | 7 | I | 28,31 | 1,00 | 1,0 | 11 | 55 | 120 | 6,4 | 14,1 | TW | 2,22 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 18 | | 7 | I | 29,89 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 18 | 9 | 9 | I | 29,51 | | | | 10 | 20 | 1,0 | 2,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | 1 | 18 | | 6 | I | 38,28 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 65 | 140 | 7,3 | 16,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 110 | 31 | 23 | | | | | 3 | | 46 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 110 | 40 | 25 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23h | I | 5,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 30 | 25 | IA | 30,87 | 1,05 | 0,9 | 22 | 392 | 1 975 | 10,8 | 54,4 | TP | 5,04 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 1 | 65 | 30 | 25 | I | 28,90 | | DKĘP | | 44 | 220 | 0,7 | 3,4 | | |
| | | | TD: ZG | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 2 195 | 11,5 | 57,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | DB.S | 5 | 15 | | 5 | II | 28,93 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | 5 | 15 | | 7 | I | 50,11 | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23i | IV | 0,32 | Rodzaj powierzchni: Ł | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 23j | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 23 | 10 | 10 | I | 29,72 | 1,02 | 1,0 | 11 | 119 | 140 | 11,9 | 13,9 | TW | 1,17 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 140 | 11,9 | 13,9 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 110 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: BK 40 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23k | I | 2,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,51 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 7 | | 2 | I | 31,35 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 109 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 109 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23~a | III | 0,65 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23~b | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **21,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 892** | | | | |
| | **I** | **20,13** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,69** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 750** | | | | |
| | **IV** | **0,68** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **130** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 880** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **12** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24a | I | 3,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 33 | 28 | IA | 33,86 | 1,05 | 0,9 | 12 | 447 | 1 580 | 11,5 | 40,8 | TP | 3,54 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 1 | 65 | 35 | 30 | I | 35,31 | | DKĘP | | 55 | 195 | 1,2 | 4,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WZ | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 502 | 1 775 | 12,7 | 45,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24b | I | 1,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 25 | 23 | I | 28,86 | 1,07 | 0,9 | 11 | 414 | 820 | 11,6 | 22,9 | TP | 1,98 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 820 | 11,6 | 22,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24c | I | 2,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,45 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 7 | | 4 | I | 38,01 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 100 | 29 | 24 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | 100 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 51 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: SO 100 l., BRZ 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 24d | I | 2,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 2,08 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 4 | | | | | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 100 | 35 | 24 | | | | | 3 | | 40 | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | 55 | 20 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 41 | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24f | I | 2,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 26 | I | 28,94 | 1,20 | 0,9 | 2 | 521 | 1 150 | 11,8 | 26,0 | TP | 2,21 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 521 | 1 150 | 11,8 | 26,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24g | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 22 | 21 | I | 27,99 | 1,13 | 0,9 | 11 | 397 | 350 | 12,0 | 10,6 | TP | 0,88 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 350 | 12,0 | 10,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 24h | I | 1,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 29 | 14 | 13 | IA | 30,24 | 1,12 | 1,0 | 11 | 162 | 305 | 10,6 | 20,0 | TW | 1,89 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 29 | 15 | 14 | I | 28,24 | | DKĘP | | 32 | 60 | 2,1 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 194 | 365 | 12,7 | 24,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 125 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24i | II | 0,74 | Rodzaj powierzchni: HAL | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | AGROT | 0,74 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | ODN-HAL | 0,74 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | PIEL | 0,74 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24j | IV | 0,44 | Rodzaj powierzchni: Ł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24k | I | 1,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 81 | 33 | 28 | IA | 30,75 | 1,30 | 0,9 | 2 | 434 | 485 | 9,0 | 10,1 | IIIA (40%) | 1,12 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | SO | 3 | 130 | 44 | 28 | II | 24,81 | | WKĘP | 2 | 153 | 170 | 2,5 | 2,8 | AGROT | 0,45 |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 81 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,45 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 587 | 655 | 11,5 | 12,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 24l | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 90 | 33 | 27 | I | 28,36 | 1,26 | 0,9 | 3 | 387 | 385 | 8,0 | 7,9 | IB (100%) | 0,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 115 | 39 | 28 | I | 26,27 | | KĘP | 3 | 164 | 160 | 2,8 | 2,8 | AGROT | 0,99 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 0,99 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 551 | 545 | 10,8 | 10,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24m | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 33 | 29 | IA | 32,80 | 1,15 | 0,9 | 2 | 465 | 1 060 | 10,2 | 23,2 | TP | 2,28 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 58 | 24 | 23 | IA | 30,55 | | WKĘP | 4 | 79 | 180 | 2,6 | 6,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 1 240 | 12,8 | 29,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24n | I | 3,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 17 | 7 | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | 45 | 155 | 6,6 | 22,5 | TW | 3,43 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 17 | | 5 | I | 35,88 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 45 | 155 | 6,6 | 22,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 115 | 30 | 23 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 80 | 24 | 16 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 42 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 24o | I | 3,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 26 | I | 29,83 | 1,06 | 0,9 | 2 | 465 | 1 735 | 11,2 | 41,9 | TP | 3,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 1 735 | 11,2 | 41,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24~a | III | 0,21 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24~b | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 944** | | | | |
| | **I** | **26,58** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,74** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 790** | | | | |
| | **III** | **0,37** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **154** | | | | |
| | **IV** | **0,44** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 944** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 95 | 30 | 25 | II | 25,66 | 1,04 | 0,9 | 3 | 381 | 475 | 8,1 | 10,2 | IB (95%) | 1,25 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 125 | 37 | 26 | II | 23,24 | | KĘP | 3 | 34 | 45 | 0,7 | 0,9 | AGROT | 1,25 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,25 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 415 | 520 | 8,9 | 11,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 25b | I | 2,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 24 | 23 | I | 28,86 | 1,01 | 0,9 | 12 | 392 | 1 055 | 11,1 | 29,9 | TP | 2,69 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 055 | 11,1 | 29,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25c | I | 12,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 30 | 25 | IA | 30,87 | 1,02 | 0,9 | 32 | 436 | 5 320 | 11,7 | 143,2 | TP | 12,20 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 5 320 | 11,7 | 143,2 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | PODR | BK | 10 | 19 | | 4 | II | 27,69 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C luka o pow. 0,15 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25d | I | 1,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 31 | 16 | 18 | I | 29,65 | 0,87 | 0,9 | 12 | 153 | 255 | 8,3 | 13,9 | TW | 1,67 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 49 | 25 | 23 | I | 29,22 | | KĘP | | 65 | 110 | 2,4 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 55 | 31 | 24 | I | 29,03 | | | | 38 | 65 | 1,2 | 2,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 256 | 430 | 11,8 | 19,8 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 25f | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 50 | 23 | 22 | IA | 31,80 | 1,02 | 0,9 | 13 | 328 | 305 | 11,4 | 10,6 | TP | 0,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 1 | 31 | 15 | 15 | I | 28,38 | | KĘP | | 22 | 20 | 1,0 | 0,9 | | |
| | | | TD: ZG | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 325 | 12,4 | 11,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25g | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 32 | 26 | I | 29,83 | 0,98 | 0,9 | 3 | 431 | 330 | 10,6 | 8,2 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 330 | 10,6 | 8,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25h | I | 3,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 12 | | 4 | I | 27,17 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 3,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.B | 2 | 12 | | 3 | II | 26,99 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | 1 | 12 | | 2 | II | 27,76 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 110 | 36 | 24 | | | | | 3 | | 45 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 45 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 25i | I | 3,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 3,20 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 4 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | PJD | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 109 | 37 | 25 | | | | | 3 | | 40 | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 109 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25j | I | 2,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 10 | 14 | | 5 | I | 30,01 | 0,30 | 0,9 | 12 | | | | | AGROT | 1,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,99 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 100 | 34 | 27 | | | | | 3 | | 55 | | | CP | 0,71 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. (0,01 ha ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 25k | I | 8,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 110 | 38 | 25 | II | 23,80 | 1,04 | 0,8 | 3 | 394 | 3 255 | 7,9 | 65,4 | IB (95%)/1 | 2,70 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 125 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 2,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 2,70 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 394 | 3 255 | 7,9 | 65,4 | IB (95%)/2 | 3,17 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | AGROT/2 | 3,17 |
| | | | ///piasek gliniasty //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 3,17 |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 43 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,31 ha: SO 43 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. (0,01 ha ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25l | I | 2,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 1,02 | 0,9 | 3 | 465 | 1 010 | 11,2 | 24,2 | TP | 2,17 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 1 010 | 11,2 | 24,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 25m | I | 4,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 85 | 28 | 26 | I | 28,12 | 1,08 | 0,9 | 3 | 376 | 1 805 | 8,3 | 39,9 | IB (95%)/1 | 0,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 100 | 33 | 26 | II | 26,00 | | WKĘP | 3 | 82 | 395 | 1,8 | 8,7 | AGROT/1 | 0,81 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 0,81 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | TP/2 | 3,99 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 2 200 | 10,1 | 48,7 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25n | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,9 | 3 | 442 | 375 | 10,8 | 9,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 375 | 10,8 | 9,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25o | I | 1,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 110 | 41 | 27 | II | 25,81 | 0,72 | 0,3 | 3 | 301 | 385 | 6,4 | 8,1 | IIIAU (90%) | 1,28 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,87 |
| | | | ZG | | OS | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,87 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | CP | 0,41 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 301 | 385 | 6,4 | 8,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | DB.S | 9 | 13 | | 3 | II | 25,77 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | LP | 1 | 13 | | 3 | V | 15,44 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | SO | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,41 ha: DB.S 13 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25p | IV | 0,05 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25~a | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **46,43** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **15 345** | | | | |
| | **I** | **45,84** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,54** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **15 205** | | | | |
| | **IV** | **0,05** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | **140** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **15 345** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26a | IV | 0,38 | Rodzaj powierzchni: R | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 26b | I | 2,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 27 | 23 | IA | 30,55 | 0,99 | 0,9 | 22 | 386 | 1 045 | 11,7 | 31,8 | TP | 2,71 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 51 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 1 045 | 11,7 | 31,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODR | BK | 10 | 16 | | 1 | V | 12,43 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W dolesiona luka o pow. 0,05 ha: BRZ 5 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26c | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 39 | 16 | 17 | IA | 30,32 | 1,07 | 0,9 | 13 | 284 | 230 | 12,9 | 10,5 | TW | 0,81 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 39 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 230 | 12,9 | 10,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 26d | I | 1,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 44 | 20 | 19 | IA | 30,63 | 1,06 | 0,9 | 13 | 328 | 525 | 12,9 | 20,6 | TP | 1,60 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 51 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | Razem: | | 328 | 525 | 12,9 | 20,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | SO | | 115 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 100 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | Razem: | | | 100 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,34 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26f | I | 1,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 59 | 26 | 23 | IA | 30,29 | 1,01 | 0,9 | 23 | 320 | 530 | 9,4 | 15,7 | TP | 1,66 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 75 | 35 | 27 | IA | 30,82 | | WKĘP | | 88 | 145 | 2,2 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 675 | 11,7 | 19,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26g | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 28 | 25 | I | 28,84 | 0,95 | 0,9 | 3 | 363 | 350 | 9,1 | 8,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | | WKĘP | 4 | 34 | 35 | 1,2 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 385 | 10,3 | 9,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 26h | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 34 | 16 | 16 | IA | 31,41 | 1,00 | 0,9 | 13 | 196 | 150 | 10,2 | 7,8 | TW | 0,77 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | 1 | 34 | 14 | 13 | I | 32,59 | | KĘP | | 16 | 10 | 1,3 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 34 | 14 | 13 | II | 28,01 | | | | 11 | 10 | 0,9 | 0,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 223 | 170 | 12,4 | 9,6 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | OL | | 65 | 22 | 19 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26i | I | 14,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 1,04 | 0,9 | 3 | 476 | 6 700 | 11,3 | 159,5 | TP | 14,08 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 6 700 | 11,3 | 159,5 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,16 ha: ŚW 60 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 26j | I | 0,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 19 | 14 | 14 | I | 31,27 | 1,00 | 1,0 | 11 | 140 | 95 | 13,9 | 9,5 | TW | 0,68 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BK | MJS | 19 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///torf niski ////gytia organiczna //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 140 | 95 | 13,9 | 9,5 | | |
| | | | | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | JS | | 95 | 43 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | 60 | 26 | 20 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 3 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26k | IV | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26l | IV | 0,03 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26~a | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 933** | | | | |
| | **I** | **23,27** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,44** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 825** | | | | |
| | **IV** | **0,45** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **108** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 933** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27a | I | 0,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 16 | 16 | IA | 30,93 | 0,94 | 0,9 | 13 | 229 | 80 | 12,0 | 4,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 80 | 12,0 | 4,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27b | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 61 | 24 | 23 | I | 29,79 | 0,87 | 0,9 | 22 | 338 | 245 | 10,4 | 7,6 | TP | 0,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 338 | 245 | 10,4 | 7,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27c | IV | 0,38 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | OS | | 20 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | SAMOS | SO | | 8 | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | 8 | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27d | I | 19,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 26 | 24 | I | 29,87 | 0,99 | 0,9 | 22 | 403 | 7 915 | 11,2 | 220,3 | TP | 19,64 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB.B | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 7 915 | 11,2 | 220,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27f | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 50 | 22 | 19 | I | 28,62 | 0,84 | 0,8 | 22 | 263 | 230 | 10,2 | 8,8 | TP | 0,87 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 263 | 230 | 10,2 | 8,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 27g | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 140 | 43 | 23 | III | 18,87 | 0,65 | 0,7 | 4 | 172 | 185 | 3,3 | 3,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 50 | 20 | 20 | I | 29,69 | | WKĘP | 4 | 30 | 30 | 1,7 | 1,9 | | |
| | | | CZ ZG | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 202 | 215 | 5,0 | 5,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,2 ha: ORZ.C 10 l., CZM 10 l., OL 10 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BRZ 10 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27h | I | 3,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 32 | 25 | I | 26,37 | 1,07 | 0,9 | 3 | 434 | 1 710 | 9,7 | 38,0 | IB (90%)/1 | 2,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 2,95 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 2,95 |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.C | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 1 710 | 9,7 | 38,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 27i | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 32 | 24 | II | 25,37 | 0,88 | 0,9 | 3 | 341 | 345 | 8,2 | 8,3 | IB (90%) | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,01 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 341 | 345 | 8,2 | 8,3 | ODN-ZRB | 1,01 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27j | I | 3,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 82 | 33 | 27 | I | 29,60 | 1,02 | 0,9 | 3 | 458 | 1 645 | 10,5 | 37,6 | IIIA (40%) | 3,59 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 82 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,44 |
| | | | CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 1 645 | 10,5 | 37,6 | ODN-ZŁOŻ | 1,44 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27k | IV | 0,25 | Rodzaj powierzchni: R | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 27l | I | 1,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 60 | 28 | 23 | IA | 30,04 | 0,87 | 0,9 | 23 | 276 | 330 | 8,4 | 10,1 | TP | 1,20 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 100 | 34 | 22 | III | 22,00 | | KĘP | | 44 | 55 | 0,6 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | WZ | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 385 | 8,9 | 10,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27m | IV | 0,22 | Rodzaj powierzchni: ZADRZEW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27n | IV | 0,00 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27o | IV | 0,25 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27~a | III | 0,47 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27~b | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **34,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 771** | | | | |
| | **I** | **32,42** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,63** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 770** | | | | |
| | **IV** | **1,10** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 770** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **1** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28a | I | 2,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 87 | 29 | 26 | I | 27,81 | 1,19 | 0,8 | 3 | 423 | 1 095 | 9,9 | 25,6 | IIIB (40%) | 2,59 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: | | AK | 1 | 40 | 15 | 15 | III | 20,59 | | KĘP | 4 | 23 | 60 | 0,8 | 2,1 | AGROT | 1,04 |
| | | | ZG | | AK | MJS | 87 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,04 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //// POROL | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 155 | 10,7 | 27,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | SO | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28b | I | 2,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 87 | 27 | 25 | I | 26,82 | 1,04 | 0,9 | 3 | 423 | 1 220 | 9,7 | 28,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 87 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 87 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 1 220 | 9,7 | 28,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 28c | I | 3,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 3,75 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB | 2 | 4 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | JW | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 100 | 38 | 27 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28d | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 8 | | 2 | II | 24,80 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,21 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 2 | II | 29,18 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | PODSZ | AK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 104 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28f | I | 1,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 60 | 27 | 24 | IA | 31,05 | 1,14 | 0,9 | 12 | 265 | 420 | 7,8 | 12,5 | TP | 1,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 85 | 29 | 26 | I | 28,12 | | WKĘP | | 155 | 245 | 3,3 | 5,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | 1 | 53 | 20 | 20 | II | 24,15 | | | | 28 | 45 | 0,8 | 1,3 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OS | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 448 | 710 | 11,9 | 18,9 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28g | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 30 | 27 | I | 29,12 | 0,95 | 0,9 | 3 | 423 | 825 | 9,7 | 18,9 | IIIB (40%) | 1,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | AGROT | 0,78 |
| | | | CZ ZG | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 825 | 9,7 | 18,9 | | |
| | | | POROL | PODSZ | SO | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28h | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 38 | 17 | 17 | IA | 30,75 | 1,07 | 0,9 | 12 | 284 | 365 | 13,1 | 16,9 | TW | 1,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 38 | | | | | | --- | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 365 | 13,1 | 16,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | AK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 28i | I | 2,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 34 | 15 | 15 | IA | 30,18 | 1,08 | 0,9 | 12 | 218 | 540 | 11,7 | 29,0 | TW | 2,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 34 | 14 | 15 | I | 26,85 | | DKĘP | | 16 | 40 | 1,0 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 234 | 580 | 12,6 | 31,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | DB.S | | 110 | 37 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | WZ | | 140 | 42 | 22 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | 110 | 40 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 9 | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28j | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 29 | 23 | II | 25,13 | 0,88 | 0,8 | 3 | 329 | 360 | 8,3 | 9,1 | IB (95%) | 1,09 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,09 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,09 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 360 | 8,3 | 9,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28k | I | 4,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 60 | 25 | 24 | IA | 31,05 | 0,98 | 0,9 | 32 | 364 | 1 545 | 10,5 | 44,6 | TP | 4,24 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 115 | 34 | 22 | III | 20,24 | | KĘP | | 28 | 120 | 0,7 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 665 | 11,2 | 47,5 | | |
| | | | POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,36 ha: BRZ 25 l., CZM 25 l., WB 40 l., AK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 l., SO 40 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 15 l., SO 15 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 28l | I | 0,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 60 | 26 | 22 | I | 29,02 | 0,78 | 0,9 | 13 | 199 | 80 | 6,6 | 2,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 3 | 40 | 18 | 17 | I | 29,91 | | KĘP | | 66 | 25 | 3,0 | 1,3 | | |
| | | | CZ ZG | | DB | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 265 | 105 | 9,6 | 4,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28m | IV | 0,88 | Rodzaj powierzchni: ZADRZEW | ZADRZEW | SO | | 85 | 35 | 26 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 40 | 20 | 14 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | WB | | 40 | 29 | 13 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | JS | | 40 | 22 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | OS | | 40 | 20 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 17 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28n | IV | 0,16 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZAKRZEW | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| 28o | IV | 0,24 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28p | I | 1,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 27 | 25 | I | 27,13 | 1,00 | 0,9 | 3 | 411 | 500 | 9,6 | 11,7 | TP | 1,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 500 | 9,6 | 11,7 | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | CZĘŚĆ | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E bagno o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28r | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 17 | | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 0,54 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 17 | | 9 | I | 30,72 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28s | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 17 | | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 1,29 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 17 | | 9 | I | 30,72 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 110 | 29 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | | 80 | 27 | 12 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 16 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: DB.B 80 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28t | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 0,79 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28w | I | 6,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 38 | 14 | 14 | I | 27,13 | 1,23 | 1,0 | 11 | 251 | 1 645 | 13,0 | 85,1 | TP | 6,55 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 1 645 | 13,0 | 85,1 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | OL | | 100 | 45 | 24 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | 100 | 32 | 24 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | 100 | 38 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | WZ | | 100 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 100 l., OL 100 l., BRZ 100 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 32 | | | | |
| 28x | I | 2,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 26 | 11 | 11 | I | 29,21 | 1,00 | 1,0 | 11 | 119 | 300 | 10,5 | 26,4 | TW | 2,51 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 26 | 10 | 12 | I | 27,40 | | DKĘP | | 16 | 40 | 0,9 | 2,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 340 | 11,4 | 28,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 140 | 34 | 21 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.B | | 90 | 28 | 14 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 26 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 28y | I | 0,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 8 | 8 | I | 27,73 | 1,07 | 1,0 | 11 | 65 | 60 | 9,0 | 8,4 | TW | 0,94 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 21 | 9 | 10 | I | 28,24 | | DKĘP | | 22 | 20 | 2,0 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 87 | 80 | 10,9 | 10,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28~b | III | 0,21 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **39,04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 730** | | | | |
| | **I** | **37,32** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,44** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 550** | | | | |
| | **IV** | **1,28** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **163** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 713** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **17** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,73** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 233** | | | | |
| | **I** | **30,29** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,44** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 070** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **163** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 233** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **8,31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 497** | | | | |
| | **I** | **7,03** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **IV** | **1,28** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 480** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 480** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **17** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29a | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 80 | 31 | 23 | III | 25,11 | 1,18 | 0,9 | 3 | 385 | 420 | 9,0 | 9,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 52 | 24 | 21 | IA | 30,14 | | KĘP | 4 | 79 | 85 | 2,7 | 2,9 | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, zagłębienie | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 464 | 505 | 11,7 | 12,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29b | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 26 | 12 | 12 | IA | 30,70 | 1,15 | 1,0 | 11 | 162 | 250 | 12,2 | 18,7 | TW | 1,53 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 26 | 11 | 13 | I | 28,83 | | DKĘP | | 16 | 25 | 1,1 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 178 | 275 | 13,3 | 20,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PRZES | SO | | 120 | 30 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 29c | I | 0,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 31 | 24 | I | 27,84 | 0,97 | 0,8 | 4 | 306 | 175 | 8,1 | 4,7 | TP | 0,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 60 | 22 | 20 | I | 26,95 | | KĘP | 4 | 68 | 40 | 2,1 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 374 | 215 | 10,1 | 5,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29d | I | 2,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 27 | 24 | IA | 31,56 | 1,00 | 0,9 | 22 | 408 | 1 085 | 12,1 | 32,2 | TP | 2,66 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 1 085 | 12,1 | 32,2 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODR | DB.S | 5 | 18 | | 5 | II | 26,13 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BK | 5 | 18 | | 4 | II | 29,24 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l., DB.S 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29f | IV | 0,76 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 58 | 20 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 58 | 22 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 35 | 13 | 13 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 23 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 29g | I | 3,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 28 | 24 | IA | 31,56 | 0,97 | 0,9 | 22 | 397 | 1 435 | 11,8 | 42,9 | TP | 3,62 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 1 435 | 11,8 | 42,9 | | |
| | | | POROL | PODR | BK | 10 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, bniec czerwony, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29h | I | 1,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 30 | 25 | I | 27,95 | 0,92 | 0,8 | 3 | 272 | 530 | 6,6 | 12,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 66 | 24 | 23 | I | 28,64 | | KĘP | 4 | 102 | 200 | 3,1 | 6,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z | | | | | | | | | | Razem: | | 374 | 730 | 9,7 | 18,8 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 29i | I | 1,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 70 | 22 | 20 | III | 23,77 | 0,87 | 0,9 | 4 | 164 | 240 | 4,8 | 7,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | OL | 3 | 90 | 29 | 22 | IV | 23,07 | | KĘP | 3 | 82 | 120 | 2,3 | 3,3 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 90 | 27 | 24 | II | 24,81 | | | 3 | 27 | 40 | 0,4 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, zagłębienie | | AK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 400 | 7,4 | 10,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29j | I | 0,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 26 | 22 | III | 25,46 | 0,61 | 0,9 | 4 | 229 | 70 | 6,9 | 2,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | OL | MJS | 40 | | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 70 | 6,9 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 29k | I | 7,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 26 | I | 28,94 | 0,94 | 0,9 | 3 | 408 | 2 875 | 9,8 | 69,3 | TP | 7,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB.B | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 2 875 | 9,8 | 69,3 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29l | IV | 0,54 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | SO | | 80 | 42 | 26 | | | | | 3 | | 80 | | | | |
| | | | | | OL | | 90 | 26 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 85 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | CZM | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29m | I | 1,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 24 | 22 | I | 28,07 | 1,00 | 0,9 | 12 | 371 | 735 | 10,9 | 21,5 | TP | 1,98 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 735 | 10,9 | 21,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 448** | | | | |
| | **I** | **22,22** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,23** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 325** | | | | |
| | **IV** | **1,30** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 340** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **108** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30a | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 37 | 19 | 18 | IA | 32,35 | 0,91 | 0,9 | 11 | 174 | 315 | 8,5 | 15,5 | TW | 1,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 37 | 18 | 17 | I | 27,91 | | DKĘP | | 33 | 60 | 1,7 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 37 | 19 | 18 | II | 24,87 | | | | 22 | 40 | 0,8 | 1,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | MD | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | ŚW | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 415 | 11,0 | 20,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30b | I | 2,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 64 | 26 | 25 | IA | 31,10 | 0,94 | 0,9 | 12 | 338 | 935 | 8,9 | 24,7 | TP | 2,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 64 | 26 | 25 | I | 28,08 | | KĘP | | 33 | 90 | 0,6 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 55 | 24 | 23 | I | 33,43 | | | | 22 | 60 | 1,5 | 4,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | MD | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 1 085 | 11,0 | 30,6 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30c | I | 9,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 27 | I | 29,93 | 0,88 | 0,9 | 2 | 397 | 3 875 | 9,6 | 93,5 | TP | 9,76 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | SO | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 3 875 | 9,6 | 93,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, orlica pospolita | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 30d | I | 3,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 26 | 25 | IA | 32,06 | 1,06 | 0,9 | 11 | 453 | 1 710 | 12,7 | 47,8 | TP | 3,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | AK | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 1 710 | 12,7 | 47,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 10 | 16 | | 4 | I | 32,86 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 24 l., AK 32 l., SO 32 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30f | I | 2,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 23 | 23 | I | 28,64 | 1,07 | 0,9 | 11 | 414 | 1 055 | 11,5 | 29,3 | TP | 2,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 1 055 | 11,5 | 29,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: AK 35 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30g | I | 1,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 58 | 22 | 20 | I | 27,45 | 1,25 | 0,9 | 11 | 353 | 465 | 10,3 | 13,6 | TP | 1,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 45 | 19 | 18 | I | 29,16 | | KĘP | | 55 | 75 | 2,8 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 540 | 13,1 | 17,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 30h | I | 2,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 80 | 29 | 24 | I | 26,95 | 1,10 | 0,9 | 2 | 340 | 810 | 8,4 | 20,0 | TP | 2,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 115 | 38 | 25 | II | 23,24 | | KĘP | 2 | 91 | 215 | 1,6 | 3,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 025 | 10,0 | 23,8 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30i | I | 3,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 48 | 24 | 19 | I | 29,25 | 0,89 | 0,9 | 21 | 219 | 815 | 8,7 | 32,3 | TP | 3,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 70 | 27 | 25 | I | 29,81 | | KĘP | | 77 | 285 | 2,0 | 7,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 296 | 1 100 | 10,7 | 39,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30j | I | 3,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 65 | 24 | 22 | I | 27,85 | 1,02 | 0,9 | 11 | 207 | 780 | 5,5 | 20,5 | TP | 3,76 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 55 | 20 | 19 | I | 27,18 | | KĘP | | 104 | 390 | 3,3 | 12,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 45 | 18 | 17 | I | 28,04 | | | | 33 | 125 | 2,3 | 8,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 344 | 1 295 | 11,1 | 41,8 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30k | I | 0,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 0,83 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 5 | | 1 | I | 29,67 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 5 | | 1 | I | 42,79 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 105 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | | 105 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 3 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30l | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 45 | 21 | 20 | IA | 31,36 | 1,08 | 0,9 | 11 | 273 | 230 | 10,6 | 9,0 | TP | 0,85 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 38 | 17 | 17 | IA | 30,75 | | KĘP | | 66 | 55 | 2,6 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 285 | 13,3 | 11,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30~a | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30~b | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 30** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **33,98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 388** | | | | |
| | **I** | **33,53** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,45** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 385** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **3** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 388** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31a | I | 0,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 25 | 20 | II | 25,79 | 0,82 | 0,9 | 22 | 218 | 115 | 7,1 | 3,7 | TP | 0,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 65 | 24 | 20 | II | 23,81 | | GRP | | 22 | 10 | 0,5 | 0,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | 1 | 35 | 15 | 15 | III | 25,63 | | | | 11 | 5 | 0,9 | 0,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | SO | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 130 | 8,5 | 4,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S dolesiona luka o pow. 0,11 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31b | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 50 | 24 | 20 | I | 29,69 | 0,79 | 0,9 | 22 | 219 | 175 | 8,0 | 6,3 | TP | 0,79 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 50 | 20 | 20 | I | 26,90 | | DKĘP | | 33 | 25 | 1,3 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 252 | 200 | 9,3 | 7,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 31c | I | 0,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 50 | 22 | 21 | II | 27,63 | 0,99 | 0,9 | 11 | 339 | 45 | 11,8 | 1,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 45 | 11,8 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31d | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 37 | 18 | 18 | IA | 32,35 | 1,00 | 0,9 | 11 | 251 | 455 | 11,8 | 21,3 | TP | 1,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 37 | 16 | 16 | II | 26,73 | | RZĘD | | 22 | 40 | 0,9 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 495 | 12,6 | 22,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 31f | I | 13,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 33 | 29 | IA | 31,91 | 1,09 | 0,9 | 2 | 487 | 6 660 | 10,5 | 143,8 | TP | 13,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | 1 | 80 | 28 | 26 | I | 27,82 | | KĘP | 3 | 34 | 465 | 0,5 | 7,1 | | |
| | | | ZG | | OL | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 521 | 7 125 | 11,0 | 150,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODR | BK | 10 | 27 | | 5 | III | 22,63 | 0,10 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,32 ha: AK 35 l., BRZ 35 l., ŚW 35 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31g | I | 0,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 37 | 19 | 18 | IA | 32,35 | 1,02 | 0,9 | 12 | 196 | 125 | 9,3 | 5,8 | TP | 0,63 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | 2 | 37 | 18 | 17 | I | 27,91 | | DKĘP | | 44 | 30 | 1,9 | 1,2 | | |
| | | | CZ ZG | | SO | 1 | 50 | 25 | 23 | IA | 32,84 | | | | 44 | 30 | 1,3 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 185 | 12,4 | 7,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 31h | I | 2,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 30 | 28 | IA | 33,20 | 0,86 | 0,9 | 22 | 414 | 925 | 10,8 | 24,0 | TP | 2,23 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 925 | 10,8 | 24,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 7 | 24 | | 6 | II | 28,98 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | ŚW | 3 | 24 | | 6 | II | 29,31 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31i | I | 3,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 25 | I | 27,95 | 0,96 | 0,9 | 3 | 397 | 1 530 | 9,8 | 37,6 | TP | 3,85 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 1 530 | 9,8 | 37,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31j | I | 2,33 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 17 | 16 | I | 28,74 | 0,93 | 0,9 | 11 | 229 | 535 | 11,1 | 26,0 | TP | 2,33 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 535 | 11,1 | 26,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 31k | I | 5,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 48 | 22 | 21 | IA | 31,40 | 0,97 | 0,9 | 11 | 339 | 1 815 | 12,2 | 65,4 | TP | 5,36 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 1 815 | 12,2 | 65,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 100 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31l | I | 3,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 38 | 16 | 15 | I | 28,37 | 1,09 | 0,9 | 11 | 218 | 765 | 11,1 | 39,0 | TP | 3,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 45 | 17 | 18 | I | 29,16 | | KĘP | | 33 | 115 | 1,3 | 4,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 880 | 12,4 | 43,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 110 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 135 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 135 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,24 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,27 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31m | I | 7,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 22 | 22 | I | 27,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | 371 | 2 850 | 10,8 | 82,6 | TP | 7,68 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 2 850 | 10,8 | 82,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31n | IV | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | ZAKRZEW | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 31~a | III | 0,43 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31~b | III | 0,43 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **43,41** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **16 870** | | | | |
| | **I** | **42,51** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,86** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **16 715** | | | |
| | **IV** | **0,04** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **155** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **16 870** | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32a | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 65 | 26 | 24 | II | 27,70 | 1,01 | 0,9 | 4 | 414 | 320 | 10,8 | 8,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | OL | 1 | 40 | 19 | 19 | II | 28,14 | | KĘP | 4 | 22 | 15 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 335 | 12,0 | 9,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, turzyca | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 32b | I | 2,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 80 | 36 | 28 | I | 29,50 | 1,29 | 0,9 | 2 | 419 | 960 | 6,2 | 14,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | SO | 2 | 80 | 36 | 29 | IA | 31,91 | | KĘP | 2 | 79 | 180 | 2,6 | 6,1 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 80 | 33 | 26 | I | 27,82 | | | 3 | 40 | 90 | 0,6 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 3 | 65 | 24 | 24 | II | 27,70 | | | 4 | 136 | 310 | 4,4 | 10,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | AK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 674 | 1 540 | 13,7 | 31,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, turzyca, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32c | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 26 | 25 | IA | 32,06 | 0,85 | 0,9 | 11 | 364 | 360 | 10,8 | 10,7 | TP | 0,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 360 | 10,8 | 10,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32d | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 27 | 25 | IA | 30,65 | 0,90 | 0,9 | 11 | 382 | 410 | 10,6 | 11,4 | TP | 1,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 410 | 10,6 | 11,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 32f | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 1,17 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 4 | | | | | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | OL | | 90 | 26 | 24 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | 70 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 70 | 26 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB.S | | 50 | 25 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, turzyca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 50 l., SO 70 l., BRZ 70 l., OL 90 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32g | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 2 | I | 29,73 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 6 | | 2 | I | 33,99 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JW | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KL.P | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KL | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | PRZES | SO | | 100 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 100 l., BRZ 100 l., SO 100 l., | | BRZ | | 100 | 35 | 22 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 100 | 40 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 57 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 32h | I | 1,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 18 | 17 | IA | 32,13 | 0,95 | 0,9 | 11 | 251 | 465 | 12,5 | 23,3 | TW | 1,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | CZM.P | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 465 | 12,5 | 23,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | DB.B | | 90 | 33 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32i | I | 1,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 30 | 28 | IA | 31,81 | 1,12 | 0,9 | 2 | 419 | 530 | 9,8 | 12,3 | TP | 1,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 125 | 39 | 29 | I | 26,30 | | KĘP | 3 | 102 | 130 | 1,6 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 521 | 660 | 11,4 | 14,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32j | I | 1,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 3 | 70 | 28 | 24 | II | 27,10 | 1,25 | 0,9 | 4 | 164 | 290 | 4,1 | 7,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | BRZ | 1 | 70 | 27 | 24 | I | 27,10 | | DKĘP | 4 | 44 | 80 | 0,7 | 1,2 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 70 | 33 | 26 | IA | 30,80 | | | 2 | 44 | 80 | 1,3 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 2 | 110 | 36 | 25 | III | 24,15 | | | 3 | 131 | 230 | 2,1 | 3,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | SO | 1 | 110 | 38 | 25 | II | 23,80 | | | 2 | 44 | 80 | 0,9 | 1,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, zagłębienie | | OL | 1 | 45 | 19 | 20 | II | 27,82 | | | 4 | 33 | 60 | 1,4 | 2,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | CZM.P | 1 | 50 | 20 | 16 | III | 22,60 | | | 4 | 22 | 40 | 0,8 | 1,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 482 | 860 | 11,4 | 20,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, turzyca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32k | IV | 0,30 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 45 | 15 | 18 | | | | | 4 | | 70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 32l | I | 3,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 32 | 29 | IA | 32,80 | 1,19 | 0,9 | 2 | 521 | 1 725 | 11,7 | 38,8 | TP | 3,31 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 125 | 49 | 29 | I | 26,30 | | KĘP | 2 | 57 | 190 | 0,8 | 2,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | CZM.P | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 578 | 1 915 | 12,6 | 41,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32m | I | 4,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 28 | IA | 31,81 | 1,10 | 0,9 | 2 | 521 | 2 245 | 12,1 | 51,9 | TP | 4,31 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 521 | 2 245 | 12,1 | 51,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32n | I | 2,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 17 | 16 | IA | 30,93 | 0,99 | 0,9 | 11 | 240 | 555 | 12,5 | 28,8 | TW | 2,31 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | Razem: | | | | | | | | | | 240 | 555 | 12,5 | 28,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 32o | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 28 | IA | 31,81 | 1,00 | 0,9 | 2 | 476 | 865 | 11,2 | 20,5 | TP | 1,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 865 | 11,2 | 20,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32p | I | 5,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,92 | 0,9 | 2 | 419 | 2 320 | 10,4 | 57,4 | TP | 5,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 2 320 | 10,4 | 57,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32r | IV | 0,29 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | ZAKRZEW | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32~a | III | 0,53 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32~b | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 32** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 699** | | | | |
| | **I** | **30,29** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,73** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 530** | | | | |
| | **IV** | **0,59** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **99** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 629** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **70** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33a | I | 4,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 62 | 28 | 24 | IA | 30,56 | 0,96 | 0,9 | 12 | 327 | 1 330 | 9,0 | 36,8 | TP | 4,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 80 | 33 | 28 | IA | 30,92 | | KĘP | | 76 | 310 | 2,1 | 8,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 1 640 | 11,1 | 45,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33b | I | 2,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 18 | 17 | IA | 32,13 | 0,95 | 0,9 | 11 | 251 | 650 | 12,5 | 32,3 | TW | 2,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 650 | 12,5 | 32,3 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | DB.B | | 115 | 50 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33c | I | 2,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 25 | 22 | I | 29,78 | 0,92 | 0,9 | 11 | 342 | 980 | 11,0 | 31,3 | TP | 2,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 980 | 11,0 | 31,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33d | II | 3,10 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 85 | 39 | 28 | | | | | 3 | | 65 | | | AGROT | 3,10 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 65 | | | ODN-ZRB | 3,10 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | PIEL | 3,10 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: SO 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33f | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 8 | 55 | 25 | 22 | II | 26,06 | 0,76 | 0,9 | 12 | 166 | 130 | 4,7 | 3,7 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ | | ŚW | 1 | 55 | 22 | 20 | II | 30,98 | | KĘP | | 17 | 15 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | ZG | | SO | 1 | 55 | 24 | 24 | IA | 32,37 | | | | 33 | 25 | 1,0 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 216 | 170 | 7,0 | 5,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33g | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 32 | 26 | I | 26,66 | 1,05 | 0,9 | 3 | 438 | 485 | 9,3 | 10,4 | IB (95%) | 1,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,11 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 485 | 9,3 | 10,4 | ODN-ZRB | 1,11 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 33h | I | 1,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 27 | 24 | IA | 30,33 | 1,07 | 0,9 | 11 | 436 | 600 | 12,1 | 16,7 | TP | 1,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 600 | 12,1 | 16,7 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33i | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 22 | 11 | 10 | IA | 30,49 | 1,18 | 1,0 | 11 | 130 | 115 | 10,8 | 9,4 | TW | 0,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 22 | 10 | 10 | I | 31,12 | | KĘP | | 5 | 5 | 1,9 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 120 | 12,7 | 11,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 115 | 40 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | | 115 | 50 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33~a | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 33** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **17,01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 730** | | | | |
| | **I** | **13,64** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **3,10** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 645** | | | | |
| | **III** | **0,27** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **65** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 730** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34a | I | 2,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 3 | 4 | | 1 | I | 33,42 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | 1 | 4 | | 1 | I | 53,01 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 99 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34b | I | 3,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 63 | 33 | 27 | IA | 33,33 | 0,96 | 0,9 | 12 | 360 | 1 350 | 9,6 | 35,9 | TP | 3,75 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | 1 | 63 | 28 | 25 | I | 29,25 | | KĘP | | 33 | 125 | 0,7 | 2,4 | | |
| | | | ZG | | BRZ | 1 | 57 | 23 | 22 | I | 27,35 | | | | 27 | 100 | 0,7 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | OL | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OS | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 420 | 1 575 | 10,9 | 40,9 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODR | BK | 7 | 26 | | 5 | III | 23,53 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | 3 | 26 | | 4 | III | 23,07 | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, trawy, nerecznica | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 34c | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 36 | 30 | IA | 32,90 | 1,10 | 0,9 | 2 | 556 | 595 | 12,0 | 12,8 | TP | 1,07 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 556 | 595 | 12,0 | 12,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 28 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34d | I | 2,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 28 | 14 | 13 | IA | 30,84 | 1,14 | 0,9 | 11 | 184 | 425 | 12,3 | 28,4 | TW | 2,31 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 28 | 13 | 12 | I | 29,81 | | KĘP | | 11 | 25 | 1,0 | 2,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 195 | 450 | 13,3 | 30,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 90 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | 70 | 28 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,2 ha: SO 90 l., BRZ 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34f | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 28 | 11 | 11 | I | 27,97 | 1,04 | 1,0 | 11 | 130 | 120 | 10,4 | 9,7 | TW | 0,93 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 28 | 13 | 12 | II | 26,12 | | KĘP | | 11 | 10 | 0,9 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 130 | 11,4 | 10,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 130 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34g | IV | 0,58 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | BRZ | | 75 | 30 | 26 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 60 | 22 | 22 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | DB | | 60 | 22 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 26 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34h | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 63 | 30 | 26 | IA | 32,33 | 0,88 | 0,9 | 12 | 360 | 655 | 9,9 | 18,0 | TP | 1,82 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | SO | 1 | 75 | 36 | 28 | IA | 31,81 | | KĘP | | 33 | 60 | 1,0 | 1,9 | | |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 715 | 10,9 | 19,9 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 10 | 19 | | 6 | I | 36,36 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34i | I | 1,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,02 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 2 | 6 | | 1 | II | 26,80 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | PJD | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 74 | 35 | 27 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | 74 | 23 | 25 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 37 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 74 l., SO 74 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 34j | I | 4,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 50 | 22 | 21 | IA | 30,75 | 1,01 | 0,9 | 11 | 328 | 1 315 | 11,1 | 44,4 | TP | 4,01 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 70 | 33 | 25 | I | 29,81 | | KĘP | | 33 | 130 | 1,1 | 4,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 361 | 1 445 | 12,2 | 48,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34k | I | 1,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 33 | 27 | I | 28,36 | 1,20 | 0,9 | 3 | 528 | 600 | 11,0 | 12,5 | IB (95%) | 1,14 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,14 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,14 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 528 | 600 | 11,0 | 12,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34l | I | 3,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 14 | | 5 | I | 30,01 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 2,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,26 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 115 | 39 | 27 | | | | | 3 | | 60 | | | CP | 0,74 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34m | I | 2,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 11 | 11 | IA | 31,33 | 1,03 | 0,9 | 11 | 130 | 375 | 11,4 | 33,0 | TW | 2,90 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 13 | 13 | I | 31,20 | | DKĘP | | 11 | 30 | 1,1 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 405 | 12,5 | 36,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 115 | 43 | 27 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34~b | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34~c | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34~d | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34~f | III | 0,00 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 34** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,89** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 173** | | | | | |
| | **I** | **24,81** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 915** | | | | | |
| | **IV** | **0,58** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **232** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 147** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **26** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 552** | | | | | |
| | **I** | **11,17** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,14** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 430** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **122** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 552** | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **14,58** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **3 621** | | | | | |
| | **I** | **13,64** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,36** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 485** | | | | | |
| | **IV** | **0,58** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **110** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **3 595** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **26** | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35a | I | 3,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 35 | 26 | I | 27,36 | 1,03 | 0,9 | 3 | 434 | 1 440 | 9,6 | 31,9 | IB (95%) | 3,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,32 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 3,32 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 1 440 | 9,6 | 31,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 28 l., SO 28 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35b | I | 1,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 47 | 24 | 22 | IA | 32,79 | 1,03 | 0,9 | 11 | 306 | 360 | 10,6 | 12,5 | TP | 1,18 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 47 | 22 | 22 | I | 29,88 | | KĘP | | 33 | 40 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 57 | 28 | 23 | I | 32,88 | | | | 44 | 50 | 1,6 | 1,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 383 | 450 | 13,1 | 15,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 35c | I | 2,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | 1,09 | 0,9 | 2 | 453 | 1 090 | 10,7 | 25,8 | TP | 2,41 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 1 090 | 10,7 | 25,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35d | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 12 | 11 | IA | 31,33 | 1,04 | 1,0 | 11 | 130 | 145 | 11,5 | 12,7 | TW | 1,11 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 13 | 12 | I | 29,69 | | KĘP | | 11 | 10 | 1,0 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 155 | 12,5 | 13,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 115 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35f | I | 11,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 16 | 16 | I | 28,74 | 0,93 | 0,9 | 11 | 229 | 2 565 | 11,1 | 124,9 | TP | 11,21 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 2 565 | 11,1 | 124,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 35g | I | 1,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 1,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 2 | | | | | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 100 | 30 | 27 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | Razem: | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35h | I | 2,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 35 | 25 | I | 27,95 | 0,98 | 0,9 | 2 | 295 | 610 | 6,9 | 14,3 | TP | 2,06 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 55 | 22 | 20 | I | 28,24 | | KĘP | 4 | 91 | 185 | 3,3 | 6,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | Razem: | | | | | | | | | | 386 | 795 | 10,3 | 21,1 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35i | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 26 | 22 | I | 27,85 | 1,06 | 0,9 | 11 | 392 | 475 | 11,2 | 13,6 | TP | 1,21 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | Razem: | | | | | | | | | | 392 | 475 | 11,2 | 13,6 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 23 l., SO 23 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35~a | III | 0,62 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35~b | III | 0,37 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 28 | 7 | 8 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | | 2 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **23,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **III** | **0,99** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Grubizna ogółem:** 7 022
**w tym:**
**I - drzewostany:** 6 970
**I - przestoje:** 50
**razem:** 7 020
**III - zadrzewienia:** 2

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36a | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 10 | 10 | IA | 31,31 | 0,82 | 1,0 | 11 | 76 | 55 | 8,5 | 6,2 | TW | 0,73 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 21 | 13 | 12 | I | 31,53 | | KĘP | | 22 | 15 | 1,9 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 98 | 70 | 10,3 | 7,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36b | I | 0,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 30 | 14 | 14 | IA | 31,01 | 1,17 | 0,9 | 11 | 195 | 185 | 11,2 | 10,7 | TW | 0,95 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 30 | 16 | 15 | I | 28,95 | | KĘP | | 32 | 30 | 2,2 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 227 | 215 | 13,5 | 12,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 135 | 34 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 36c | I | 1,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 31 | 24 | I | 26,13 | 1,26 | 0,9 | 3 | 493 | 665 | 11,1 | 15,0 | IB (95%) | 1,35 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,35 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 665 | 11,1 | 15,0 | ODN-ZRB | 1,35 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36d | I | 2,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 30 | 13 | 12 | I | 28,29 | 1,11 | 1,0 | 11 | 162 | 365 | 11,1 | 24,9 | TW | 2,24 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 30 | 13 | 13 | II | 26,33 | | KĘP | | 11 | 25 | 1,0 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 173 | 390 | 12,1 | 27,1 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 135 | 38 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | 80 | 29 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 135 | 40 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36f | I | 1,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 56 | 26 | 24 | IA | 32,10 | 1,08 | 0,9 | 12 | 243 | 420 | 6,5 | 11,3 | TP | 1,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 1 | 56 | 26 | 24 | I | 33,93 | | KĘP | | 33 | 55 | 1,7 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 56 | 28 | 25 | I | 29,63 | | | | 44 | 75 | 1,4 | 2,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | 3 | 85 | 33 | 26 | I | 28,12 | | | | 143 | 245 | 3,1 | 5,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 463 | 795 | 12,8 | 22,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N luka o pow. 0,11 ha | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Miejsce postoju pojazdów | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 36g | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 1,25 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 4 | | | | | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PRZES | SO | | 99 | 38 | 27 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | OL | | 80 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 42 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36h | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 64 | 24 | 22 | I | 28,07 | 1,10 | 0,9 | 11 | 251 | 255 | 7,0 | 7,1 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 50 | 19 | 19 | I | 28,62 | | KĘP | | 131 | 130 | 4,9 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 385 | 11,9 | 12,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36i | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 10 | 10 | I | 29,72 | 1,11 | 1,0 | 11 | 119 | 100 | 11,4 | 9,7 | TW | 0,85 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 12 | 12 | I | 29,69 | | KĘP | | 11 | 10 | 1,1 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 130 | 110 | 12,4 | 10,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 36j | I | 2,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 85 | 30 | 26 | I | 28,12 | 1,30 | 0,9 | 3 | 446 | 1 215 | 9,5 | 25,9 | IB (95%) | 2,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 130 | 37 | 28 | II | 24,81 | | KĘP | 3 | 106 | 290 | 1,7 | 4,6 | AGROT | 2,72 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,72 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 552 | 1 505 | 11,2 | 30,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: orlica pospolita, śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36k | I | 1,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 28 | 25 | IA | 32,57 | 0,98 | 0,9 | 11 | 419 | 425 | 12,2 | 12,5 | TP | 1,02 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 425 | 12,2 | 12,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36l | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 25 | 23 | I | 28,86 | 1,09 | 0,9 | 11 | 425 | 530 | 11,7 | 14,7 | TP | 1,25 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 530 | 11,7 | 14,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36~a | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36~b | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **15,6** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 157** | | | | | |
| | **I** | **15,10** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 090** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **67** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 157** | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37a | I | 1,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 64 | 30 | 26 | IA | 32,10 | 0,95 | 0,9 | 23 | 349 | 395 | 9,2 | 10,4 | TP | 1,13 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 1 | 64 | 30 | 25 | II | 28,61 | | GRP | | 33 | 35 | 1,2 | 1,4 | | |
| | | | TD: ZG | | MD | 1 | 64 | 31 | 27 | I | 32,96 | | | | 38 | 45 | 1,1 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 420 | 475 | 11,5 | 13,0 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37b | I | 1,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 34 | 18 | 18 | I | 28,86 | 1,04 | 0,9 | 12 | 218 | 320 | 11,7 | 17,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność | | BRZ | 1 | 29 | 15 | 15 | I | 29,56 | | KĘP | | 27 | 40 | 1,0 | 1,5 | | |
| | | | z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 245 | 360 | 12,7 | 18,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski ///piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 37c | I | 8,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 28 | 25 | IA | 31,10 | 0,87 | 0,9 | 32 | 371 | 3 270 | 10,6 | 93,0 | TP | 8,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 3 270 | 10,6 | 93,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 19 | | 6 | I | 36,36 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37d | I | 1,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 43 | 21 | 20 | II | 28,21 | 0,95 | 0,9 | 12 | 295 | 365 | 11,8 | 14,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 365 | 11,8 | 14,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski ///piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,24 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, przytulia, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37f | IV | 0,23 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | OL | | 43 | 16 | 12 | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 4 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 37g | I | 0,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 43 | 21 | 21 | IA | 33,18 | 0,99 | 0,9 | 13 | 131 | 110 | 5,3 | 4,4 | TP | 0,83 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 43 | 18 | 19 | I | 27,90 | | KĘP | | 82 | 70 | 2,6 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 3 | 33 | 16 | 16 | I | 28,57 | | | | 49 | 40 | 2,9 | 2,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 220 | 10,7 | 8,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37h | I | 2,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 54 | 25 | 23 | IA | 31,63 | 0,91 | 0,9 | 22 | 287 | 780 | 9,2 | 24,9 | TP | 2,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 75 | 31 | 26 | I | 29,83 | | WKĘP | | 77 | 210 | 2,0 | 5,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 990 | 11,2 | 30,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37~a | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37~b | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,69** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 684** | | | | |
| | **I** | **16,18** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,28** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 680** | | | | |
| | **IV** | **0,23** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 680** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **4** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38a | I | 2,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 31 | 25 | I | 27,95 | 0,87 | 0,9 | 2 | 249 | 590 | 6,4 | 15,1 | TP | 2,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 115 | 38 | 27 | II | 25,26 | | KĘP | 2 | 113 | 270 | 2,1 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 362 | 860 | 8,5 | 20,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38b | I | 3,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,94 | 0,9 | 2 | 431 | 1 600 | 10,5 | 39,0 | TP | 3,71 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 600 | 10,5 | 39,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 38c | I | 1,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 46 | 22 | 20 | IA | 31,00 | 0,89 | 0,9 | 11 | 295 | 505 | 11,4 | 19,5 | TP | 1,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 505 | 11,4 | 19,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38d | I | 1,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 22 | 21 | I | 27,51 | 1,12 | 0,9 | 11 | 392 | 580 | 11,7 | 17,3 | TP | 1,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 580 | 11,7 | 17,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38f | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 27 | 25 | IA | 30,87 | 1,13 | 0,9 | 11 | 480 | 520 | 12,6 | 13,7 | TP | 1,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 480 | 520 | 12,6 | 13,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38~a | III | 0,17 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 38** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **10,52** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 065** | | | | | |
| | **I** | **10,35** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,17** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 065** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 065** | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39a | I | 3,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | 1,07 | 1,0 | 12 | 152 | 460 | 11,8 | 35,8 | TW | 3,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 25 | 13 | 14 | I | 30,99 | | KĘP | | 16 | 50 | 1,1 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 168 | 510 | 12,9 | 39,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 120 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 80 | 36 | 18 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 11 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39b | I | 7,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 27 | 24 | IA | 30,56 | 1,01 | 0,9 | 22 | 414 | 3 310 | 11,7 | 93,6 | TP | 7,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 3 310 | 11,7 | 93,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 32 l., BRZ 32 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39c | IV | 0,50 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 39d | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 58 | 27 | 24 | IA | 31,56 | 0,99 | 0,9 | 22 | 298 | 540 | 8,4 | 15,2 | TP | 1,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | | WKĘP | | 121 | 220 | 3,3 | 5,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 760 | 11,7 | 21,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODR | BK | 10 | 15 | | 1 | V | 13,40 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39f | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 29 | 26 | I | 29,83 | 0,93 | 0,9 | 3 | 408 | 295 | 10,2 | 7,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 295 | 10,2 | 7,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39g | I | 8,47 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,99 | 0,9 | 2 | 453 | 3 835 | 10,9 | 92,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 3 835 | 10,9 | 92,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,22 ha: ŚW 36 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW luka o pow. 0,09 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 39h | I | 1,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 51 | 21 | 19 | I | 28,32 | 1,10 | 0,9 | 12 | 342 | 500 | 12,2 | 17,9 | TP | 1,46 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 500 | 12,2 | 17,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39i | I | 1,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 18 | 18 | IA | 30,65 | 0,84 | 0,9 | 12 | 241 | 295 | 10,9 | 13,4 | TP | 1,23 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 41 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 241 | 295 | 10,9 | 13,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39j | I | 3,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 20 | 9 | 9 | IA | 30,42 | 1,00 | 1,0 | 12 | 70 | 270 | 8,2 | 31,8 | TW | 3,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.B | 2 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BK | 1 | 20 | 8 | 9 | I | 45,25 | | | | 5 | 20 | 1,0 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | OL.S | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.B | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 75 | 290 | 9,2 | 35,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 120 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, jeżyna | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39k | II | 3,07 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 110 | 36 | 27 | | | | | 3 | | 40 | | | ODN-ZRB | 3,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | PIEL | 3,07 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39l | I | 1,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 18 | 18 | IA | 30,65 | 1,06 | 0,9 | 12 | 306 | 350 | 13,0 | 14,8 | TP | 1,14 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 350 | 13,0 | 14,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. rębu d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39~a | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39~b | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39~c | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **33,51** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 236** | | | | |
| | **I** | **29,72** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **3,07** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 145** | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **51** | | | | |
| | **IV** | **0,50** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 236** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 350** | | | |
| | **I** | **16,17** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **II** | **3,07** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 270** | | | |
| | **III** | **0,16** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **40** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **40** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 350** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **14,11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 886** | | | |
| | **I** | **13,55** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,06** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 875** | | | |
| | **IV** | **0,50** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **11** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 886** | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40a | I | 2,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 11 | 10 | IA | 31,31 | 0,97 | 1,0 | 11 | 97 | 240 | 9,6 | 23,7 | TW | 2,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 21 | 10 | 10 | I | 31,86 | | KĘP | | 11 | 25 | 1,7 | 4,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 108 | 265 | 11,2 | 27,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 115 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,25 ha: SO 112 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 112 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 40b | I | 3,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 7 | | 1 | I | 30,63 | | KĘP | | | | | | CP | 0,95 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | SO | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 114 | 39 | 26 | | | | | 3 | | 80 | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, śmiałek | | MD | | 39 | 23 | 19 | | | | | 4 | | 80 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 115 l., | | SO | | 39 | 20 | 18 | | | | | 4 | | 40 | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,4 ha: MD 40 l., | | ŚW | | 39 | 20 | 19 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,27 ha: ŚW 40 l., SO 40 l., MD 40 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 215 | | | | |
| 40c | IV | 0,09 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40d | I | 0,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 28 | IA | 31,81 | 1,05 | 0,9 | 2 | 499 | 10 | 11,7 | 0,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 499 | 10 | 11,7 | 0,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)<br>Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40f | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | KĘP | | | | | | CP | 0,48 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 115 | 41 | 27 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 115 | 40 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 115 l., SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40g | I | 3,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 3,45 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 2 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | SO | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 115 | 43 | 28 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | 30 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | 30 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 30 l., SO 30 l., SO 115 l., w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 40h | I | 11,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 28 | 26 | IA | 30,80 | 1,01 | 0,9 | 11 | 447 | 5 155 | 11,4 | 131,0 | TP | 11,53 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OS | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | MD | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | | 447 | 5 155 | 11,4 | 131,0 | | |
| | | | Gosp.: Z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 41 l., | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,47 ha: ŚW 41 l., SO 41 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40i | I | 3,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 23 | 21 | I | 29,29 | 1,10 | 0,9 | 11 | 386 | 1 280 | 12,4 | 41,2 | TP | 3,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 386 | 1 280 | 12,4 | 41,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40j | I | 6,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 29 | IA | 32,80 | 1,03 | 0,9 | 2 | 510 | 3 350 | 11,7 | 77,0 | TP | 6,57 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 510 | 3 350 | 11,7 | 77,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 40k | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 20 | 18 | IA | 30,65 | 1,22 | 0,9 | 11 | 350 | 285 | 14,3 | 11,8 | TP | 0,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 285 | 14,3 | 11,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40l | I | 1,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 1,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 4 | | | | | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | KL | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 100 | 30 | 28 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40m | IV | 0,63 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | SAMOS | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40~a | III | 0,81 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40~b | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40~c | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 40** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **36,56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 735** | | | |
| | **I** | **34,60** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **1,24** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 345** | | | |
| | **IV** | **0,72** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **390** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 735** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 195** | | | |
| | **I** | **28,93** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **1,08** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 070** | | | |
| | **IV** | **0,63** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **125** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 195** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **5,92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **540** | | | |
| | **I** | **5,67** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,16** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **275** | | | |
| | **IV** | **0,09** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **265** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **540** | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41a | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | 1,02 | 0,9 | 11 | 397 | 310 | 12,4 | 9,6 | TP | 0,78 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 310 | 12,4 | 9,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 41b | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 27 | I | 29,93 | 1,08 | 0,9 | 2 | 487 | 400 | 11,1 | 9,1 | TP | 0,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 487 | 400 | 11,1 | 9,1 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41c | I | 3,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 28 | 24 | IA | 31,83 | 1,05 | 0,9 | 11 | 430 | 1 500 | 12,7 | 44,2 | TP | 3,49 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 430 | 1 500 | 12,7 | 44,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41d | I | 1,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,84 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 7 | | 4 | I | 38,01 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 94 | 31 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 94 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 41f | I | 2,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 30 | 25 | I | 27,95 | 1,13 | 0,9 | 2 | 431 | 995 | 9,9 | 22,9 | TP | 2,31 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 50 | 24 | 22 | IA | 31,80 | | KĘP | 4 | 34 | 80 | 1,4 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 1 075 | 11,3 | 26,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | JAŁ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 34 l., SO 34 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41g | I | 20,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 30 | 25 | IA | 30,65 | 0,95 | 0,9 | 22 | 403 | 8 410 | 11,0 | 230,3 | TP | 20,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 8 410 | 11,0 | 230,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 8 | 25 | | 4 | IV | 20,88 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | ŚW | 2 | 25 | | 3 | IV | 20,49 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE dolesiona luka o pow. 0,26 ha: SO 9 l., BK 9 l., BRZ 9 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41h | I | 2,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 11 | 10 | I | 29,72 | 1,12 | 1,0 | 11 | 119 | 245 | 11,4 | 23,4 | TW | 2,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 12 | 11 | I | 28,14 | | KĘP | | 11 | 25 | 1,0 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 130 | 270 | 12,5 | 25,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny //// | PRZES | SO | | 115 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.S | | 115 | 70 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41i | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 36 | 19 | 18 | IA | 32,82 | 1,07 | 0,9 | 11 | 305 | 265 | 13,9 | 12,1 | TP | 0,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 265 | 13,9 | 12,1 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41j | IV | 0,17 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41k | I | 0,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 66 | 30 | 26 | IA | 31,65 | 0,92 | 0,9 | 11 | 360 | 95 | 9,9 | 2,6 | TP | 0,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 66 | 26 | 23 | II | 26,71 | | DKĘP | | 33 | 10 | 0,6 | 0,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 105 | 10,5 | 2,7 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41~a | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41~b | III | 0,38 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 41** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | |
| **Ogółem:** | **34,09** | | | | |
| **w tym:** | | | **Grubizna ogółem:** | **12 400** | |
| | **I** | **33,29** | **w tym:** | | |
| | **III** | **0,63** | **I - drzewostany:** | **12 335** | |
| | **IV** | **0,17** | **I - przestoje:** | **65** | |
| | | | **razem:** | **12 400** | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42a | I | 16,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | 0,97 | 0,9 | 22 | 309 | 5 000 | 9,5 | 154,2 | TP | 16,18 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 65 | 29 | 25 | IA | 30,87 | | WKĘP | | 77 | 1 245 | 2,3 | 36,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | SO | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 6 245 | 11,8 | 190,9 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, malina właściwa | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE luka o pow. 0,11 ha | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42b | I | 1,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 32 | 25 | I | 27,95 | 1,01 | 0,9 | 2 | 419 | 480 | 10,1 | 11,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 480 | 10,1 | 11,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 42c | I | 5,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 31 | 24 | I | 29,87 | 0,83 | 0,9 | 22 | 338 | 1 815 | 9,9 | 53,0 | TP | 5,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 338 | 1 815 | 9,9 | 53,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42d | I | 6,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 31 | 26 | I | 28,12 | 1,04 | 0,9 | 3 | 446 | 3 045 | 10,1 | 69,1 | IB (95%)/1 | 3,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 105 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 3,37 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 3,37 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 3 045 | 10,1 | 69,1 | IB (95%)/2 | 3,46 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | AGROT/2 | 3,46 |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 3,46 |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: SO 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,45 ha: SO 57 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42f | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 10 | 65 | 25 | 21 | II | 23,71 | 1,06 | 1,0 | 4 | 262 | 205 | 6,3 | 5,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 205 | 6,3 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | AK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42g | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 18 | 18 | IA | 30,65 | 1,18 | 0,9 | 12 | 339 | 340 | 14,0 | 14,1 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 340 | 14,0 | 14,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42h | I | 1,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 28 | 25 | IA | 30,22 | 1,05 | 0,9 | 12 | 447 | 455 | 11,7 | 11,9 | TP | 1,02 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 455 | 11,7 | 11,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42i | I | 0,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 24 | 23 | IA | 31,35 | 0,99 | 0,9 | 12 | 386 | 235 | 12,1 | 7,4 | TP | 0,61 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 235 | 12,1 | 7,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 42j | I | 5,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 31 | 26 | I | 27,36 | 0,98 | 0,8 | 3 | 376 | 2 220 | 8,3 | 49,2 | IB (90%)/1 | 3,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 90 | 34 | 24 | III | 25,29 | | KĘP | 3 | 35 | 205 | 1,1 | 6,3 | AGROT/1 | 3,65 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 3,65 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | IB (95%)/2 | 2,25 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 2,25 |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 2,25 |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | BK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 2 425 | 9,4 | 55,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42k | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 4 | 60 | 22 | 21 | II | 24,29 | 0,88 | 0,9 | 4 | 110 | 85 | 2,4 | 1,9 | IB (80%) | 0,78 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ | | SO | 1 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | | DKĘP | 4 | 33 | 25 | 1,1 | 0,8 | AGROT | 0,78 |
| | | | ZG | | SO | 3 | 110 | 42 | 27 | II | 25,81 | | | 4 | 94 | 75 | 2,2 | 1,7 | ODN-ZRB | 0,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 90 | 38 | 23 | III | 24,32 | | | 4 | 22 | 15 | 1,0 | 0,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | 1 | 90 | 36 | 23 | III | 24,97 | | | 4 | 22 | 15 | 1,3 | 1,0 | PRZEB.: | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | INTENS | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 281 | 215 | 7,9 | 6,1 | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 42l | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 42 | 19 | 18 | IA | 30,26 | 1,23 | 0,9 | 12 | 241 | 210 | 8,6 | 7,4 | TP | 0,87 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | SO | 3 | 58 | 26 | 23 | IA | 30,55 | | WKĘP | | 120 | 105 | 4,1 | 3,6 | | |
| | | | TD: ZG | | DB.S | 1 | 58 | 19 | 19 | II | 26,31 | | | | 22 | 20 | 1,2 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 383 | 335 | 13,9 | 12,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42~a | III | 0,73 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 42** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **41,37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **15 795** | | | | |
| | **I** | **40,51** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,86** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **15 795** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **15 795** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43a | I | 2,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 18 | 18 | IA | 30,65 | 1,03 | 0,9 | 12 | 295 | 625 | 12,7 | 26,9 | TP | 2,12 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 625 | 12,7 | 26,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PRZES | SO | | 85 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 43b | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 32 | 26 | I | 27,36 | 1,05 | 0,9 | 3 | 446 | 1 015 | 9,7 | 22,2 | IB (95%) | 2,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 105 | | | | | | --- | | | | | | AGROT (95%) | 2,28 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB (95%) | 2,28 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 015 | 9,7 | 22,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43c | I | 6,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 71 | 27 | 25 | I | 29,60 | 0,89 | 0,9 | 3 | 374 | 2 500 | 10,0 | 67,0 | TP | 6,68 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 71 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 374 | 2 500 | 10,0 | 67,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43d | I | 1,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 17 | 17 | I | 29,91 | 0,98 | 0,9 | 12 | 262 | 375 | 12,0 | 17,3 | TP | 1,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 375 | 12,0 | 17,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 43f | I | 2,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 25 | I | 27,95 | 1,01 | 0,8 | 3 | 419 | 1 200 | 10,1 | 29,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 1 200 | 10,1 | 29,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43g | I | 1,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 64 | 23 | 23 | I | 29,09 | 1,03 | 0,9 | 13 | 360 | 495 | 10,2 | 14,1 | TP | 1,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 80 | 32 | 25 | I | 27,95 | | KĘP | | 44 | 60 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 404 | 555 | 11,3 | 15,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43h | I | 1,47 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 29 | 25 | I | 27,95 | 1,02 | 0,9 | 3 | 385 | 565 | 9,2 | 13,5 | TP | 1,47 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 57 | 24 | 22 | I | 29,78 | | KĘP | 4 | 34 | 50 | 1,2 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 615 | 10,4 | 15,2 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 43i | I | 5,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 57 | 27 | 23 | IA | 30,81 | 1,09 | 0,9 | 22 | 375 | 2 005 | 11,4 | 61,2 | TP | 5,35 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 57 | 19 | 20 | II | 23,59 | | KĘP | | 28 | 150 | 0,7 | 3,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 2 155 | 12,2 | 65,1 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,32 ha: SO 70 l., BRZ 70 l., OL 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43j | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 67 | 26 | 24 | I | 29,43 | 0,99 | 0,9 | 12 | 403 | 920 | 11,0 | 25,1 | TP | 2,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 67 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 920 | 11,0 | 25,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43k | I | 2,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 52 | 20 | 20 | I | 29,09 | 1,06 | 0,9 | 12 | 353 | 870 | 12,1 | 29,8 | TP | 2,46 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 870 | 12,1 | 29,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 43l | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 75 | 29 | 24 | II | 26,53 | 1,07 | 0,9 | 3 | 476 | 615 | 11,5 | 14,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 615 | 11,5 | 14,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,29 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, przytulia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43m | I | 2,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 100 | 31 | 26 | II | 26,00 | 0,83 | 0,8 | 3 | 292 | 700 | 6,0 | 14,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 100 | 30 | 25 | II | 25,00 | | WKĘP | 3 | 22 | 55 | 0,3 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 62 | 25 | 24 | IA | 30,56 | | | 4 | 22 | 55 | 1,0 | 2,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | KL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 336 | 810 | 7,3 | 17,5 | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 43n | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 31 | 25 | I | 27,95 | 1,01 | 0,8 | 2 | 385 | 370 | 9,1 | 8,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 53 | 27 | 23 | IA | 31,92 | | KĘP | 4 | 34 | 35 | 1,3 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 405 | 10,4 | 10,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43~a | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 43** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **33,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 670** | | | | |
| | **I** | **32,96** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,54** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 660** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **10** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 670** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 44a | I | 5,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 71 | 29 | 26 | IA | 30,60 | 1,05 | 0,9 | 3 | 465 | 2 525 | 11,6 | 62,9 | TP | 5,43 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | LP | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 2 525 | 11,6 | 62,9 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW remiza o pow. 0,14 ha: SO 45 l., BRZ 45 l., AK 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44b | I | 11,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 47 | 18 | 18 | I | 28,49 | 1,08 | 0,9 | 12 | 263 | 3 150 | 11,0 | 131,8 | TP | 11,97 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 47 | 17 | 17 | III | 21,70 | | WKĘP | | 27 | 325 | 0,8 | 9,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 290 | 3 475 | 11,8 | 140,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44c | I | 2,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 37 | 16 | 16 | IA | 30,01 | 1,00 | 0,9 | 13 | 218 | 575 | 11,0 | 29,0 | TP | 2,64 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 37 | 16 | 17 | I | 27,91 | | GRP | | 22 | 60 | 0,9 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 635 | 11,9 | 31,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 44d | I | 0,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 26 | 25 | IA | 30,65 | 0,90 | 0,9 | 13 | 382 | 255 | 10,6 | 7,1 | TP | 0,67 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 255 | 10,6 | 7,1 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44f | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 21 | 10 | 10 | IA | 31,31 | 1,00 | 1,0 | 11 | 76 | 70 | 8,5 | 7,7 | TW | 0,90 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 21 | | 9 | I | 43,28 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 21 | 11 | 11 | I | 29,91 | | | | 11 | 10 | 1,0 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.B | 1 | 21 | | 8 | II | 29,07 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | JW | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 87 | 80 | 9,5 | 8,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BEZ.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 65 l., | PRZES | DB.S | | 125 | 43 | 21 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | SO | | 65 | 23 | 18 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| 44g | I | 0,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 17 | | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 0,42 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 2 | 17 | | 5 | I | 35,88 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB.S | | 100 | 45 | 21 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 70 | 30 | 15 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | 70 | 34 | 16 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | 70 | 25 | 18 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 33 | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 70 l., DB.S 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44~a | III | 0,06 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44~b | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 44** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,34** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 038** | | | | | | |
| | **I** | **22,03** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,31** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 970** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **68** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 038** | | | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45a | I | 4,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 47 | 18 | 16 | I | 26,24 | 0,92 | 0,9 | 11 | 230 | 1 085 | 10,2 | 47,9 | TP | 4,71 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 47 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 230 | 1 085 | 10,2 | 47,9 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BRZ 5 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45b | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 62 | 26 | 24 | IA | 30,56 | 1,27 | 0,9 | 11 | 403 | 345 | 11,1 | 9,5 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 62 | 25 | 20 | III | 22,98 | | KĘP | | 65 | 55 | 1,5 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 468 | 400 | 12,6 | 10,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 45c | I | 1,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 90 | 36 | 26 | I | 27,36 | 1,18 | 0,9 | 3 | 411 | 435 | 8,5 | 9,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 90 | 27 | 25 | II | 25,81 | | DKĘP | 3 | 70 | 75 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | | | | | | | | | Razem: | | 481 | 510 | 9,4 | 10,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 40 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45d | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 26 | 12 | 11 | I | 29,21 | 1,19 | 1,0 | 11 | 162 | 475 | 13,2 | 38,8 | TW | 2,93 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 26 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 162 | 475 | 13,2 | 38,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 115 | 33 | 22 | | | | | 3 | | 170 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.B | | 115 | 29 | 18 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | Razem: | | | 180 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 115 l., DB.B 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,48 ha: SO 115 l., DB 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45f | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 23 | 21 | I | 26,83 | 1,36 | 0,9 | 11 | 392 | 715 | 10,5 | 19,1 | TP | 1,82 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 130 | 35 | 23 | III | 19,75 | | KĘP | | 76 | 140 | 1,5 | 2,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 468 | 855 | 12,0 | 21,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 45g | I | 2,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 20 | 18 | II | 25,84 | 1,17 | 0,9 | 11 | 342 | 875 | 11,8 | 30,1 | TP | 2,56 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 875 | 11,8 | 30,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45h | I | 1,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 25 | 23 | IA | 30,55 | 1,13 | 0,9 | 11 | 441 | 520 | 12,9 | 15,3 | TP | 1,18 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 441 | 520 | 12,9 | 15,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45i | I | 2,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 26 | 23 | II | 25,13 | 1,19 | 0,9 | 3 | 446 | 1 175 | 10,4 | 27,4 | IB (90%) | 2,64 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,64 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,64 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 175 | 10,4 | 27,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 45j | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 39 | 19 | 18 | IA | 31,47 | 1,06 | 0,9 | 11 | 305 | 550 | 13,3 | 24,0 | TP | 1,81 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 550 | 13,3 | 24,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45k | I | 0,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 26 | 22 | II | 23,37 | 1,31 | 0,9 | 3 | 458 | 445 | 10,4 | 10,1 | IB (100%) | 0,97 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,97 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZRB | 0,97 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 445 | 10,4 | 10,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45l | I | 2,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 43 | 18 | 16 | I | 27,60 | 1,02 | 0,9 | 11 | 252 | 625 | 11,5 | 28,5 | TP | 2,48 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 43 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 252 | 625 | 11,5 | 28,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 45m | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 3 | IA | 32,76 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,08 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 7 | | 5 | I | 42,68 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | BRZ | | 50 | 23 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.S | | 80 | 30 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | 120 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l., DB.S 80 l., BRZ 50 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45n | I | 2,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 25 | 24 | IA | 32,37 | 0,94 | 0,9 | 22 | 386 | 1 110 | 11,9 | 34,2 | TP | 2,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 1 110 | 11,9 | 34,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45~b | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45~c | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 825** | | | | |
| | **I** | **26,97** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,59** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 625** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **200** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 825** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46a | I | 3,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 47 | 18 | 18 | I | 28,49 | 1,05 | 0,9 | 11 | 306 | 940 | 12,0 | 36,9 | TP | 3,08 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 47 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 940 | 12,0 | 36,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | DB.B | | 140 | 50 | 19 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46b | I | 1,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 26 | 22 | II | 24,94 | 1,01 | 0,9 | 3 | 363 | 665 | 9,4 | 17,2 | TP | 1,83 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 363 | 665 | 9,4 | 17,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46c | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 21 | 19 | II | 24,97 | 0,84 | 0,9 | 11 | 262 | 190 | 8,8 | 6,3 | TP | 0,72 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 190 | 8,8 | 6,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46d | I | 5,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 39 | 17 | 16 | I | 29,15 | 0,97 | 0,9 | 11 | 207 | 1 225 | 10,5 | 61,9 | TP | 5,91 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 39 | 16 | 15 | II | 24,77 | | GRP | | 22 | 130 | 0,8 | 4,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 1 355 | 11,3 | 66,7 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: brodaczka zwyczajna 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46f | I | 5,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 33 | 16 | 15 | IA | 30,68 | 1,27 | 1,0 | 11 | 229 | 1 365 | 11,9 | 70,8 | TW | 5,97 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 33 | 16 | 16 | I | 28,57 | | GRP | | 44 | 265 | 2,3 | 13,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 1 630 | 14,2 | 84,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB.B | | 130 | 37 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46g | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 36 | 27 | I | 28,36 | 1,01 | 0,9 | 3 | 446 | 520 | 9,7 | 11,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 520 | 9,7 | 11,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | SO | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46h | IV | 0,40 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 40 | 18 | 12 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 25 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | | SAMOS | BRZ | | 23 | | 9 | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 46i | I | 3,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 82 | 26 | 22 | II | 24,61 | 1,21 | 0,9 | 3 | 434 | 1 340 | 10,5 | 32,5 | IB (95%) | 3,09 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 82 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,09 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 1 340 | 10,5 | 32,5 | ODN-ZRB | 3,09 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46j | I | 1,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 17 | 7 | 7 | I | 29,30 | 1,00 | 1,0 | 11 | 45 | 85 | 8,7 | 16,5 | TW | 1,89 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 17 | 8 | 8 | I | 28,71 | | DKĘP | | 10 | 20 | 1,8 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 55 | 105 | 10,5 | 19,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 111 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | | 70 | 25 | 15 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 31 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 111 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46k | I | 1,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 51 | 18 | 17 | I | 26,14 | 1,02 | 0,9 | 11 | 276 | 465 | 10,9 | 18,3 | TP | 1,68 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 51 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 276 | 465 | 10,9 | 18,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 46l | I | 1,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 38 | 18 | 18 | IA | 31,91 | 1,07 | 0,9 | 11 | 305 | 390 | 13,5 | 17,3 | TP | 1,28 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 390 | 13,5 | 17,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46~a | III | 0,46 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46~b | III | 0,19 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46~c | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,87** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 661** | | | | |
| | **I** | **26,62** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,85** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 600** | | | | |
| | **IV** | **0,40** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **46** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 646** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **15** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **5,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 800** | | | | |
| | **I** | **5,63** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,19** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 795** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **5** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **1 800** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 861** | | | | |
| | **I** | **20,99** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,66** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 805** | | | | |
| | **IV** | **0,40** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **41** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 846** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **15** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47a | I | 1,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 33 | 23 | II | 23,00 | 1,23 | 0,9 | 3 | 438 | 455 | 9,3 | 9,7 | IB (95%) | 1,04 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,04 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,04 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.B | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 455 | 9,3 | 9,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47b | I | 4,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 41 | 19 | 18 | IA | 30,65 | 1,20 | 0,9 | 11 | 317 | 1 390 | 12,8 | 56,0 | TP | 4,39 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 56 | 20 | 20 | I | 27,97 | | KĘP | | 33 | 145 | 1,3 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 1 535 | 14,0 | 61,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47c | I | 1,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 2 | I | 29,73 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 2 | II | 29,18 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 109 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 109 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47d | I | 0,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 20 | 19 | I | 27,18 | 1,13 | 0,9 | 11 | 353 | 195 | 12,0 | 6,6 | TP | 0,55 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 195 | 12,0 | 6,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47f | I | 2,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 54 | 19 | 19 | I | 27,45 | 1,31 | 0,9 | 11 | 408 | 830 | 13,5 | 27,4 | TP | 2,04 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 830 | 13,5 | 27,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47g | I | 3,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 26 | 11 | 11 | I | 29,21 | 1,05 | 1,0 | 11 | 119 | 450 | 9,7 | 36,5 | TW | 3,77 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 26 | 12 | 12 | I | 27,40 | | GRP | | 22 | 85 | 1,9 | 7,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 535 | 11,6 | 43,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 130 | 35 | 22 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 47h | I | 3,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 21 | 8 | 8 | I | 27,73 | 1,00 | 1,0 | 11 | 70 | 280 | 7,5 | 29,7 | TW | 3,97 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 21 | 11 | 10 | I | 28,24 | | KĘP | | 11 | 45 | 0,9 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 2 | 21 | | 6 | II | 25,79 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KL | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 81 | 325 | 8,4 | 33,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | PRZES | SO | | 129 | 34 | 23 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: DB.B 90 l., SO 129 l., | | DB.B | | 90 | 32 | 15 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 129 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 129 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47i | I | 2,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 75 | 30 | 27 | IA | 30,82 | 1,36 | 0,9 | 2 | 397 | 1 010 | 8,3 | 21,1 | TP | 2,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 62 | 25 | 24 | IA | 30,56 | | KĘP | 3 | 147 | 375 | 4,4 | 11,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 105 | 35 | 28 | I | 27,39 | | | 2 | 57 | 145 | 1,1 | 2,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB.B | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | 601 | 1 530 | 13,7 | 35,0 | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47j | I | 2,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | 0,98 | 0,9 | 11 | 331 | 725 | 9,4 | 20,5 | TP | 2,19 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 90 | 32 | 27 | I | 28,36 | | KĘP | | 77 | 170 | 1,9 | 4,2 | | |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 895 | 11,3 | 24,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 20 | | 4 | II | 26,29 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 47k | I | 2,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 14 | | 7 | IA | 32,82 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | TW | 2,35 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 14 | | 8 | I | 32,96 | | GRP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 130 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | | 130 | 32 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l., DB.B 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47l | I | 2,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,77 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 5 | | 3 | I | 42,43 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 104 | 26 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | | 104 | 30 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47m | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 38 | 16 | 15 | I | 28,37 | 1,03 | 0,9 | 11 | 207 | 205 | 10,7 | 10,6 | TP | 0,99 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 1 | 38 | 16 | 17 | II | 30,89 | | DKĘP | | 22 | 20 | 1,1 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 225 | 11,8 | 11,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 47n | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 20 | 19 | I | 26,91 | 1,20 | 0,9 | 11 | 375 | 640 | 12,4 | 21,0 | TP | 1,70 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 640 | 12,4 | 21,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47o | I | 1,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 56 | 27 | 24 | IA | 32,10 | 1,19 | 0,9 | 11 | 397 | 660 | 11,2 | 18,6 | TP | 1,66 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 130 | 45 | 25 | III | 21,76 | | WKĘP | | 77 | 130 | 1,5 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | Razem: | | 474 | 790 | 12,7 | 21,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47~a | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47~b | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47~c | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47~d | III | 0,06 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 47** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,79** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 135** | | | | |
| | **I** | **31,10** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,69** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 955** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **180** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 135** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **1,81** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **650** | | | | |
| | **I** | **1,59** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **650** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **650** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 485** | | | | |
| | **I** | **29,51** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,47** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 305** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **180** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 485** | | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48a | II | 2,28 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 110 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 70 | | | ODN-ZRB | 2,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | PIEL | 2,28 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,01 ha ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48b | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 63 | 24 | 23 | I | 29,32 | 1,08 | 0,9 | 11 | 305 | 300 | 8,3 | 8,2 | TP | 0,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 52 | 19 | 18 | I | 26,94 | | KĘP | | 87 | 85 | 3,5 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 392 | 385 | 11,8 | 11,7 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 48c | I | 1,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 18 | 18 | IA | 31,06 | 1,10 | 0,9 | 11 | 316 | 315 | 13,5 | 13,5 | TP | 1,00 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 315 | 13,5 | 13,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48d | I | 7,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 28 | 26 | I | 27,36 | 1,19 | 0,9 | 3 | 505 | 3 985 | 10,7 | 84,2 | IB (95%)/1 | 1,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 1,82 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 1,82 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | IB (95%)/2 | 2,25 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 505 | 3 985 | 10,7 | 84,2 | AGROT/2 | 2,25 |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 2,25 |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | IB (95%)/3 | 3,82 |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | AGROT/3 | 3,82 |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/3 | 3,82 |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48f | I | 0,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 30 | 27 | IA | 30,82 | 1,19 | 0,9 | 2 | 544 | 530 | 12,5 | 12,1 | TP | 0,97 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 530 | 12,5 | 12,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 48g | I | 1,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 29 | IA | 32,80 | 1,10 | 0,9 | 2 | 544 | 880 | 12,3 | 19,9 | TP | 1,62 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 880 | 12,3 | 19,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48h | I | 1,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 28 | IA | 31,81 | 1,15 | 0,9 | 2 | 544 | 1 070 | 12,5 | 24,5 | TP | 1,97 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 1 070 | 12,5 | 24,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48i | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 53 | 24 | 23 | IA | 31,92 | 1,06 | 0,9 | 11 | 221 | 380 | 6,5 | 11,2 | TP | 1,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 53 | 22 | 22 | I | 28,26 | | KĘP | | 88 | 150 | 2,4 | 4,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 63 | 35 | 25 | IA | 31,33 | | | | 83 | 145 | 2,5 | 4,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 675 | 11,4 | 19,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 48j | I | 1,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 90 | 32 | 27 | I | 28,36 | 1,31 | 0,9 | 3 | 387 | 670 | 8,2 | 14,2 | IB (95%) | 1,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 140 | 41 | 30 | II | 26,03 | | KĘP | 3 | 188 | 325 | 2,4 | 4,2 | AGROT | 1,73 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,73 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | OS | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 575 | 995 | 10,6 | 18,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48k | I | 0,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 16 | | 6 | I | 28,03 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,89 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 4 | 16 | | 6 | I | 29,96 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | DB.S | | 120 | 40 | 22 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48l | I | 1,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 56 | 20 | 19 | I | 26,91 | 1,14 | 0,9 | 11 | 287 | 325 | 9,5 | 10,8 | TP | 1,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 56 | 20 | 20 | II | 25,48 | | KĘP | | 55 | 60 | 1,6 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 385 | 11,1 | 12,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48m | I | 5,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 19 | 18 | I | 29,16 | 0,83 | 0,9 | 11 | 241 | 1 355 | 10,3 | 58,1 | TP | 5,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 241 | 1 355 | 10,3 | 58,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | DB.B | | 120 | 80 | 19 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48~a | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48~b | III | 0,47 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 48** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | | **10 670** | | | | |
| | **I** | **25,54** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **II** | **2,28** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | | **10 575** | | | | |
| | **III** | **0,74** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | | **25** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | | | **70** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | | **10 670** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49a | I | 0,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 51 | 20 | 19 | I | 28,32 | 1,08 | 0,9 | 11 | 210 | 160 | 7,2 | 5,4 | TP | 0,75 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 70 | 28 | 24 | I | 28,81 | | KĘP | | 166 | 125 | 4,6 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 376 | 285 | 11,8 | 8,9 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 49b | I | 10,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 33 | 27 | I | 28,36 | 1,14 | 0,9 | 3 | 458 | 5 010 | 9,5 | 104,2 | IB (95%)/1 | 3,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 55 | 22 | 20 | I | 28,24 | | WKĘP | 4 | 35 | 385 | 1,2 | 13,6 | AGROT/1 | 3,50 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 3,50 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 5 395 | 10,8 | 117,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 10 | 30 | | 5 | IV | 20,29 | 0,10 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49c | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 33 | 28 | I | 29,35 | 1,12 | 0,9 | 3 | 517 | 1 010 | 10,7 | 20,8 | IIIA (40%) | 1,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,78 |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 517 | 1 010 | 10,7 | 20,8 | ODN-ZŁOŻ | 0,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 30 | | 8 | II | 28,53 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 49d | I | 1,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 32 | 28 | IA | 31,81 | 1,05 | 0,9 | 2 | 499 | 920 | 11,7 | 21,4 | TP | 1,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 499 | 920 | 11,7 | 21,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49f | I | 0,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 24 | 12 | 11 | IA | 30,58 | 1,15 | 0,9 | 11 | 157 | 70 | 13,4 | 5,8 | TW | 0,43 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 24 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 157 | 70 | 13,4 | 5,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | DB.S | | 120 | 60 | 19 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 4 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49g | I | 2,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 25 | 23 | I | 29,55 | 1,09 | 0,9 | 11 | 425 | 950 | 12,1 | 27,1 | TP | 2,24 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 950 | 12,1 | 27,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 49h | I | 6,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 22 | 20 | I | 28,24 | 1,13 | 0,9 | 11 | 375 | 2 555 | 12,3 | 83,8 | TP | 6,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 2 555 | 12,3 | 83,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49~a | III | 0,43 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49~b | III | 0,42 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,81** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 189** | | | | |
| | **I** | **24,96** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,85** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 185** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **4** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 189** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 50a | I | 5,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 35 | 28 | IA | 30,92 | 0,94 | 0,9 | 2 | 442 | 2 305 | 10,3 | 53,6 | TP | 5,22 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 2 305 | 10,3 | 53,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 30 | | 10 | I | 33,44 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50b | I | 3,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 29 | 25 | IA | 30,87 | 0,99 | 0,9 | 22 | 382 | 1 245 | 10,3 | 33,7 | TP | 3,26 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 80 | 36 | 28 | IA | 30,92 | | WKĘP | | 44 | 145 | 1,1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 426 | 1 390 | 11,4 | 37,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 9 | 20 | | 6 | I | 34,61 | 0,50 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.B | 1 | 20 | | 5 | III | 24,56 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50c | I | 0,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 61 | 21 | 20 | I | 26,71 | 0,92 | 0,9 | 12 | 305 | 200 | 10,0 | 6,5 | TP | 0,65 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 61 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 200 | 10,0 | 6,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 50d | I | 2,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 22 | 10 | 10 | IA | 30,49 | 1,00 | 1,0 | 11 | 103 | 285 | 9,6 | 26,4 | TW | 2,76 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 22 | | 5 | III | 23,14 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 103 | 285 | 9,6 | 26,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | SO | | 120 | 36 | 25 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB.S | | 80 | 35 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 36 | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50f | I | 1,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 28 | 13 | 13 | IA | 30,84 | 1,16 | 1,0 | 12 | 206 | 360 | 13,8 | 24,2 | TW | 1,75 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 206 | 360 | 13,8 | 24,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | SO | | 120 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50g | I | 2,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 14 | | 5 | I | 27,68 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,09 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 14 | | 3 | III | 24,65 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 14 | | 3 | I | 31,04 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | LP | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 115 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 115 | 50 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | | 70 | 25 | 17 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 46 | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 50h | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 4 | | 1 | I | 33,42 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 114 | 32 | 26 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 114 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50i | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 19 | 18 | I | 29,16 | 1,02 | 1,0 | 12 | 295 | 215 | 12,0 | 8,8 | TP | 0,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 215 | 12,0 | 8,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | JAŁ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50j | I | 6,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 20 | 20 | IA | 31,36 | 1,03 | 0,9 | 13 | 339 | 2 110 | 12,8 | 79,8 | TP | 6,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 2 110 | 12,8 | 79,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 50k | I | 3,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 29 | 25 | I | 26,37 | 1,04 | 0,9 | 3 | 423 | 1 500 | 9,5 | 33,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 1 500 | 9,5 | 33,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50~a | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50~b | III | 0,29 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,63** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 492** | | | | |
| | **I** | **28,18** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,45** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 365** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **127** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 492** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51a | I | 3,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 3,58 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 6 | | 3 | I | 36,88 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 120 | 37 | 23 | | | | | 3 | | 70 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,19 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 51b | I | 4,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 63 | 26 | 22 | I | 28,30 | 0,97 | 0,9 | 11 | 327 | 1 540 | 9,7 | 45,5 | TP | 4,71 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 63 | 23 | 20 | II | 24,14 | | GRP | | 22 | 105 | 0,6 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 349 | 1 645 | 10,3 | 48,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51c | I | 3,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 26 | 23 | IA | 30,81 | 0,99 | 0,9 | 11 | 386 | 1 215 | 11,9 | 37,3 | TP | 3,15 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 1 215 | 11,9 | 37,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | PODR | BK | 10 | 15 | | 4 | I | 35,01 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51d | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,94 | 0,9 | 2 | 431 | 465 | 10,5 | 11,4 | TP | 1,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 465 | 10,5 | 11,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | | | |
| 51f | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 51 | 19 | 18 | I | 27,24 | 1,06 | 0,9 | 11 | 309 | 705 | 11,5 | 26,3 | TP | 2,28 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 51 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 309 | 705 | 11,5 | 26,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 33 l., SO 33 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51g | I | 1,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 18 | 8 | 8 | IA | 30,38 | 1,00 | 1,0 | 11 | 50 | 75 | 9,2 | 13,7 | TW | 1,49 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 18 | 11 | 11 | I | 33,19 | | KĘP | | 10 | 15 | 2,2 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 60 | 90 | 11,5 | 17,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PRZES | SO | | 112 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 112 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 112 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51h | I | 6,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 86 | 28 | 24 | II | 25,97 | 1,17 | 0,9 | 3 | 458 | 3 180 | 10,4 | 72,4 | IB (95%)/1 | 3,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 86 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 3,58 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 3,58 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | ŚW | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 3 180 | 10,4 | 72,4 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51~a | III | 0,53 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Podsumowanie dla oddziału: 51** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 430** | | | | |
| | **I** | **23,23** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,53** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 300** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **130** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 430** | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52a | I | 15,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 28 | 25 | IA | 30,87 | 0,92 | 0,9 | 22 | 392 | 6 035 | 10,9 | 167,5 | TP | 15,39 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | MD | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 6 035 | 10,9 | 167,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 5 | 27 | | 6 | II | 25,79 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚW | 3 | 27 | | 5 | III | 24,99 | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | 2 | 27 | | 8 | III | 20,73 | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52b | I | 8,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 33 | 26 | I | 27,36 | 1,08 | 0,9 | 3 | 458 | 4 030 | 10,0 | 87,5 | IB (95%)/1 | 3,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 3,95 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 3,95 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | IB (95%)/2 | 2,50 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 4 030 | 10,0 | 87,5 | AGROT/2 | 2,50 |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 2,50 |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | MD | | | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52~a | III | 0,77 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52~b | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 66 | 23 | 21 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,03** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 085** | | | | | |
| | **I** | **24,19** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,84** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 065** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 065** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **20** | | | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53a | I | 7,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 30 | 24 | I | 29,65 | 0,94 | 0,9 | 12 | 382 | 2 865 | 10,7 | 80,2 | TP | 7,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 2 865 | 10,7 | 80,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODR | BK | 10 | 29 | | 6 | III | 24,00 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | ŚW | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53b | IV | 0,40 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53c | I | 1,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 66 | 30 | 26 | IA | 31,65 | 1,03 | 0,9 | 11 | 414 | 640 | 10,8 | 16,7 | TP | 1,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 66 | 27 | 25 | I | 28,73 | | DKĘP | | 33 | 50 | 0,6 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 690 | 11,4 | 17,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODR | BK | 10 | 25 | | 8 | I | 33,98 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 53d | I | 3,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 16 | | 3 | III | 19,12 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 3,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 16 | | 5 | II | 27,93 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 16 | | 5 | I | 38,03 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 105 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 105 | 50 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | 105 | 30 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | | 80 | 25 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 75 | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 105 l., SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l., DB.S 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,07 ha: AK 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W remiza o pow. 0,09 ha: GŁG 16 l., JRZ 16 l., KRU 16 l., ŚL.A 16 l., KL.P 0 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53f | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | PRZEST (20%) | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | KĘP | | | | | | CW | 1,40 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 110 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | 63 | 24 | 23 | | | | | 3 | | 85 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 125 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,22 ha: SO 63 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53g | I | 1,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 34 | 18 | 16 | IA | 31,41 | 1,12 | 0,9 | 11 | 185 | 230 | 9,7 | 11,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 34 | 17 | 16 | I | 28,08 | | KĘP | | 65 | 80 | 3,1 | 3,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | Razem: | | 250 | 310 | 12,8 | 15,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, gajnik lśniący | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 53h | I | 1,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 31 | 26 | IA | 32,57 | 1,00 | 0,9 | 21 | 447 | 805 | 12,2 | 21,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 805 | 12,2 | 21,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53i | I | 1,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 100 | 35 | 25 | II | 25,00 | 0,96 | 0,8 | 3 | 303 | 460 | 6,5 | 9,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 80 | 28 | 23 | II | 25,80 | | GRP | 4 | 34 | 50 | 1,1 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | 1 | 80 | 28 | 23 | II | 27,39 | | | 3 | 34 | 50 | 1,4 | 2,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LP | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 560 | 9,0 | 13,5 | | |
| | | | Gosp.: S | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, rokiet | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53j | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 65 | 31 | 25 | IA | 30,87 | 1,06 | 0,9 | 12 | 273 | 215 | 7,2 | 5,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | | KĘP | | 164 | 130 | 5,1 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 437 | 345 | 12,3 | 9,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53~a | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53~b | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 66 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 17 | | | | |
| 53~c | III | 0,03 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 53** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **5 792** | | | | | |
| | **I** | **18,85** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,35** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **5 575** | | | | | |
| | **IV** | **0,40** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | **200** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **5 775** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | | **17** | | | | | |
| | | Województwo: LUBUSKIE (08) | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | |
| | | Powiat: Międzyrzecki (03) | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54a | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 26 | 25 | IA | 31,33 | 1,10 | 0,9 | 21 | 469 | 855 | 12,6 | 23,0 | TP | 1,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 469 | 855 | 12,6 | 23,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 9 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54b | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 25 | 23 | I | 29,32 | 0,98 | 0,9 | 11 | 382 | 425 | 11,1 | 12,3 | TP | 1,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 425 | 11,1 | 12,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54c | I | 2,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 26 | 23 | I | 29,32 | 0,98 | 0,9 | 11 | 382 | 790 | 11,1 | 22,9 | TP | 2,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 790 | 11,1 | 22,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54d | I | 1,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 85 | 30 | 24 | I | 26,13 | 1,31 | 0,9 | 3 | 423 | 790 | 9,1 | 17,1 | IB (90%) | 1,87 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 70 | 24 | 24 | I | 28,81 | | WKĘP | 3 | 94 | 175 | 2,6 | 4,9 | AGROT | 1,87 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,87 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //piasek luźny | | | | | | | | | | Razem: | | 517 | 965 | 11,8 | 22,0 | | |
| | | | //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 54f | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 23 | 19 | II | 25,90 | 1,02 | 0,9 | 11 | 320 | 450 | 10,5 | 14,8 | TP | 1,40 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 450 | 10,5 | 14,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54g | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 34 | 14 | 13 | I | 27,62 | 0,96 | 1,0 | 11 | 174 | 245 | 11,0 | 15,4 | TW | 1,40 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 174 | 245 | 11,0 | 15,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, płonnik, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54h | I | 1,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,06 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 7 | | 2 | I | 31,35 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DER.Ś | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// | | JW | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SZK | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 95 | 30 | 24 | | | | | 2 | | 25 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 54i | I | 0,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 95 | 35 | 23 | III | 23,50 | 1,00 | 0,9 | 3 | 191 | 10 | 4,3 | 0,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z | | OL | 5 | 45 | 18 | 21 | II | 28,52 | | GRP | 4 | 168 | 10 | 6,3 | 0,4 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 20 | 10,6 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | OL | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | | PRZ.CW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | odroślowy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, sit, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54j | I | 0,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 25 | 24 | IA | 30,33 | 1,01 | 0,9 | 11 | 414 | 130 | 11,6 | 3,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 130 | 11,6 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54~a | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 54** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **3 905** | | | | |
| | **I** | **11,11** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,04** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 880** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **25** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **3 905** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55a | I | 8,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 31 | 12 | 12 | I | 27,75 | 1,22 | 1,0 | 12 | 174 | 1 525 | 11,7 | 102,9 | TW | 8,76 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 31 | 11 | 13 | II | 25,80 | | DKĘP | | 16 | 140 | 1,0 | 9,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 190 | 1 665 | 12,8 | 111,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 105 | 28 | 19 | | | | | 3 | | 45 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 145 | 38 | 20 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, płonnik, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 145 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55b | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 28 | 23 | II | 23,66 | 0,99 | 0,9 | 4 | 359 | 395 | 8,3 | 9,1 | IB (95%) | 1,10 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,10 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 395 | 8,3 | 9,1 | ODN-ZRB | 1,10 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, pszeniec | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 55c | I | 2,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 9 | 9 | I | 28,02 | 1,07 | 1,0 | 12 | 92 | 245 | 10,4 | 27,6 | TW | 2,66 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 9 | 10 | II | 26,55 | | DKĘP | | 11 | 30 | 0,9 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 103 | 275 | 11,3 | 30,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PRZES | SO | | 105 | 27 | 21 | | | | | 3 | | 20 | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | SO | | 56 | 18 | 18 | | | | | 4 | | 35 | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | | 70 | 22 | 16 | | | | | 4 | | 2 | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 65 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 50 | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 107 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,21 ha: SO 56 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l., DB.B 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 65 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55d | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 0,79 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 8 | | 4 | I | 34,35 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy, płonnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55f | I | 1,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 29 | 24 | I | 26,13 | 1,05 | 0,9 | 3 | 411 | 810 | 9,7 | 19,2 | IB (95%) | 1,97 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 130 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,97 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,97 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.B | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 810 | 9,7 | 19,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy, płonnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55g | I | 1,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 29 | 25 | I | 29,81 | 0,82 | 0,9 | 23 | 273 | 470 | 7,6 | 13,2 | TP | 1,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 60 | 24 | 22 | I | 29,02 | | WKĘP | | 65 | 110 | 2,0 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 338 | 580 | 9,6 | 16,6 | | |
| | | | POROL | PODR | BK | 10 | 25 | | 4 | IV | 20,88 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55h | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 10 | 34 | 14 | 14 | II | 25,61 | 1,08 | 1,0 | 13 | 164 | 130 | 9,2 | 7,2 | TP | 0,78 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG | | OL | MJS | 34 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 164 | 130 | 9,2 | 7,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | DB.B | | 85 | 33 | 14 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, płonnik, wrzos pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55~a | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55~b | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 55** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **18,04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 018** | | | | | |
| | **I** | **17,79** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,25** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 855** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **163** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 018** | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56a | I | 1,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 58 | 18 | 18 | II | 25,33 | 0,92 | 0,9 | 12 | 243 | 290 | 8,7 | 10,4 | TP | 1,19 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 65 | 26 | 22 | I | 27,85 | | KĘP | | 33 | 40 | 1,0 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 276 | 330 | 9,7 | 11,6 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56b | I | 3,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 2 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 3,94 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 3 | | | | | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 105 | 38 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 40 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 90 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek darniowy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 50 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56c | I | 2,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 36 | 18 | 16 | IA | 30,46 | 1,24 | 0,9 | 12 | 142 | 285 | 7,2 | 14,5 | TP | 2,00 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 46 | 19 | 19 | I | 29,92 | | KĘP | | 76 | 150 | 2,8 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 2 | 46 | 15 | 18 | II | 25,86 | | | | 44 | 90 | 1,9 | 3,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | 1 | 58 | 23 | 21 | I | 28,49 | | | | 76 | 150 | 1,3 | 2,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 338 | 675 | 13,3 | 26,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 56d | I | 4,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 95 | 32 | 26 | I | 26,66 | 1,02 | 0,9 | 3 | 314 | 1 370 | 6,4 | 27,9 | IB (95%)/1 | 2,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 105 | 36 | 28 | I | 27,39 | | WKĘP | 3 | 79 | 345 | 1,8 | 7,6 | AGROT/1 | 2,52 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 130 | 65 | 28 | III | 25,18 | | | 3 | 45 | 195 | 1,0 | 4,2 | ODN-ZRB/1 | 2,52 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | IB (95%)/2 | 1,85 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 1,85 |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 1,85 |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | SO | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 1 910 | 9,1 | 39,8 | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56f | I | 1,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 27 | 12 | 12 | IA | 30,05 | 1,01 | 0,9 | 13 | 119 | 175 | 8,5 | 12,6 | TW | 1,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 27 | 11 | 11 | II | 25,30 | | DKĘP | | 16 | 25 | 1,7 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 27 | 8 | 8 | III | 25,30 | | | | 5 | 5 | 0,6 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | | | | | | | | | | Razem: | | 140 | 205 | 10,8 | 16,0 | | |
| | | | //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB.B | | 130 | 65 | 27 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.B | | 90 | 32 | 20 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | 130 | 40 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 80 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB.B 90 l., SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56g | I | 5,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 28 | 24 | IA | 30,56 | 0,96 | 0,9 | 22 | 392 | 2 080 | 11,3 | 59,9 | TP | 5,30 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 2 080 | 11,3 | 59,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ////piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 56h | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 35 | 17 | 18 | IA | 33,30 | 0,92 | 0,9 | 13 | 207 | 280 | 10,1 | 13,7 | TW | 1,36 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 2 | 35 | 17 | 19 | I | 31,16 | | KĘP | | 44 | 60 | 1,9 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 340 | 12,0 | 16,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | OL | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ////piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56~a | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56~b | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 56** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 710** | | | | |
| | **I** | **19,64** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,34** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 540** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **170** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 710** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57a | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 49 | 18 | 18 | I | 27,84 | 0,98 | 0,9 | 13 | 284 | 515 | 11,1 | 20,2 | TP | 1,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 49 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 515 | 11,1 | 20,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57b | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 33 | 15 | 15 | IA | 30,68 | 0,86 | 0,9 | 12 | 142 | 185 | 7,8 | 10,1 | TW | 1,29 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 33 | 14 | 15 | I | 27,34 | | KĘP | | 27 | 35 | 1,7 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 33 | 10 | 11 | II | 26,23 | | | | 5 | 5 | 0,7 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.C | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 174 | 225 | 10,2 | 13,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57c | I | 1,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 31 | 26 | I | 27,36 | 1,05 | 0,9 | 3 | 446 | 585 | 9,7 | 12,8 | IB (95%) | 1,31 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,31 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,31 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 585 | 9,7 | 12,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57d | I | 1,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | 0,93 | 1,0 | 12 | 130 | 260 | 9,5 | 18,9 | TW | 1,99 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 25 | 8 | 8 | II | 26,44 | | WKĘP | | 5 | 10 | 1,2 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 270 | 10,7 | 21,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 125 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | | 125 | 45 | 19 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 57f | I | 1,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 24 | I | 26,95 | 0,91 | 0,8 | 3 | 363 | 705 | 9,2 | 17,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | | | | | | | | | | Razem: | | 363 | 705 | 9,2 | 17,8 | | |
| | | | //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57g | I | 8,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 19 | 19 | IA | 30,27 | 1,09 | 0,9 | 13 | 339 | 2 715 | 13,0 | 104,0 | TP | 8,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 2 715 | 13,0 | 104,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57h | I | 2,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 2 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 1,66 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 17 | | 6 | II | 29,01 | | WKĘP | | | | | | CP | 0,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// | | OS | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB | | 120 | 55 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 100 | 38 | 27 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | OS | | 80 | 38 | 24 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | Razem: | | | 61 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 100 l., DB 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 57i | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 31 | 26 | I | 28,94 | 0,97 | 0,9 | 3 | 317 | 445 | 7,0 | 9,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 61 | 26 | 24 | IA | 30,81 | | KĘP | 4 | 68 | 95 | 2,3 | 3,2 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 61 | 24 | 23 | I | 27,58 | | | 4 | 23 | 30 | 0,7 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ////piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 570 | 10,0 | 14,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 10 | 24 | | 6 | II | 28,98 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57j | I | 2,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 59 | 27 | 24 | IA | 31,30 | 1,06 | 0,9 | 12 | 364 | 745 | 10,0 | 20,4 | TP | 2,04 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 59 | 24 | 24 | I | 29,00 | | GRP | | 28 | 55 | 0,7 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 34 | 17 | 17 | IA | 32,62 | | | | 22 | 45 | 1,4 | 2,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //// | | DB.S | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 845 | 12,1 | 24,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | DB.S | | 130 | 52 | 23 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,22 ha: DB.S 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57~a | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57~b | III | 0,32 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 57** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 586** | | | | |
| | **I** | **22,15** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 430** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **156** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 586** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58a | I | 4,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 38 | 17 | 17 | IA | 30,75 | 1,15 | 0,9 | 12 | 305 | 1 430 | 13,8 | 64,8 | TP | 4,69 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina lekka //// | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 1 430 | 13,8 | 64,8 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58b | I | 5,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 32 | 14 | 15 | IA | 31,20 | 0,98 | 0,9 | 12 | 185 | 925 | 10,0 | 49,9 | TW | 5,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 32 | 13 | 15 | I | 27,85 | | WKĘP | | 16 | 80 | 0,9 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 32 | 12 | 12 | II | 27,82 | | | | 5 | 25 | 0,8 | 4,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 206 | 1 030 | 11,7 | 58,7 | | |
| | | | | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 58c | I | 5,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 14 | | 5 | I | 27,68 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 5,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 14 | | 2 | III | 23,66 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 3 | 25 | | 9 | II | 27,84 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | | SO | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// | | LP | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | PRZES | SO | | 150 | 40 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | 90 | 35 | 22 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 52 | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,1 ha: BK 90 l., SO 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58d | I | 6,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW (70%) | 6,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 5 | | 1 | I | 42,79 | | WKĘP | | | | | | CP (30%) | 6,44 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 150 | 46 | 26 | | | | | 3 | | 70 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 149 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,21 ha: SO 149 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58~a | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58~b | III | 0,38 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 582** | | | | |
| | **I** | **21,58** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,60** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 460** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **122** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 582** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59a | I | 17,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 23 | 23 | I | 29,55 | 0,92 | 0,9 | 12 | 360 | 6 405 | 10,7 | 190,1 | TP | 17,79 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | MD | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 6 405 | 10,7 | 190,1 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 60 l., BK 85 l., BK 60 l., | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DB.S 85 l., | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59b | I | 1,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 77 | 28 | 25 | I | 28,47 | 0,98 | 0,9 | 3 | 408 | 750 | 10,2 | 18,7 | TP | 1,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 77 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | BK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 750 | 10,2 | 18,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ///piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59c | III | 0,07 | Rodzaj powierzchni: URZ WOD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Punkt czerpania wody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59~a | III | 0,67 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59~b | III | 0,37 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 59** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **20,74** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 155** | | | | | |
| | **I** | **19,63** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **1,11** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 155** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 155** | | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60a | I | 1,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 22 | 21 | I | 28,49 | 0,97 | 0,9 | 12 | 342 | 625 | 11,0 | 20,1 | TP | 1,83 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 625 | 11,0 | 20,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: BK 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60b | I | 4,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 18 | 18 | IA | 31,06 | 1,02 | 0,9 | 13 | 294 | 1 325 | 12,8 | 57,4 | TP | 4,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 1 325 | 12,8 | 57,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 60c | I | 7,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 55 | 24 | 22 | IA | 30,32 | 1,06 | 0,9 | 12 | 309 | 2 210 | 9,9 | 70,9 | TP | 7,15 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 46 | 20 | 19 | I | 29,92 | | WKĘP | | 72 | 515 | 2,5 | 18,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | MD | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 2 725 | 12,4 | 88,9 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60d | I | 6,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 78 | 34 | 28 | IA | 31,27 | 0,89 | 0,6 | 3 | 419 | 2 555 | 10,1 | 61,3 | TP | 6,10 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 78 | | | | | | --- | | | | | | CP | 5,50 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | MD | MJS | 78 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | STOPN | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 2 555 | 10,1 | 61,3 | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PODR | BK | 10 | 34 | | 10 | II | 29,73 | 0,90 | | 11 | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,45 ha: ŚW 25 l., BRZ 25 l., SO 25 l., MD 25 l., BK 25 l., DB.S 25 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60f | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 34 | 27 | I | 28,36 | 1,03 | 0,9 | 3 | 411 | 705 | 8,8 | 15,2 | TP | 1,72 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | MD | 1 | 90 | 42 | 31 | I | 32,33 | | KĘP | 2 | 47 | 80 | 1,1 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 785 | 9,9 | 17,1 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, orlica pospolita, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60~b | III | 0,39 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 58 | 17 | 17 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Razem: | | | | 20 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **21,92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **8 035** | | | | | |
| | **I** | **21,30** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,62** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **8 015** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **8 015** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | | **20** | | | | | |
| | | | Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61a | I | 12,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 35 | 27 | I | 28,36 | 1,06 | 0,9 | 3 | 470 | 5 945 | 10,0 | 126,9 | IIIA (40%)/1 | 4,89 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 1,96 |
| | | | ZG | | ŚW | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/1 | 1,96 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | IIIA (40%)/2 | 4,94 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | | | | | | | | | | Razem: | 470 | 5 945 | 10,0 | 126,9 | AGROT/2 | 1,98 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/2 | 1,98 |
| | | | //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, śmiałek, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: ŚW 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W bagno o pow. 0,07 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C luka o pow. 0,15 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61b | I | 3,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 30 | 25 | I | 26,37 | 1,04 | 0,9 | 3 | 423 | 1 490 | 9,5 | 33,3 | IB (95%) | 3,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | AGROT | 3,52 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 3,52 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 1 490 | 9,5 | 33,3 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61c | I | 5,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 67 | 25 | 22 | I | 27,41 | 0,98 | 0,9 | 12 | 360 | 1 805 | 10,4 | 52,2 | TP | 5,02 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 67 | | | | | | --- | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 67 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 1 805 | 10,4 | 52,2 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61d | I | 1,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 31 | 26 | I | 27,36 | 0,97 | 0,9 | 3 | 411 | 730 | 9,2 | 16,4 | IB (95%) | 1,78 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | AGROT | 1,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,78 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 730 | 9,2 | 16,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 45 l., ŚW 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 61f | I | 2,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 20 | 9 | 9 | IA | 30,42 | 1,00 | 1,0 | 11 | 35 | 100 | 4,7 | 13,7 | TW | 2,92 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 20 | | 6 | I | 34,61 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | MD | 1 | 20 | 14 | 12 | I | 34,25 | | | | 15 | 45 | 1,2 | 3,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | LP | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 50 | 145 | 5,9 | 17,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 115 | 32 | 27 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica, malina właściwa | | DB.S | | 90 | 24 | 20 | | | | | 4 | | 40 | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,35 ha: DB.S 90 l., SO 115 l., | | DB.S | | 115 | 55 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| 61g | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 9 | | 3 | I | 28,15 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 12 | | 2 | III | 22,98 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 10 | | 1 | IV | 21,08 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | LP | PJD | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 114 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | 90 | 32 | 22 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | 90 | 42 | 21 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | 90 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 24 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 90 l., ŚW 90 l., SO 114 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE remiza o pow. 0,12 ha: BRZ 40 l., LSZ 20 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 61h | I | 2,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 2 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 2,04 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 4 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | JW | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | | CZR.P | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// | PRZES | SO | | 115 | 46 | 27 | | | | | 3 | | 15 | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | 90 | 35 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | 90 | 28 | 24 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | 60 | 23 | 19 | | | | | 4 | | 3 | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 90 l., BRZ 90 l., SO 115 l., ŚW 60 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61~b | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61~c | III | 0,12 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,44** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 229** | | | | |
| | **I** | **30,86** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,58** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 115** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **114** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 229** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **14,81** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 794** | | | | |
| | **I** | **14,69** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,12** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 680** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **114** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 794** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,63** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 435** | | | | |
| | **I** | **16,17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **III** | **0,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **7 435** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62a | I | 3,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 28 | 24 | I | 29,65 | 0,89 | 0,9 | 12 | 360 | 1 225 | 10,3 | 35,0 | TP | 3,40 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 1 225 | 10,3 | 35,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 25 l., MD 25 l., SO 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62b | I | 8,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 86 | 33 | 25 | I | 26,97 | 1,03 | 0,9 | 3 | 423 | 3 705 | 9,7 | 85,3 | IB (95%)/1 | 4,00 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 86 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 4,00 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 4,00 |
| | | | Teren: nizinny falisty | | OL | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 86 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 3 705 | 9,7 | 85,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,19 ha: MD 25 l., BRZ 25 l., SO 32 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 62c | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 23 | 21 | I | 29,02 | 0,91 | 0,9 | 12 | 320 | 650 | 10,7 | 21,7 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 650 | 10,7 | 21,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62d | I | 2,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 31 | 25 | IA | 30,22 | 0,90 | 0,9 | 22 | 382 | 910 | 10,4 | 24,8 | TP | 2,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | SO | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 910 | 10,4 | 24,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODR | BK | 10 | 24 | | 6 | II | 28,98 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | MD | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, nerecznica | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 33 l., SO 33 l., | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 62f | I | 7,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 35 | 27 | I | 28,36 | 0,95 | 0,8 | 3 | 394 | 2 920 | 8,3 | 61,8 | IIIB (50%) | 7,41 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | 1 | 90 | 32 | 28 | II | 29,80 | | WKĘP | 3 | 35 | 260 | 1,2 | 9,1 | AGROT | 1,50 |
| | | | | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,50 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 429 | 3 180 | 9,6 | 70,9 | CP | 3,70 |
| | | | Teren: nizinny falisty | PODR | BK | 10 | 34 | | 10 | II | 29,73 | 0,50 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | ///piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62g | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 5 | 26 | 11 | 12 | I | 30,94 | 0,92 | 1,0 | 12 | 49 | 45 | 4,3 | 3,9 | TW | 0,90 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 4 | 26 | 16 | 17 | I | 30,52 | | WKĘP | | 81 | 75 | 5,2 | 4,7 | | |
| | | | | | ŚW | 1 | 26 | 12 | 12 | I | 35,77 | | | | 5 | 5 | 1,1 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 125 | 10,6 | 9,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | SO | | 120 | 45 | 23 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trawy, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 62h | I | 2,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 28 | 13 | 13 | IA | 30,84 | 1,12 | 0,9 | 12 | 184 | 515 | 12,1 | 34,0 | TW | 2,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 28 | 9 | 9 | II | 26,15 | | KĘP | | 5 | 15 | 0,7 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | ŚW | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL.S | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 189 | 530 | 12,9 | 36,0 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,28 ha: SO 120 l., BRZ 70 l., | PRZES | SO | | 120 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l., | | BRZ | | 70 | 26 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| 62i | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 23 | 10 | 10 | I | 29,72 | 1,21 | 1,0 | 12 | 141 | 415 | 13,4 | 39,4 | TW | 2,93 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | MJS | 23 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL.S | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 415 | 13,4 | 39,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l., | PRZES | SO | | 120 | 34 | 25 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l., | | DB.S | | 120 | 45 | 19 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 42 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62j | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 48 | 24 | 21 | IA | 31,40 | 0,87 | 0,9 | 22 | 241 | 265 | 9,0 | 9,9 | TP | 1,10 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 90 | 45 | 26 | I | 27,36 | | KĘP | | 77 | 85 | 1,7 | 1,9 | | |
| | | | ZG | | ŚW | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 318 | 350 | 10,7 | 11,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 90 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62k | I | 0,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 10 | 17 | | 9 | I | 30,72 | 1,00 | 1,0 | 13 | | | | | CP | 0,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 62l | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 32 | 25 | II | 25,66 | 0,95 | 0,9 | 3 | 381 | 310 | 8,5 | 6,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 310 | 8,5 | 6,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62m | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 34 | 25 | II | 25,00 | 1,00 | 0,9 | 3 | 393 | 250 | 8,4 | 5,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 250 | 8,4 | 5,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62n | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 12 | | 4 | I | 27,17 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 12 | | 2 | III | 22,98 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | | | BK | 1 | 12 | | 2 | II | 27,76 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 110 | 65 | 23 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 62o | I | 0,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 10 | 25 | 13 | 13 | I | 29,57 | 1,03 | 0,9 | 13 | 141 | 60 | 10,3 | 4,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | JB | MJS | 25 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 60 | 10,3 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | GŁG | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | SO | | 70 | 28 | 18 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62~a | III | 0,38 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62~b | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 62** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **35,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 838** | | | | |
| | **I** | **34,92** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,48** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 710** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **128** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 838** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 838** | | | | |
| | **I** | **30,61** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,48** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 740** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **98** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 838** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **4,31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 000** | | | | |
| | **I** | **4,31** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **970** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **30** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63a | I | 8,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 26 | 23 | I | 29,32 | 0,93 | 0,9 | 11 | 360 | 3 230 | 10,7 | 95,7 | TP | 8,97 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | LP | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | SO | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 3 230 | 10,7 | 95,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, śmiałek | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE luka o pow. 0,05 ha | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 90 l., BRZ 90 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63b | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 52 | 24 | 23 | IA | 32,22 | 0,82 | 0,9 | 12 | 320 | 245 | 10,9 | 8,4 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 52 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 245 | 10,9 | 8,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy, poziomka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,14 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 63c | I | 1,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 52 | 24 | 21 | IA | 30,14 | 0,79 | 0,9 | 12 | 276 | 285 | 10,1 | 10,4 | TP | 1,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 276 | 285 | 10,1 | 10,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODR | BK | 10 | 15 | | 1 | V | 13,40 | 0,10 | | 11 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, poziomka, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63d | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 36 | 18 | 17 | IA | 31,65 | 0,87 | 0,9 | 12 | 229 | 165 | 11,6 | 8,3 | TP | 0,72 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 165 | 11,6 | 8,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, glistnik jaskółcze ziele, sałatnica leśna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63f | I | 1,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 53 | 26 | 24 | IA | 32,95 | 0,86 | 0,9 | 12 | 210 | 375 | 6,9 | 12,3 | TP | 1,79 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z | | OS | 1 | 53 | 24 | 23 | I | 30,15 | | WKĘP | | 33 | 60 | 1,1 | 1,9 | | |
| | | | TD: ZG | | BRZ | 1 | 53 | 24 | 23 | I | 29,30 | | | | 22 | 40 | 0,7 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | 2 | 70 | 36 | 26 | II | 29,85 | | | | 77 | 140 | 2,0 | 3,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | PJD | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //gytia wapienna //// | | WB | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 615 | 10,6 | 19,0 | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PODR | BK | 10 | 15 | | 2 | III | 22,00 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63g | I | 9,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 53 | 23 | 20 | I | 28,80 | 1,00 | 0,9 | 21 | 331 | 3 175 | 11,5 | 110,2 | TP | 9,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 32 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | SO | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 331 | 3 175 | 11,5 | 110,2 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 63h | I | 0,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 36 | 18 | 17 | IA | 31,65 | 0,87 | 0,9 | 11 | 229 | 105 | 11,6 | 5,2 | TP | 0,45 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | MJS | 53 | | | | | | --- | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | WZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | PJD | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 105 | 11,6 | 5,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63i | I | 0,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | 1,05 | 0,9 | 11 | 364 | 95 | 11,4 | 3,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 55 | 23 | 22 | I | 27,79 | | GRP | | 33 | 10 | 0,8 | 0,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 105 | 12,1 | 3,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, glistnik jaskółcze ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63j | I | 0,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 24 | 22 | IA | 30,32 | 1,04 | 0,9 | 11 | 386 | 155 | 12,2 | 4,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 155 | 12,2 | 4,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowy | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63k | IV | 0,18 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63l | IV | 0,03 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63m | IV | 0,14 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63n | IV | 0,09 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63~b | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 63** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **8 080** | | | | |
| | **I** | **23,98** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,35** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **8 080** | | | | |
| | **IV** | **0,44** | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **8 080** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64a | I | 0,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 58 | 26 | 24 | IA | 31,56 | 0,95 | 0,9 | 13 | 353 | 100 | 10,5 | 2,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | 1 | 58 | 27 | 23 | II | 28,89 | | DKĘP | | 33 | 10 | 1,1 | 0,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.B | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 110 | 11,6 | 3,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, płonnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Kapliczka Św. Huberta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64b | I | 0,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 45 | 20 | 19 | IA | 30,27 | 0,94 | 0,9 | 13 | 263 | 20 | 10,5 | 0,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 45 | 19 | 19 | I | 27,25 | | GRP | | 22 | | 0,8 | 0,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 285 | 20 | 11,3 | 0,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 64c | I | 10,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 78 | 31 | 27 | IA | 30,28 | 0,92 | 0,9 | 2 | 419 | 4 475 | 10,1 | 107,7 | TP | 10,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 78 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 4 475 | 10,1 | 107,7 | | |
| | | | POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina kamionka, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64d | I | 1,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 6 | | 2 | I | 29,73 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 7 | | 1 | I | 30,63 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WZ | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | PRZES | OL | | 89 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.S | | 89 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | 89 | 36 | 25 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 32 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: OL 89 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 64f | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 4 | | 1 | II | 26,75 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 1,08 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność | | GB | PJD | 5 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | z TD: ZG | PODSZ | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | OL | | 84 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: OL 84 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64g | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 110 | 36 | 24 | IV | 23,10 | 0,28 | 0,1 | 4 | 111 | 90 | 3,0 | 2,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; | | OL | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | luźny //// POROL | | JS | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 111 | 90 | 3,0 | 2,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, poziomka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,09 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 40 l., DB.S 40 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64h | IV | 0,19 | Rodzaj powierzchni: S | ZADRZEW | SO | | 45 | 25 | 19 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | MD | | 25 | 28 | 15 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 7 | | | | |
| 64i | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: BUD INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64j | IV | 1,48 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | OL | | 31 | 10 | 11 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | OL | | 85 | 32 | 22 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 13 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 64k | IV | 6,67 | Rodzaj powierzchni: R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64l | I | 0,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 31 | 16 | 16 | II | 28,31 | 1,28 | 1,0 | 12 | 251 | 50 | 14,4 | 2,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 50 | 14,4 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | OL | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf przejściowy //// | PRZES | OL | | 85 | 34 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, turzyca, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64m | IV | 1,30 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | BRZ | | 70 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 64n | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 50 | 28 | 24 | I | 29,77 | 0,98 | 1,0 | 12 | 427 | 550 | 13,5 | 17,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 427 | 550 | 13,5 | 17,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,29 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 64o | I | 0,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 25 | 15 | 15 | I | 29,52 | 1,00 | 1,0 | 12 | 173 | 170 | 12,6 | 12,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 173 | 170 | 12,6 | 12,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | PRZES | DB.S | | 90 | 36 | 20 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64p | I | 0,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 8 | | 2 | II | 24,80 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64r | IV | 0,66 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 90 | 24 | 23 | | | | | 4 | | 50 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 90 | 27 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 60 | 17 | 17 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 15 | 15 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | OL | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64s | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Służebność przejazdu 0,0158 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64t | II | 0,09 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA<br>TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Teren: nizinny równy, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///<br>Pokrywa: zadarniona<br>Gosp.: Z<br>Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64~a | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 619** | | | | |
| | **I** | **17,20** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,09** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 465** | | | | |
| | **III** | **0,47** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **63** | | | | |
| | **IV** | **10,30** | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 528** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **91** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65a | I | 0,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 10 | 35 | 18 | 17 | I | 28,80 | 1,20 | 0,9 | 12 | 240 | 140 | 10,9 | 6,4 | TP | 0,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG | | OL | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 140 | 10,9 | 6,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 65b | I | 12,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 29 | 26 | I | 29,83 | 1,09 | 0,9 | 3 | 397 | 4 990 | 9,2 | 115,3 | TP | 12,57 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 100 | 34 | 30 | I | 30,00 | | WKĘP | 2 | 91 | 1 145 | 2,0 | 25,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 488 | 6 135 | 11,2 | 140,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy, rokiet | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65c | I | 2,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 53 | 23 | 21 | I | 29,85 | 1,04 | 0,9 | 11 | 243 | 630 | 8,5 | 22,1 | TP | 2,60 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | | WKĘP | | 99 | 255 | 2,1 | 5,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 110 | 39 | 26 | II | 24,80 | | | | 44 | 115 | 0,8 | 2,1 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL | | DB.B | MJS | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 1 000 | 11,4 | 29,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek, pszeniec | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 65d | I | 0,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 6 | 40 | 19 | 18 | I | 27,86 | 0,96 | 0,9 | 12 | 131 | 65 | 5,2 | 2,7 | TP | 0,51 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 40 | 22 | 19 | IA | 32,18 | | GRP | | 109 | 55 | 5,0 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 120 | 10,2 | 5,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65f | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 22 | 16 | 15 | I | 30,65 | 1,19 | 0,9 | 12 | 152 | 185 | 10,9 | 13,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 3 | 35 | 18 | 19 | I | 29,28 | | WKĘP | | 87 | 105 | 4,5 | 5,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WZ | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | WB | PJD | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | ŚW | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 239 | 290 | 15,4 | 18,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | OL | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, sit, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65g | I | 3,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 28 | 26 | IA | 31,22 | 1,11 | 0,9 | 11 | 491 | 1 695 | 12,4 | 42,8 | TP | 3,45 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 491 | 1 695 | 12,4 | 42,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 65h | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 85 | 29 | 22 | III | 23,63 | 1,04 | 0,9 | 3 | 176 | 255 | 3,7 | 5,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; | | BRZ | 3 | 85 | 35 | 24 | II | 25,28 | | DKĘP | 3 | 94 | 135 | 1,3 | 1,9 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 55 | 22 | 21 | II | 26,81 | | | 4 | 47 | 70 | 2,3 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 35 | 16 | 16 | II | 27,22 | | | 4 | 23 | 35 | 1,1 | 1,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 340 | 495 | 8,4 | 12,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | PODSZ | OL | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65~a | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65~b | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 875** | | | | |
| | **I** | **22,38** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 875** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 875** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66a | I | 1,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 58 | 27 | 24 | IA | 31,56 | 1,04 | 0,9 | 12 | 309 | 510 | 8,7 | 14,4 | TP | 1,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 70 | 35 | 27 | IA | 31,79 | | KĘP | | 88 | 145 | 2,4 | 3,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 70 | 33 | 26 | I | 29,12 | | | | 33 | 55 | 0,6 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | DB.B | PJD | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | OS | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | PJD | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 430 | 710 | 11,7 | 19,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODR | BK | 9 | 27 | | 5 | III | 22,63 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | ŚW | 1 | 27 | | 5 | III | 24,99 | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66b | I | 3,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 72 | 33 | 27 | IA | 31,39 | 0,91 | 0,9 | 2 | 419 | 1 465 | 10,6 | 37,0 | TP | 3,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 72 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 1 465 | 10,6 | 37,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 9 | 25 | | 6 | II | 27,84 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy | | ŚW | 1 | 25 | | 5 | III | 26,45 | | | | | | | | | |
| | | | //// POROL | | DB | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 66c | I | 0,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 67 | 25 | 22 | I | 27,41 | 1,04 | 0,9 | 11 | 382 | 360 | 10,9 | 10,2 | TP | 0,94 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 67 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 360 | 10,9 | 10,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66d | II | 3,20 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | ODN-ZRB | 3,20 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | PRZES | SO | | 105 | 31 | 26 | | | | | 3 | | 65 | | | PIEL | 3,20 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | | 105 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | | 85 | 24 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 80 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB.B 85 l., DB.B 105 l., SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66f | I | 1,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 24 | 21 | I | 28,75 | 1,00 | 0,9 | 11 | 353 | 520 | 11,3 | 16,8 | TP | 1,48 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 520 | 11,3 | 16,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 66g | I | 1,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 19 | 8 | 8 | I | 29,43 | 1,00 | 1,0 | 11 | 55 | 80 | 6,7 | 9,7 | TW | 1,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 19 | | 7 | II | 29,04 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 55 | 80 | 6,7 | 9,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 120 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66h | I | 3,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 30 | 25 | II | 25,66 | 1,07 | 0,9 | 3 | 426 | 1 695 | 9,2 | 36,7 | IB (95%) | 3,98 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,98 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 3,98 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 426 | 1 695 | 9,2 | 36,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 50 l., SO 50 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66i | I | 2,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 19 | 7 | 7 | I | 27,40 | 1,00 | 1,0 | 11 | 55 | 120 | 6,2 | 13,8 | TW | 2,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 19 | | 7 | II | 29,04 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 55 | 120 | 6,2 | 13,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 120 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 66j | I | 3,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 95 | 35 | 27 | I | 27,66 | 1,25 | 0,9 | 3 | 393 | 1 375 | 7,6 | 26,5 | IIB (60%) | 3,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 95 | 35 | 25 | III | 25,61 | | GRP | 3 | 146 | 510 | 3,8 | 13,4 | AGROT | 1,74 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 539 | 1 885 | 11,4 | 40,0 | ODN-ZŁOŻ | 1,74 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66k | I | 2,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 80 | 31 | 28 | IA | 30,92 | 1,14 | 0,9 | 2 | 340 | 960 | 7,1 | 20,0 | TP | 2,82 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 120 | 38 | 28 | II | 25,76 | | WKĘP | 2 | 91 | 255 | 1,7 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 2 | 120 | 47 | 25 | III | 22,82 | | | 2 | 91 | 255 | 2,1 | 5,8 | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | STOPN | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //// | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 522 | 1 470 | 10,8 | 30,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODR | BK | 10 | 25 | | 5 | III | 24,49 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt. | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66l | IV | 0,46 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 100 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 90 | 28 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | DB.B | | 140 | 90 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 110 | 31 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 140 | 48 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 45 | 14 | 17 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | DB.B | | 45 | 18 | 15 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 45 | 18 | 14 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 51 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66~a | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66~b | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 66** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 516** | | | | | | |
| | **I** | **21,53** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **II** | **3,20** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 305** | | | | | | |
| | **III** | **0,30** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **80** | | | | | | |
| | **IV** | **0,46** | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **80** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 465** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **51** | | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67a | I | 2,27 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Teren: nizinny falisty, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////<br>Pokrywa: zadarniona<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu<br>Gosp.: Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.<br>Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita<br>PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 85 l., ŚW 100 l., DB.B 100 l., DB.B 120 l., | DRZEW | SO | 6 | 35 | 18 | 19 | IA | 34,46 | 0,93 | 0,9 | 11 | 153 | 345 | 7,9 | 17,9 | TP | 2,27 |
| | | | | | BRZ | 2 | 35 | 17 | 18 | I | 29,99 | | DKĘP | | 55 | 125 | 1,9 | 4,2 | | |
| | | | | | MD | 1 | 35 | 24 | 21 | I | 35,44 | | | | 33 | 75 | 1,2 | 2,8 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 29 | 16 | 16 | I | 30,85 | | | | 11 | 25 | 1,0 | 2,2 | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 252 | 570 | 11,9 | 27,1 | | |
| | | | | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.B | | 120 | 54 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | DB.B | | 100 | 35 | 18 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 85 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 100 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 67b | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 26 | 13 | 13 | IA | 32,14 | 1,30 | 1,0 | 11 | 162 | 205 | 12,5 | 15,6 | TW | 1,25 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 26 | 13 | 12 | I | 30,94 | | WKĘP | | 38 | 50 | 2,2 | 2,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 200 | 255 | 14,7 | 18,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | DB.S | | 150 | 60 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | SO | | 130 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l., | | DB.S | | 75 | 23 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 150 l., DB.S 75 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| 67c | I | 1,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 9 | | 4 | IA | 32,33 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,19 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.S | 3 | 19 | | 7 | II | 29,04 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | DB.S | | 129 | 62 | 26 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowy | | DB.S | | 60 | 24 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | //piasek luźny //// POROL | | SO | | 130 | 45 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 129 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 67d | I | 5,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 39 | 20 | 19 | IA | 32,60 | 1,28 | 1,0 | 11 | 349 | 2 025 | 14,1 | 82,0 | TP | 5,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 29 | 14 | 14 | I | 28,24 | | KĘP | | 22 | 130 | 1,2 | 6,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL.S | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.C | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 2 155 | 15,3 | 88,7 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | PRZES | DB.B | | 80 | 32 | 18 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 80 | 29 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | DB.B | | 110 | 60 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| 67f | I | 5,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 34 | 16 | 16 | IA | 31,41 | 0,94 | 0,9 | 11 | 229 | 1 265 | 12,2 | 67,3 | TW | 5,53 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 34 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 1 265 | 12,2 | 67,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67g | I | 2,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 30 | 18 | 15 | IA | 32,31 | 1,15 | 0,9 | 11 | 217 | 625 | 11,5 | 33,4 | TW | 2,89 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 75 | 22 | 19 | III | 22,85 | | WKĘP | | 43 | 125 | 2,1 | 6,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 260 | 750 | 13,7 | 39,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.B | | 120 | 40 | 23 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 150 | 39 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67h | I | 3,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 23 | 14 | 11 | IA | 31,33 | 1,09 | 1,0 | 11 | 108 | 340 | 10,5 | 33,3 | TW | 3,16 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 23 | 11 | 10 | I | 30,42 | | WKĘP | | 22 | 70 | 1,7 | 5,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 130 | 410 | 12,3 | 38,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 150 | 40 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.B | | 150 | 45 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | 75 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 85 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 75 l., DB.B 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,49 ha: SO 150 l., SO 35 l., DB.B 53 l., ŚW 53 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SO 53 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67i | I | 2,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 24 | 23 | I | 28,86 | 0,98 | 0,9 | 11 | 382 | 905 | 10,9 | 25,8 | TP | 2,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 905 | 10,9 | 25,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | ŚW | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67~a | III | 0,55 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67~b | III | 0,25 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 67** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **6 555** | | | | |
| | **I** | **24,46** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,80** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **6 310** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | | **245** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **6 555** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68a | I | 3,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 46 | 22 | 20 | IA | 31,00 | 0,94 | 0,9 | 12 | 273 | 1 025 | 10,7 | 40,0 | TP | 3,75 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 30 | 14 | 14 | IA | 31,01 | | DKĘP | | 22 | 85 | 1,2 | 4,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //// | | DB.B | PJD | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | PJD | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 1 110 | 11,9 | 44,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68b | I | 3,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 46 | 22 | 20 | IA | 31,00 | 0,93 | 0,9 | 12 | 306 | 1 060 | 11,8 | 40,7 | TP | 3,46 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 46 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | PJD | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ////piasek luźny //// | | OL | PJD | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 1 060 | 11,8 | 40,7 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 68c | I | 6,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 38 | 19 | 18 | IA | 31,91 | 1,10 | 0,9 | 12 | 240 | 1 540 | 11,1 | 70,9 | TP | 6,41 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 38 | 20 | 19 | I | 29,80 | | WKĘP | | 33 | 210 | 1,0 | 6,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 48 | 22 | 21 | I | 28,52 | | | | 33 | 210 | 0,9 | 5,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.C | PJD | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL.S | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.B | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.B | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | BRZ | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 1 960 | 13,0 | 83,1 | | |
| | | | | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68d | I | 3,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 22 | 11 | 11 | IA | 32,12 | 1,00 | 1,0 | 21 | 76 | 245 | 7,6 | 24,4 | TW | 3,22 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 22 | 8 | 8 | II | 28,36 | | WKĘP | | 16 | 50 | 2,0 | 6,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 22 | | 5 | II | 27,85 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 92 | 295 | 9,6 | 30,9 | | |
| | | | | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PRZES | SO | | 140 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 90 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 90 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 68f | I | 3,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 15 | | 7 | I | 32,84 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 2,64 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | | | | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,64 |
| | | | TD: ZG | PRZES | SO | | 140 | 40 | 28 | | | | | 2 | | 75 | | | CP | 1,10 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | | 75 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,19 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68g | I | 1,20 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | ŚW | 4 | 100 | 35 | 29 | II | 29,00 | 0,70 | 0,7 | 3 | 180 | 215 | 3,4 | 4,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 100 | 34 | 26 | II | 26,00 | | GRP | 3 | 67 | 80 | 1,3 | 1,6 | | |
| | | | CZ ZG | | OL | 2 | 40 | 17 | 18 | II | 27,44 | | | 4 | 34 | 40 | 1,7 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 2 | 55 | 22 | 19 | III | 25,28 | | | 4 | 34 | 40 | 1,5 | 1,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KSZ | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | JS | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | LP | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | ŚW | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 315 | 375 | 8,0 | 9,6 | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt. | PRZES | LP | | 230 | 141 | 23 | | | | | 3 | | 9 | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | Razem: | | | 9 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 68h | I | 0,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 28 | 25 | IA | 30,87 | 1,13 | 0,9 | 11 | 480 | 455 | 12,6 | 12,0 | TP | 0,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 480 | 455 | 12,6 | 12,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68i | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 28 | IA | 30,92 | 1,16 | 0,9 | 2 | 544 | 505 | 12,0 | 11,1 | TP | 0,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 505 | 12,0 | 11,1 | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 32 | | 7 | III | 24,32 | 0,80 | | 11 | | | | | STOPN | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68j | I | 3,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 3,62 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 7 | | 2 | I | 31,35 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 7 | | 2 | I | 47,27 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JW | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 140 | 39 | 29 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68~a | III | 0,37 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68~b | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 994** | | | | |
| | **I** | **27,28** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,64** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 760** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **234** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 994** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69a | I | 5,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 37 | 20 | 19 | IA | 33,50 | 0,96 | 0,9 | 12 | 294 | 1 745 | 13,1 | 77,6 | TP | 5,94 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 37 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JS | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// | | CZM | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 1 745 | 13,1 | 77,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69b | I | 5,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 33 | 17 | 17 | IA | 33,14 | 0,87 | 0,9 | 11 | 174 | 895 | 9,7 | 49,8 | TW | 5,15 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 33 | 18 | 18 | I | 31,00 | | KĘP | | 22 | 115 | 0,9 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 33 | 12 | 12 | II | 27,36 | | | | 11 | 55 | 0,8 | 3,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 1 065 | 11,3 | 58,4 | | |
| | | | | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69c | I | 2,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 26 | 13 | 12 | IA | 30,70 | 1,11 | 0,9 | 11 | 162 | 330 | 11,9 | 24,4 | TW | 2,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 26 | 9 | 9 | II | 27,25 | | DKĘP | | 5 | 10 | 0,8 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | SO | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB.B | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 167 | 340 | 12,7 | 26,0 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | PRZES | SO | | 140 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69d | I | 2,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 11 | 10 | IA | 31,31 | 1,02 | 1,0 | 11 | 108 | 225 | 9,9 | 20,6 | TW | 2,08 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 21 | 8 | 8 | II | 29,07 | | WKĘP | | 5 | 10 | 1,4 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 113 | 235 | 11,3 | 23,5 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | MD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | SO | | 140 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB.S | | 120 | 61 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69f | I | 1,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 27 | 26 | IA | 31,87 | 0,90 | 0,9 | 21 | 360 | 560 | 9,9 | 15,3 | TP | 1,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 65 | 30 | 26 | I | 29,92 | | GRP | | 33 | 50 | 0,6 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 610 | 10,5 | 16,2 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODR | BK | 8 | 28 | | 6 | III | 24,86 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | 2 | 28 | | 6 | III | 26,49 | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69g | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 42 | 20 | 19 | IA | 31,38 | 1,01 | 0,9 | 11 | 284 | 245 | 11,5 | 9,9 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 42 | 19 | 19 | I | 28,25 | | KĘP | | 22 | 20 | 0,9 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 265 | 12,4 | 10,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69h | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BK | 4 | 33 | 11 | 11 | I | 32,76 | 0,66 | 0,5 | 12 | 22 | 20 | 3,0 | 2,6 | TW | 0,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ | | BRZ | 3 | 33 | 17 | 17 | I | 29,79 | | KĘP | | 44 | 40 | 2,2 | 1,9 | | |
| | | | ZG | | DB.S | 3 | 33 | 14 | 13 | II | 28,45 | | | | 22 | 20 | 2,0 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.C | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 88 | 80 | 7,2 | 6,2 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | DB.B | | 90 | 30 | 17 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | BRZ | | 90 | 29 | 18 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | DB.B | | 120 | 60 | 18 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 13 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 69i | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 3 | 80 | 35 | 26 | I | 28,94 | 0,78 | 0,9 | 3 | 113 | 120 | 2,6 | 2,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | ŚW | 2 | 80 | 36 | 29 | I | 32,59 | | DKĘP | 3 | 91 | 100 | 2,3 | 2,4 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 80 | 35 | 27 | I | 28,82 | | | 3 | 34 | 35 | 0,4 | 0,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 2 | 42 | 15 | 18 | II | 27,01 | | | 4 | 34 | 35 | 1,8 | 2,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | 1 | 42 | 16 | 20 | I | 35,20 | | | 4 | 23 | 25 | 1,2 | 1,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | 1 | 52 | 22 | 21 | IA | 30,14 | | | 4 | 34 | 35 | 1,0 | 1,1 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | MD | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OL | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna | | OL | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 350 | 9,3 | 10,0 | | |
| | | | | PODSZ | WB | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69j | I | 4,34 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 6 | 20 | | 6 | II | 26,52 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 3,15 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 20 | | 2 | V | 16,09 | | DKĘP | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 3,15 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 15 | | 3 | III | 23,62 | | | | | | | | CP | 1,19 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 110 | 38 | 28 | | | | | 3 | | 55 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.B | | 80 | 27 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: DB.B 80 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 69k | I | 3,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 110 | 38 | 28 | I | 26,81 | 0,78 | 0,7 | 3 | 255 | 790 | 5,5 | 17,1 | IIIAU (90%) | 3,10 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 80 | 27 | 22 | III | 24,86 | | GRP | 4 | 35 | 110 | 0,9 | 2,8 | AGROT | 2,10 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 60 | 20 | 19 | II | 25,85 | | | 4 | 23 | 70 | 0,9 | 2,7 | ODN-ZŁOŻ | 2,10 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | PJD | 110 | | | | | | | | | | | | CP | 1,00 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA | | LP | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 970 | 7,3 | 22,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODR | DB.S | 6 | 20 | | 6 | II | 26,52 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | 1 | 20 | | 2 | V | 16,09 | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | 3 | 15 | | 3 | III | 23,62 | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | PODSZ | DB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1 ha: DB.S 15 l., BK 20 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DB.S 20 l., | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,17 ha: DB.B 33 l., BRZ 33 l., AK 33 l., SO 33 l., | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69~a | III | 0,49 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 69** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 818** | | | | |
| | **I** | **27,01** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,75** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 660** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **158** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 818** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70a | I | 5,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 45 | 21 | 19 | IA | 30,27 | 1,27 | 0,9 | 11 | 328 | 1 685 | 11,6 | 59,7 | TP | 5,14 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | | WKĘP | | 33 | 170 | 3,0 | 15,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 361 | 1 855 | 14,6 | 75,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 140 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70b | I | 11,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 29 | 26 | IA | 31,87 | 0,96 | 0,9 | 12 | 327 | 3 855 | 9,2 | 108,3 | TP | 11,79 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 2 | 65 | 33 | 27 | I | 32,76 | | DKĘP | | 87 | 1 025 | 2,2 | 25,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | PJD | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 4 880 | 11,4 | 134,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 8 | 26 | | 5 | III | 23,53 | 0,20 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | 2 | 26 | | 5 | III | 25,71 | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70c | I | 5,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 50 | 22 | 20 | I | 29,69 | 1,06 | 0,9 | 11 | 350 | 1 770 | 12,4 | 62,5 | TP | 5,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | MD | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 1 770 | 12,4 | 62,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 70d | I | 1,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 33 | 16 | 16 | IA | 31,92 | 0,98 | 0,9 | 11 | 207 | 280 | 11,5 | 15,5 | TW | 1,35 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | MD | 1 | 33 | 22 | 20 | I | 35,35 | | DKĘP | | 33 | 45 | 1,3 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | PJD | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 240 | 325 | 12,7 | 17,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70f | I | 1,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 9 | 33 | 19 | 19 | I | 32,19 | 0,80 | 0,9 | 12 | 164 | 185 | 8,0 | 9,0 | TW | 1,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG | | SO | 1 | 33 | 16 | 16 | IA | 31,92 | | KĘP | | 22 | 25 | 1,1 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | | OL | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 186 | 210 | 9,1 | 10,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 70g | I | 0,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 60 | 30 | 27 | IA | 34,06 | 0,90 | 0,9 | 12 | 287 | 165 | 8,2 | 4,7 | TP | 0,57 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | 1 | 60 | 28 | 27 | I | 35,19 | | DKĘP | | 44 | 25 | 1,4 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 2 | 85 | 33 | 26 | I | 27,29 | | | | 77 | 45 | 0,8 | 0,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | WB | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 235 | 10,4 | 6,0 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, rokiet | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70h | IV | 0,03 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70i | IV | 0,09 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70~a | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70~b | III | 0,43 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 26 | 7 | 7 | | | | | 4 | | 12 | | | | |
| | | | | | SO | | 65 | 24 | 23 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 72 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 367** | | | | |
| | **I** | **25,03** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,61** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 275** | | | | |
| | **IV** | **0,12** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 295** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **72** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) | | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) | | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71a | I | 1,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 1,17 | 0,9 | 2 | 533 | 955 | 12,3 | 22,1 | TP | 1,79 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 533 | 955 | 12,3 | 22,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | PODR | BK | 10 | 34 | | 6 | IV | 20,40 | 0,50 | | 11 | | | | | | |
| | | | //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71b | I | 4,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 36 | 27 | I | 29,12 | 1,10 | 0,9 | 3 | 493 | 2 045 | 10,8 | 44,7 | TP | 4,15 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | ŚW | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | STOPN | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 2 045 | 10,8 | 44,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | PODR | BK | 10 | 34 | | 6 | IV | 20,40 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 71c | I | 14,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 62 | 26 | 25 | IA | 31,57 | 1,07 | 0,9 | 22 | 382 | 5 705 | 10,0 | 149,4 | TP | 14,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 62 | 22 | 24 | I | 28,42 | | GRP | | 33 | 495 | 0,7 | 10,5 | CP | 0,23 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 62 | 24 | 21 | II | 27,25 | | | | 22 | 330 | 1,2 | 17,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | MD | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 437 | 6 530 | 11,9 | 177,7 | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODR | BK | 8 | 26 | | 5 | III | 23,53 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | 2 | 26 | | 5 | III | 25,71 | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | MD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, nerecznica, trawy | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,22 ha: SO 33 l., | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 33 l., SO 33 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,23 ha: DB.S 12 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,44 ha: ŚW 31 l., BRZ 31 l., SO 31 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S luka o pow. 0,23 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71d | I | 2,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 30 | 27 | IA | 30,82 | 1,21 | 0,9 | 2 | 499 | 1 215 | 11,4 | 27,7 | TP | 2,43 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 75 | 27 | 25 | I | 27,42 | | KĘP | 3 | 40 | 95 | 0,6 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 539 | 1 310 | 12,0 | 29,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 71f | I | 2,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 36 | 18 | 17 | IA | 31,65 | 1,14 | 0,9 | 12 | 262 | 615 | 12,7 | 29,8 | TP | 2,35 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 36 | 18 | 18 | I | 29,52 | | PAS | | 33 | 80 | 1,1 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | DB.B | PJD | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 295 | 695 | 13,8 | 32,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71g | IV | 0,32 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71~a | III | 0,32 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71~b | III | 0,37 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 33 | 11 | 12 | | | | | 4 | | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 71** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,66** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 585** | | | | |
| | **I** | **25,65** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,69** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 535** | | | | |
| | **IV** | **0,32** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 535** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **50** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72a | I | 2,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | 0,91 | 1,0 | 11 | 130 | 325 | 9,3 | 23,3 | TW | 2,50 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 25 | 8 | 9 | II | 27,84 | | WKĘP | | 5 | 15 | 1,3 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | | MD | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | //// | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 340 | 10,7 | 26,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | DB.S | | 115 | 33 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | 115 | 37 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy | | DB.S | | 75 | 22 | 21 | | | | | 4 | | 30 | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,32 ha: DB.S 75 l., SO 115 l., DB.S 115 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| 72b | I | 3,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 29 | 25 | IA | 31,10 | 0,97 | 0,9 | 22 | 414 | 1 470 | 11,4 | 40,6 | TP | 3,55 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 104 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 1 470 | 11,4 | 40,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny | PODR | BK | 10 | 26 | | 6 | II | 26,77 | 0,50 | | 12 | | | | | | |
| | | | //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 72c | I | 3,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 19 | 8 | 9 | IA | 31,34 | 1,00 | 1,0 | 13 | 35 | 105 | 7,2 | 21,7 | TW | 3,01 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 19 | | 6 | II | 27,30 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 19 | | 6 | I | 36,36 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | Razem: | | | | | | | | | | 35 | 105 | 7,2 | 21,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 125 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 70 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | 90 | 23 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna | | ŚW | | 6 | 18 | 16 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l., | | Razem: | | | | | | | | | | | 90 | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 90 l., SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72d | I | 3,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 9 | | 3 | I | 28,15 | 1,00 | 0,9 | 12 | | | | | CP | 3,45 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 12 | | 2 | III | 22,98 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 6 | | 1 | II | 26,80 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | LP | PJD | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | PJD | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | WZ.S | PJD | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ | | MD | MJS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | ŚW | | 59 | 21 | 19 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | OL | | 49 | 19 | 20 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | 100 | 48 | 28 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, nerecznica | | DB.S | | 59 | 21 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: ŚW 59 l., | | Razem: | | | | | | | | | | | 41 | | | | |
| | | | w części E kępa o pow. 0,2 ha: OL 49 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,09 ha: OL 20 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 72f | I | 1,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 34 | 26 | I | 27,36 | 0,78 | 0,3 | 3 | 329 | 415 | 7,8 | 9,9 | IIIA (30%) | 1,26 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,37 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,37 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 329 | 415 | 7,8 | 9,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72g | I | 1,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 32 | 26 | I | 28,94 | 0,97 | 0,9 | 2 | 419 | 660 | 10,1 | 15,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty //piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 660 | 10,1 | 15,8 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 72h | I | 3,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 30 | 14 | 15 | IA | 32,31 | 0,81 | 0,9 | 12 | 119 | 455 | 7,8 | 30,0 | TW | 3,83 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 30 | 13 | 15 | I | 31,95 | | WKĘP | | 11 | 40 | 0,9 | 3,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 30 | 14 | 15 | I | 28,95 | | | | 11 | 40 | 0,8 | 3,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | 1 | 30 | 12 | 12 | I | 33,59 | | | | 16 | 60 | 1,1 | 4,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 157 | 595 | 10,6 | 40,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | DB.B | | 125 | 51 | 26 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | SO | | 125 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,26 ha: BK 90 l., BRZ 90 l., DB.B 125 l., | | BRZ | | 95 | 28 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | SO 125 l., | | BK | | 90 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,26 ha: DB.B 125 l., SO 125 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 72 | | | | |
| 72i | I | 3,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 24 | 11 | 12 | IA | 32,11 | 0,82 | 1,0 | 12 | 92 | 315 | 7,7 | 26,3 | TW | 3,41 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 24 | 9 | 10 | I | 29,77 | | WKĘP | | 11 | 40 | 1,4 | 4,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 24 | 12 | 13 | I | 30,35 | | | | 11 | 40 | 0,9 | 3,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny /// | | BK | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 114 | 395 | 10,0 | 34,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 125 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72j | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 31 | 25 | I | 26,37 | 1,07 | 0,9 | 3 | 434 | 430 | 9,7 | 9,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 430 | 9,7 | 9,6 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 72k | I | 0,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 8 | 80 | 27 | 20 | III | 21,28 | 0,92 | 1,0 | 3 | 159 | 70 | 3,4 | 1,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | 2 | 55 | 15 | 16 | IV | 19,42 | | KĘP | 4 | 34 | 15 | 1,2 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 193 | 85 | 4,6 | 2,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72l | I | 0,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 29 | 25 | I | 26,37 | 1,07 | 0,9 | 3 | 434 | 160 | 9,7 | 3,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 30 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 160 | 9,7 | 3,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72m | I | 0,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 90 | 30 | 24 | II | 25,37 | 1,08 | 0,9 | 3 | 223 | 140 | 5,7 | 3,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 4 | 60 | 19 | 18 | III | 21,04 | | WKĘP | 4 | 94 | 60 | 2,6 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 317 | 200 | 8,3 | 5,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 72n | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 15 | | 5 | I | 26,52 | 1,00 | 1,0 | 12 | | | | | CP | 0,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.S | 2 | 15 | | 2 | IV | 19,69 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | OL | 1 | 15 | | 10 | I | 30,38 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 15 | | 8 | I | 31,38 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | OL | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,07 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72o | IV | 0,05 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72p | IV | 0,22 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72~a | III | 0,06 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72~b | III | 0,19 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 72** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 143** | | | | |
| | **I** | **25,72** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,25** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 855** | | | | |
| | **IV** | **0,27** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **288** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 143** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 268** | | | | |
| | **I** | **22,58** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,25** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 980** | | | | |
| | **IV** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **288** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 268** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **3,19** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **875** | | | | | |
| | **I** | **3,14** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **IV** | **0,05** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **875** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **875** | | | | | |
| | | Województwo: LUBUSKIE (08) | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | |
| | | Powiat: Międzyrzecki (03) | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73a | I | 1,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 85 | 33 | 24 | III | 25,46 | 0,83 | 0,7 | 3 | 188 | 270 | 4,3 | 6,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 85 | 29 | 24 | II | 25,28 | | KĘP | 3 | 29 | 40 | 0,4 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 85 | 38 | 26 | I | 28,12 | | | 3 | 35 | 50 | 0,9 | 1,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | 3 | 45 | 24 | 20 | II | 27,82 | | | 4 | 70 | 100 | 3,1 | 4,5 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | JW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE | | | | | | | | | | Razem: | | 322 | 460 | 8,6 | 12,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trawy, podagrycznik pospolity | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW bagno o pow. 0,07 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E bagno o pow. 0,12 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73b | I | 0,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 80 | 33 | 25 | I | 27,95 | 0,64 | 0,7 | 4 | 170 | 85 | 4,4 | 2,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 4 | 80 | 29 | 25 | I | 26,82 | | KĘP | 4 | 79 | 40 | 1,4 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 249 | 125 | 5,7 | 2,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty //// POROL | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 73c | I | 1,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 28 | 13 | 13 | IA | 30,84 | 1,17 | 1,0 | 12 | 162 | 275 | 11,1 | 19,0 | TW | 1,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 28 | 10 | 11 | II | 28,65 | | KĘP | | 22 | 40 | 1,8 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 184 | 315 | 13,0 | 22,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73d | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 85 | 33 | 26 | II | 27,28 | 0,89 | 0,9 | 3 | 458 | 1 045 | 10,1 | 23,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 1 045 | 10,1 | 23,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,28 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, przytulia, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 73f | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 85 | 37 | 26 | II | 27,28 | 1,00 | 0,9 | 3 | 458 | 880 | 10,0 | 19,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 85 | 41 | 27 | II | 28,85 | | WKĘP | 3 | 47 | 90 | 1,2 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 505 | 970 | 11,2 | 21,5 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,92 ha | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | PRZ.CW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: podagrycznik pospolity, przytulia, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73g | IV | 0,14 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 100 | 40 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73h | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 34 | 26 | I | 26,66 | 1,05 | 0,9 | 3 | 438 | 1 285 | 9,3 | 27,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 1 285 | 9,3 | 27,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E remiza o pow. 0,24 ha: BEZ.C 20 l., CZM 20 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 73i | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 62 | 24 | 22 | I | 28,54 | 0,92 | 0,9 | 23 | 218 | 175 | 6,3 | 5,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 75 | 33 | 24 | I | 27,84 | | WKĘP | | 131 | 105 | 3,9 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 349 | 280 | 10,1 | 8,2 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73j | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73k | IV | 0,02 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73l | I | 0,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 28 | 23 | I | 27,80 | 0,93 | 0,9 | 23 | 360 | 145 | 10,0 | 4,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 30 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 145 | 10,0 | 4,0 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | GŁG | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73~a | III | 0,22 | Rodzaj powierzchni: URZ WOD | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 73** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 630** | | | | | |
| | **I** | **12,00** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 625** | | | | | |
| | **IV** | **0,17** | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 625** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **5** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **0,42** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **145** | | | | | |
| | **I** | **0,40** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **IV** | **0,02** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **145** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **145** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,97** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 485** | | | | | |
| | **I** | **11,60** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 480** | | | | | |
| | **IV** | **0,15** | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 480** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **5** | | | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74a | I | 0,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | ŚW | 7 | 56 | 24 | 23 | I | 33,15 | 0,31 | 0,2 | 34 | 110 | 100 | 4,0 | 3,7 | AGROT | 0,91 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | OL | 3 | 56 | 24 | 22 | II | 27,40 | | DKĘP | | 33 | 30 | 1,4 | 1,3 | ODN-IIP | 0,91 |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | PJD | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | PJD | 56 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | STOPN | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //// | | | | | | | | | | Razem: | | 143 | 130 | 5,4 | 4,9 | | |
| | | | POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - OWADY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 74b | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 34 | 26 | II | 28,74 | 0,91 | 0,9 | 3 | 469 | 585 | 11,6 | 14,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JS | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /pył zwykły //piasek luźny //// POROL | | OL | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 469 | 585 | 11,6 | 14,4 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, orlik pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74c | I | 0,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 33 | 25 | II | 27,92 | 0,81 | 0,9 | 3 | 392 | 120 | 10,1 | 3,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 120 | 10,1 | 3,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /pył zwykły //piasek luźny //// POROL | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, orlik pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 74d | I | 12,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Kat. ochr.: wodochronne<br>Teren: nizinny falisty, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////<br>POROL<br>Pokrywa: zadarniona<br>Budowa pionowa: klasa odnowienia<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych<br>Gosp.: P-Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.<br>Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.<br>Runo: malina właściwa, nerecznica | DRZEW | SO | 10 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,94 | 0,9 | 3 | 428 | 5 400 | 10,5 | 132,8 | IIA (50%) | 12,62 |
| | | | | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 428 | 5 400 | 10,5 | 132,8 | | |
| | | | | PODR | BK | 7 | 35 | 7 | 9 | II | 26,78 | 0,60 | | 21 | 12 | 150 | 4,0 | 51,0 | | |
| | | | | | BK | 3 | 25 | | 6 | II | 27,84 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 12 | 150 | 4,0 | 51,0 | | |
| | | | | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74f | I | 0,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Kat. ochr.: wodochronne<br>Teren: nizinny falisty, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////<br>Pokrywa: zadarniona<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu<br>Gosp.: P-Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.<br>Runo: śmiałek pogięty, rokiet | DRZEW | SO | 10 | 57 | 26 | 24 | IA | 31,83 | 0,84 | 0,9 | 12 | 342 | 255 | 10,8 | 8,0 | TP | 0,74 |
| | | | | | AK | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 255 | 10,8 | 8,0 | | |
| | | | | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 74** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **15,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 640** | | | | |
| | **I** | **15,82** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 640** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75a | I | 1,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 85 | 36 | 27 | II | 28,19 | 1,02 | 0,9 | 3 | 564 | 1 060 | 11,8 | 22,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mułowo-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | słabogliniasty //// POROL | | AK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 564 | 1 060 | 11,8 | 22,2 | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,88 ha | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, wiechlina, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75b | I | 0,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 10 | 57 | 27 | 23 | I | 26,86 | 0,83 | 0,6 | 4 | 232 | 105 | 6,3 | 2,9 | TP | 0,46 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | OL | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 232 | 105 | 6,3 | 2,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, orlica pospolita, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 75c | I | 7,33 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | 0,92 | 0,9 | 21 | 375 | 2 750 | 11,2 | 81,9 | TP | 7,33 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 2 750 | 11,2 | 81,9 | | |
| | | | POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75d | I | 6,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 50 | 23 | 21 | IA | 30,75 | 0,93 | 0,9 | 13 | 328 | 1 985 | 11,6 | 70,0 | TP | 6,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 328 | 1 985 | 11,6 | 70,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,42 ha: BRZ 70 l., SO 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 75f | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 35 | 17 | 18 | IA | 33,30 | 0,75 | 0,9 | 22 | 98 | 140 | 5,4 | 7,9 | TP | 1,45 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.S | 3 | 35 | 15 | 16 | I | 30,62 | | DKĘP | | 38 | 55 | 2,6 | 3,8 | | |
| | | | TD: ZG | | BRZ | 2 | 35 | 18 | 19 | I | 31,16 | | | | 38 | 55 | 1,6 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | LP | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty //// | | | | | | | | | | Razem: | | 174 | 250 | 9,7 | 14,0 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | DB.S | | 190 | 120 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | cenne drzewo: DB.S 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75g | I | 1,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 80 | 39 | 29 | IA | 31,91 | 0,93 | 0,6 | 2 | 306 | 540 | 6,2 | 11,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 2 | 80 | 35 | 28 | I | 29,50 | | KĘP | 2 | 85 | 150 | 2,4 | 4,2 | | |
| | | | TD: ZG | | DB.S | 1 | 80 | 32 | 25 | II | 27,68 | | | 3 | 34 | 60 | 1,1 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 80 | 32 | 26 | I | 27,82 | | | 3 | 28 | 50 | 0,5 | 0,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | DB.S | MJS | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | JS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 800 | 10,2 | 18,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: grupa drzew: DB.S 5 szt. (pomnik przyrody) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75~b | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 990** | | | | |
| | **I** | **18,94** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,31** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 950** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 990** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76a | IV | 1,74 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | SO | | 30 | 10 | 8 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | OL | | 70 | 31 | 21 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 4 | | | | |
| | | | | SAMOS | BRZ | | 15 | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 76b | I | 0,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 30 | 13 | 13 | I | 29,67 | 0,74 | 1,0 | 32 | 119 | 70 | 8,7 | 5,0 | TW | 0,58 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 30 | 13 | 14 | I | 27,65 | | DKĘP | | 11 | 5 | 0,8 | 0,4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 130 | 75 | 9,4 | 5,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76c | IV | 1,24 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | SO | | 65 | 29 | 22 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 1,24 ha | | BRZ | | 30 | 10 | 11 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 13 | 12 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 9 | | | | |
| 76d | I | 1,94 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 67 | 29 | 27 | IA | 32,42 | 0,81 | 0,9 | 22 | 327 | 635 | 9,2 | 17,8 | TP | 1,94 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 67 | 27 | 26 | I | 29,06 | | KĘP | | 55 | 105 | 1,1 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 740 | 10,2 | 19,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | SO | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 76f | I | 1,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 23 | 10 | 11 | IA | 31,33 | 0,79 | 1,0 | 22 | 108 | 165 | 10,4 | 15,8 | TW | 1,52 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 108 | 165 | 10,4 | 15,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PRZES | SO | | 130 | 37 | 25 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | DB.S | | 130 | 38 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | 130 | 36 | 25 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 46 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76g | I | 4,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 24 | 23 | I | 28,86 | 0,93 | 0,9 | 21 | 360 | 1 510 | 10,5 | 43,8 | TP | 4,19 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 1 510 | 10,5 | 43,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76h | I | 3,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 15 | 16 | I | 28,74 | 0,80 | 1,0 | 11 | 196 | 740 | 10,0 | 37,8 | TP | 3,78 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 196 | 740 | 10,0 | 37,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 76i | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 55 | 25 | 23 | II | 28,29 | 0,57 | 0,5 | 4 | 177 | 140 | 5,6 | 4,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 3 | 55 | 25 | 23 | I | 28,83 | | GRP | 4 | 44 | 35 | 1,5 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WB | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////piasek luźny //// | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 221 | 175 | 7,0 | 5,5 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S bagno o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76j | IV | 1,12 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 55 | 24 | 23 | | | | | 4 | | 130 | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | Razem: | | | 130 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76k | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 40 | 19 | 20 | IA | 33,29 | 0,84 | 0,9 | 22 | 185 | 375 | 8,2 | 16,7 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 2 | 40 | 19 | 21 | I | 31,22 | | GRP | | 44 | 90 | 1,7 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | 1 | 40 | 22 | 22 | I | 34,63 | | | | 33 | 65 | 1,1 | 2,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 530 | 11,0 | 22,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KAL.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | DB.B | | 150 | 55 | 24 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Runo: trawy, niecierpek, pokrzywa zwyczajna | | OL | | 95 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | PNSW: w części W remiza o pow. 0,12 ha: DB.S 25 l., KAL.K 25 l., DER.B 25 l., | | DB.B | | 95 | 39 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | WZ | | 95 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 95 | 35 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 77 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 76l | I | 2,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 5 | 5 | | 1 | I | 29,67 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 2,09 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | OL | 2 | 6 | | 3 | I | 30,08 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | SO | 2 | 5 | | 2 | IA | 33,17 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | 1 | 6 | | 1 | I | 35,77 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PRZES | SO | | 80 | 32 | 27 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | | 80 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, wiechlina, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 80 l., SO 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76m | I | 4,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 39 | 18 | 19 | IA | 32,60 | 0,85 | 1,0 | 12 | 218 | 1 015 | 10,5 | 48,9 | TP | 4,66 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 39 | 18 | 19 | I | 29,38 | | DKĘP | | 33 | 155 | 0,8 | 3,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 1 170 | 11,3 | 52,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76n | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 69 | 31 | 27 | IA | 32,00 | 0,69 | 0,5 | 23 | 316 | 260 | 8,9 | 7,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 69 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | DB.S | MJS | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 260 | 8,9 | 7,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 76o | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 94 | 35 | 25 | II | 25,80 | 0,81 | 0,7 | 2 | 324 | 620 | 7,6 | 14,6 | IIIAU (90%) | 1,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 94 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,35 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 94 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,35 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | CW | 0,57 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 324 | 620 | 7,6 | 14,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | DB.B | 7 | 8 | | 2 | II | 29,18 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BK | 3 | 7 | | 1 | I | 30,63 | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | SO | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,57 ha: BK 7 l., DB.B 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76p | II | 1,09 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | DB.S | | 80 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | ODN-ZRB | 1,09 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | PIEL | 1,09 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76r | I | 1,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 16 | | 5 | II | 27,93 | 0,30 | 0,9 | 12 | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,83 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | | | | | | | | | --- | | | | | | CP | 0,48 |
| | | | ZG | PRZES | SO | | 115 | 36 | 27 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | | 115 | 25 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | | 65 | 30 | 25 | | | | | 3 | | 45 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | | 85 | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,28 ha: SO 65 l., AK 115 l., SO 115 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76~a | III | 0,43 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 76~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | OL | | 80 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 80 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | SO | | 40 | 12 | 14 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 40 | 13 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 9 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 405** | | | | |
| | **I** | **25,62** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,09** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 985** | | | | |
| | **III** | **0,56** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **248** | | | | |
| | **IV** | **4,10** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 253** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **9** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **143** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77a | I | 13,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 26 | 24 | IA | 30,56 | 0,91 | 0,9 | 11 | 371 | 5 135 | 10,9 | 150,3 | TP | 13,84 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 5 135 | 10,9 | 150,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODR | BK | 10 | 28 | | 4 | IV | 18,52 | 0,10 | | 22 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W remiza o pow. 0,16 ha: DER.B 30 l., DB.C 30 l., JKL 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 77b | I | 10,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 26 | 24 | IA | 30,56 | 0,91 | 0,9 | 12 | 371 | 4 060 | 10,9 | 118,9 | TP | 10,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 4 060 | 10,9 | 118,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 30 | | 4 | IV | 17,19 | 0,20 | | 22 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,37 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77c | I | 5,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 65 | 30 | 26 | I | 29,28 | 0,59 | 0,5 | 3 | 164 | 950 | 4,3 | 24,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 65 | 35 | 27 | IA | 32,87 | | WKĘP | 3 | 71 | 410 | 2,5 | 14,3 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 65 | 27 | 24 | I | 27,89 | | | 4 | 16 | 95 | 0,4 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 45 | 15 | 15 | III | 24,06 | | | 4 | 11 | 65 | 0,6 | 3,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna ////piasek słabogliniasty //// POROL | | JS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 1 520 | 7,7 | 44,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77d | I | 1,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 3 | 8 | | 2 | II | 24,80 | 1,00 | 0,9 | 12 | | | | | CP | 1,55 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | BK | 1 | 8 | | 2 | I | 41,57 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | DB.B | 3 | 19 | | 5 | III | 25,32 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 19 | | 8 | I | 43,92 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | 1 | 4 | | 1 | I | 27,56 | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OL | 1 | 4 | | 1 | II | 26,75 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | GB | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OL | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | PRZES | SO | | 138 | 42 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | 75 | 29 | 24 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, trzcinnik | | ŚW | | 75 | 28 | 24 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 138 l., | | DB | | 75 | 27 | 23 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | WZ | | 75 | 26 | 22 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 26 | | | | |
| 77f | II | 1,08 | Rodzaj powierzchni: RETENCJA | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna ////piasek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | słabogliniasty //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77g | IV | 0,57 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | SAMOS | SO | | 5 | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| 77~a | III | 0,54 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77~b | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77~c | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Wizura | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 77** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | |
| **Ogółem:** | **34,55** | | |
| **w tym:** | | **Grubizna ogółem:** | **10 741** |
| | **I** **32,13** | **w tym:** | |
| | **II** **1,08** | **I - drzewostany:** | **10 715** |
| | **III** **0,77** | **I - przestoje:** | **26** |
| | **IV** **0,57** | **razem:** | **10 741** |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Policko (02) | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78a | I | 6,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 26 | 24 | IA | 30,10 | 0,91 | 0,9 | 21 | 371 | 2 580 | 10,7 | 74,0 | TP | 6,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | DB.S | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 2 580 | 10,7 | 74,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78b | I | 7,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 28 | 25 | IA | 31,33 | 1,00 | 0,9 | 12 | 425 | 3 260 | 11,8 | 90,5 | TP | 7,67 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | AK | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | OS | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JB | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | LP | MJS | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 3 260 | 11,8 | 90,5 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78c | I | 0,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 29 | 26 | IA | 32,33 | 0,64 | 0,5 | 32 | 283 | 215 | 8,7 | 6,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 283 | 215 | 8,7 | 6,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78d | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 30 | 27 | IA | 33,33 | 0,70 | 0,7 | 32 | 327 | 665 | 9,5 | 19,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WB | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | WZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | WB | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT | | | | | | | | | | Razem: | | 327 | 665 | 9,5 | 19,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trawy, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S remiza o pow. 0,09 ha: KRU 30 l., DER.B 30 l., BEZ.C 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 78f | I | 0,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 8 | 40 | 16 | 16 | III | 21,79 | 1,17 | 0,9 | 24 | 142 | 10 | 6,7 | 0,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: | | AK | 2 | 60 | 24 | 22 | II | 25,37 | | JDN | | 22 | | 1,5 | 0,1 | | |
| | | | CZ ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 164 | 10 | 8,2 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | AK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 29% równe 16.17 st, wystawa W | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny i słaboglinisty //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78g | I | 1,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 27 | 25 | IA | 32,06 | 0,75 | 0,7 | 22 | 320 | 620 | 9,9 | 19,0 | TP | 1,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | AK | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | DB | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 620 | 9,9 | 19,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny i słaboglinisty //// POROL | PODSZ | AK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78h | IV | 0,34 | Rodzaj powierzchni: KANAŁ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78i | IV | 0,27 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78j | IV | 0,45 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | ZAKRZEW | AK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 78k | IV | 0,06 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | ZAKRZEW | AK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042)<br>Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78~a | III | 0,20 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)<br>Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78~b | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78~c | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina: Pszczew (042)<br>Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78~d | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 78** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **21,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 350** | | | |
| | **I** | **19,40** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,56** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 350** | | | |
| | **IV** | **1,12** | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 350** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 555** | | | |
| | **I** | **11,69** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,28** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 555** | | | |
| | **IV** | **0,85** | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 555** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **8,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 795** | | | |
| | **I** | **7,71** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,28** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 795** | | | |
| | **IV** | **0,27** | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 795** | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79a | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 75 | 30 | 26 | I | 29,83 | 1,08 | 0,9 | 2 | 249 | 160 | 5,7 | 3,7 | TP | 0,64 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 5 | 95 | 39 | 25 | III | 25,61 | | GRP | 2 | 215 | 140 | 5,8 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 464 | 300 | 11,5 | 7,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, konwalia majowa, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79b | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 5 | 95 | 35 | 25 | III | 25,61 | 1,15 | 0,9 | 11 | 236 | 360 | 6,0 | 9,2 | TP | 1,53 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 5 | 95 | 33 | 26 | I | 26,66 | | GRP | | 247 | 380 | 5,0 | 7,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 483 | 740 | 11,0 | 16,8 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, konwalia majowa, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79c | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 6 | 95 | 35 | 27 | II | 27,58 | 1,02 | 0,9 | 11 | 280 | 570 | 7,0 | 14,3 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 95 | 36 | 29 | I | 29,65 | | JDN | | 202 | 410 | 3,9 | 7,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OS | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | DB.B | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | Razem: | | 482 | 980 | 10,9 | 22,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 79d | I | 9,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 7 | 120 | 36 | 27 | III | 24,96 | 1,02 | 0,9 | 2 | 354 | 3 510 | 7,0 | 69,7 | TP | 9,91 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 120 | 36 | 27 | II | 24,74 | | JDN | 2 | 121 | 1 200 | 2,3 | 22,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OS | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | BRZ | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 9,91 ha | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 475 | 4 710 | 9,3 | 92,0 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, konwalia majowa, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79f | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 29 | IA | 31,91 | 1,14 | 0,9 | 2 | 556 | 1 070 | 12,1 | 23,2 | TP | 1,92 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 556 | 1 070 | 12,1 | 23,2 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | WB | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jastrzębiec kosmaczek, karbieniec pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79g | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 10 | 95 | 38 | 25 | III | 25,61 | 1,09 | 0,9 | 11 | 460 | 665 | 11,6 | 16,8 | TP | 1,45 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 460 | 665 | 11,6 | 16,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,45 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, konwalia majowa, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79h | IV | 0,22 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 79i | I | 1,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Teren: nizinny pagórkowaty, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////<br>Pokrywa: zadarniona<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu<br>Gosp.: P-Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.<br>Runo: konwalia majowa, orlica pospolita, jeżyna | DRZEW | SO | 5 | 58 | 30 | 25 | IA | 32,57 | 1,16 | 0,9 | 11 | 254 | 465 | 6,9 | 12,7 | TP | 1,84 |
| | | | | | AK | 3 | 58 | 28 | 22 | II | 25,64 | | WKĘP | | 99 | 180 | 2,3 | 4,3 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 58 | 27 | 26 | I | 31,25 | | | | 33 | 60 | 0,8 | 1,5 | | |
| | | | | | DB.B | 1 | 58 | 27 | 24 | I | 30,80 | | | | 33 | 60 | 1,4 | 2,6 | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 765 | 11,5 | 21,1 | | |
| | | | | PODSZ | DB | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79j | I | 3,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 3 | 19 | | 4 | III | 23,00 | 0,60 | 0,7 | 11 | | | | | AGROT | 0,30 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 19 | | 7 | IV | 15,04 | | WKĘP | | | | | | POPR | 0,30 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | GB | 1 | 19 | | 3 | III | 22,12 | | | | | | | | CW | 0,60 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | 1 | 19 | | 2 | V | 17,03 | | | | | | | | CP | 2,10 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | DB.S | 2 | 26 | 9 | 9 | II | 27,25 | | | | 5 | 15 | 1,0 | 3,3 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | | SO | 1 | 10 | | 3 | I | 26,35 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BK | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny | | KL | PJD | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,4 ha | | SO | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LP | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | GB | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | DB.S | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | LP | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | LP | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, trawy, orlica pospolita | | GB | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 5 | 15 | 1,0 | 3,3 | | |
| | | | | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.B | | 150 | 45 | 22 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | | | BK | | 150 | 48 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| 79k | IV | 0,22 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 79l | I | 4,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN<br>TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG<br>Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze<br>Teren: nizinny pagórkowaty, płaski<br>Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////<br>Pokrywa: zielna<br>Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,41 ha<br>Budowa pionowa: drzewostan<br>Stabilność: STABILNY<br>Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej<br>Gosp.: P-Z<br>Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.<br>Runo: konwalia majowa, trawy, orlica pospolita<br>PNSW: w części NE kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 30 l., BK 30 l., BRZ 30 l., SO 30 l.,<br>w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 30 l., ŚW 30 l.,<br>w części S kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 125 l., ŚW 125 l., DB.S 125 l., | DRZEW | DB.S | 3 | 14 | | 7 | I | 34,01 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 4,41 |
| | | | | | GB | 3 | 14 | | 7 | I | 46,86 | | KĘP | | | | | | | | |
| | | | | | BK | 1 | 14 | | 6 | I | 48,46 | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | 3 | 27 | 10 | 10 | II | 27,98 | | | | 10 | 45 | 2,3 | 10,1 | | | |
| | | | | | SO | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GB | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | PJD | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | 10 | 45 | 2,3 | 10,1 | | | |
| | | | | PODSZ | GB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 125 | 44 | 25 | | | | | 3 | | 90 | | | | | |
| | | | | | ŚW | | 125 | 34 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | | |
| | | | | | BRZ | | 125 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | | | SO | | 125 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | | | | MD | | 125 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | | 102 | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79m | I | 3,34 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | GB | 5 | 16 | | 3 | II | 26,08 | 0,80 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 0,90 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 16 | | 4 | III | 25,56 | | WKĘP | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,90 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 2 | 16 | | 3 | II | 27,13 | | | | | | | | CP | 0,90 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | KL | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | AK | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | | JW | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 125 | 42 | 28 | | | | | 2 | | 40 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | DB.B | | 60 | 25 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: turzyca, orlica pospolita, konwalia majowa | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: DB.B 60 l., SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79~a | III | 0,24 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79~b | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79~c | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 79** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 482** | | | | |
| | **I** | **30,47** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,37** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 290** | | | | |
| | **IV** | **0,44** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **192** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 482** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 230** | | | | |
| | **I** | **19,32** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,28** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 230** | | | | |
| | **IV** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 230** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **252** | | | | |
| | **I** | **11,15** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,09** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **60** | | | | |
| | **IV** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **192** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **252** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80a | I | 1,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 4 | 95 | 34 | 26 | II | 26,60 | 1,00 | 0,9 | 22 | 180 | 250 | 4,5 | 6,3 | TP | 1,40 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 95 | 33 | 27 | I | 27,66 | | WKĘP | | 180 | 250 | 3,7 | 5,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 120 | 39 | 27 | II | 24,74 | | | | 39 | 55 | 0,7 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | 1 | 120 | 58 | 28 | II | 26,04 | | | | 45 | 65 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 444 | 620 | 9,9 | 13,9 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80b | I | 8,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 26 | 23 | IA | 31,35 | 0,93 | 0,9 | 13 | 364 | 2 935 | 11,6 | 93,3 | TP | 8,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | PJD | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | MD | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 2 935 | 11,6 | 93,3 | | |
| | | | | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 80c | I | 0,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 7 | 90 | 38 | 21 | III | 22,38 | 1,00 | 0,9 | 12 | 258 | 215 | 6,8 | 5,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ | | DB.B | 3 | 140 | 75 | 25 | IV | 20,97 | | WKĘP | | 88 | 75 | 2,5 | 2,1 | | |
| | | | ZG | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 346 | 290 | 9,3 | 7,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80d | I | 3,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 36 | 18 | 17 | IA | 31,65 | 0,96 | 0,9 | 12 | 207 | 755 | 10,0 | 36,3 | TP | 3,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 36 | 15 | 15 | II | 29,22 | | WKĘP | | 11 | 40 | 1,0 | 3,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 36 | 17 | 18 | I | 29,52 | | | | 22 | 80 | 0,9 | 3,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 875 | 11,9 | 43,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚL.T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.B | | 106 | 45 | 26 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| 80f | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 28 | 25 | IA | 32,57 | 0,95 | 0,9 | 13 | 408 | 445 | 11,9 | 13,0 | TP | 1,09 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | BRZ | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 445 | 11,9 | 13,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 80g | I | 1,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 25 | 23 | IA | 30,81 | 0,99 | 0,9 | 12 | 386 | 480 | 11,9 | 14,7 | TP | 1,24 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | PJD | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 480 | 11,9 | 14,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80h | I | 2,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 9 | 100 | 37 | 26 | II | 26,00 | 1,06 | 0,9 | 12 | 426 | 1 175 | 10,3 | 28,3 | TP | 2,76 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 80 | 26 | 20 | III | 21,28 | | KĘP | | 28 | 75 | 0,5 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | BK | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,76 ha | | BK | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 454 | 1 250 | 10,7 | 29,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODR | BK | 10 | 20 | | 6 | I | 34,61 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, konwalia majowa, borówka czarna | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80i | I | 3,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 125 | 38 | 27 | II | 24,26 | 0,61 | 0,2 | 3 | 174 | 590 | 3,0 | 10,1 | IIIAU (90%) | 3,40 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 80 | 29 | 24 | II | 26,74 | | GRP | 4 | 23 | 80 | 1,6 | 5,5 | AGROT | 2,29 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 60 | 18 | 19 | II | 25,85 | | | 4 | 12 | 40 | 0,7 | 2,5 | ODN-ZŁOŻ | 2,29 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | 1 | 60 | 17 | 16 | III | 25,38 | | | 4 | 12 | 40 | 0,9 | 3,1 | CP | 1,11 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | DB.B | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// | | MD | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY | | BK | PJD | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | 221 | 750 | 6,2 | 21,1 | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | PODR | DB.S | 9 | 13 | | 4 | II | 28,75 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | BK | 1 | 13 | | 3 | I | 33,42 | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,11 ha: BK 13 l., DB.S 13 l., | | AK | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80j | IV | 0,24 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80~a | III | 0,17 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80~b | III | 0,39 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80~c | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80~d | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,34** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 660** | | | | |
| | **I** | **22,45** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,65** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 645** | | | | |
| | **IV** | **0,24** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 660** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,85** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 910** | | | | |
| | **I** | **19,05** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,56** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 895** | | | | |
| | **IV** | **0,24** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 910** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **3,49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **750** | | | | |
| | **I** | **3,40** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,09** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **750** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **750** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81a | I | 2,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 26 | 24 | IA | 31,05 | 1,03 | 0,9 | 12 | 419 | 1 025 | 12,1 | 29,7 | TP | 2,45 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 1 025 | 12,1 | 29,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 30 l., SO 30 l., ŚW 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 81b | I | 0,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 48 | 23 | 20 | IA | 30,33 | 0,86 | 0,9 | 13 | 284 | 270 | 10,9 | 10,3 | TP | 0,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 48 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 270 | 10,9 | 10,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81c | I | 8,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 38 | 18 | 18 | IA | 31,91 | 0,90 | 0,9 | 12 | 196 | 1 595 | 9,6 | 77,7 | TP | 8,14 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 38 | 13 | 14 | II | 27,44 | | WKĘP | | 16 | 130 | 0,9 | 7,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 57 | 25 | 24 | IA | 31,83 | | | | 38 | 310 | 1,1 | 9,2 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.B | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | JW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 250 | 2 035 | 11,5 | 93,9 | | |
| | | | | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 130 | 58 | 27 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| 81d | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 31 | 26 | I | 26,66 | 1,02 | 0,9 | 3 | 426 | 230 | 9,1 | 4,9 | IB (100%) | 0,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,54 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 426 | 230 | 9,1 | 4,9 | ODN-ZRB | 0,54 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 81f | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 23 | 23 | IA | 30,81 | 1,02 | 0,9 | 12 | 397 | 905 | 12,1 | 27,6 | TP | 2,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | PJD | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | PJD | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 397 | 905 | 12,1 | 27,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81g | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | IP | SO | 10 | 95 | 34 | 27 | I | 27,66 | 0,87 | 0,8 | 3 | 381 | 335 | 8,3 | 7,3 | IB (100%) | 0,88 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | PJD | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,88 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 335 | 8,3 | 7,3 | ODN-ZRB | 0,88 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | IIP | DB.B | 7 | 40 | 10 | 10 | III | 22,24 | 0,22 | 0,7 | 4 | 11 | 10 | 1,5 | 1,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.B | 3 | 60 | 16 | 16 | III | 22,99 | | GRP | 4 | 11 | 10 | 0,9 | 0,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy | | | | | | | | | | Razem: | | 22 | 20 | 2,4 | 2,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81h | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 29 | 25 | I | 29,81 | 0,93 | 0,9 | 12 | 392 | 365 | 10,5 | 9,7 | TP | 0,93 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 365 | 10,5 | 9,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 81i | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 57 | 24 | 23 | IA | 30,81 | 0,98 | 0,9 | 12 | 342 | 275 | 10,6 | 8,6 | TP | 0,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 70 | 32 | 27 | IA | 31,79 | | WKĘP | | 50 | 40 | 1,1 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 315 | 11,7 | 9,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81j | I | 2,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 66 | 27 | 25 | IA | 30,65 | 0,94 | 0,9 | 12 | 294 | 815 | 7,7 | 21,3 | TP | 2,78 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.B | 3 | 66 | 25 | 24 | II | 29,14 | | GRP | | 87 | 240 | 3,6 | 9,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | AK | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 1 055 | 11,2 | 31,2 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 10 | 30 | | 8 | II | 28,53 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81k | I | 4,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 4 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 2,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 5 | | | | | | WKĘP | | | | | | CP | 1,39 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 3 | 25 | | 9 | II | 27,84 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 170 | 42 | 26 | | | | | 2 | | 35 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | 90 | 35 | 24 | | | | | 2 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 170 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 170 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81l | I | 1,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 59 | 24 | 22 | I | 29,27 | 0,85 | 0,9 | 12 | 276 | 285 | 9,1 | 9,4 | TP | 1,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 59 | 22 | 20 | II | 27,00 | | GRP | | 28 | 30 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 304 | 315 | 10,1 | 10,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,23 ha: SO 169 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81m | IV | 0,31 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81~a | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81~b | III | 0,34 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81~c | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 81** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 915** | | | | | |
| | **I** | **25,02** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,42** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 870** | | | | | |
| | **IV** | **0,31** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **45** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 915** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **17,67** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 505** | | | | | |
| | **I** | **16,98** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,38** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 500** | | | | | |
| | **IV** | **0,31** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **5** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 505** | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **8,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 410** | | | | |
| | **I** | **8,04** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,04** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 370** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **1 410** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82a | I | 3,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 26 | 23 | IA | 30,04 | 0,88 | 0,9 | 12 | 342 | 1 065 | 10,6 | 32,9 | TP | 3,12 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | PJD | 100 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.B | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 1 065 | 10,6 | 32,9 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,26 ha: DB.B 36 l., BK 36 l., SO 36 l., BRZ 36 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82b | I | 4,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 47 | 22 | 20 | IA | 30,66 | 0,95 | 0,9 | 12 | 284 | 1 380 | 10,6 | 51,7 | TP | 4,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 47 | 20 | 20 | I | 30,09 | | DKĘP | | 22 | 105 | 1,1 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | PJD | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | PJD | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 1 485 | 11,8 | 57,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 82c | I | 1,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 60 | 26 | 25 | IA | 32,06 | 0,94 | 0,9 | 12 | 331 | 475 | 9,3 | 13,3 | TP | 1,43 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 60 | 24 | 21 | II | 25,72 | | WKĘP | | 44 | 65 | 1,3 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 540 | 10,6 | 15,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODR | BK | 10 | 22 | | 5 | II | 27,85 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82d | I | 4,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 36 | 17 | 17 | IA | 31,65 | 0,97 | 0,9 | 12 | 164 | 655 | 7,5 | 30,1 | TP | 4,00 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 36 | 16 | 16 | I | 30,20 | | WKĘP | | 22 | 90 | 2,1 | 8,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 29 | 13 | 13 | IA | 30,24 | | | | 22 | 90 | 1,2 | 4,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | 1 | 36 | 14 | 16 | I | 27,16 | | | | 16 | 65 | 0,9 | 3,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 224 | 900 | 11,7 | 46,7 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | MD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.B | | 110 | 48 | 21 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| 82f | I | 1,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 55 | 25 | 23 | IA | 31,35 | 1,00 | 0,9 | 12 | 353 | 500 | 11,0 | 15,6 | TP | 1,42 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 55 | 18 | 19 | II | 27,03 | | KĘP | | 22 | 30 | 1,1 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 530 | 12,1 | 17,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW luka o pow. 0,08 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 82g | I | 1,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 95 | 31 | 24 | III | 24,63 | 1,01 | 0,9 | 12 | 404 | 525 | 10,7 | 13,8 | TP | 1,30 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 404 | 525 | 10,7 | 13,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,3 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82h | I | 3,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 59 | 27 | 24 | IA | 31,30 | 1,00 | 0,9 | 12 | 320 | 1 015 | 9,6 | 30,4 | TP | 3,17 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 59 | 21 | 20 | II | 27,00 | | KĘP | | 28 | 90 | 1,1 | 3,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 59 | 20 | 21 | II | 24,42 | | | | 28 | 90 | 0,7 | 2,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 376 | 1 195 | 11,4 | 36,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,23 ha: DB.B 100 l., SO 160 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82i | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 45 | 20 | 20 | IA | 31,36 | 1,07 | 0,9 | 12 | 273 | 465 | 10,6 | 17,9 | TP | 1,70 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 45 | 19 | 19 | I | 27,25 | | WKĘP | | 27 | 45 | 0,9 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 45 | 18 | 18 | III | 23,19 | | | | 22 | 35 | 0,8 | 1,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 322 | 545 | 12,2 | 20,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 31 l., SO 31 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82j | I | 1,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 53 | 23 | 23 | IA | 31,92 | 1,07 | 0,9 | 12 | 419 | 770 | 13,1 | 24,1 | TP | 1,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | MJS | 53 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | DB.B | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 770 | 13,1 | 24,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82k | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 27 | 25 | IA | 30,87 | 0,98 | 0,9 | 12 | 382 | 1 120 | 10,3 | 30,1 | TP | 2,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 65 | 24 | 23 | II | 28,44 | | DKĘP | | 27 | 80 | 1,2 | 3,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 409 | 1 200 | 11,5 | 33,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82l | I | 0,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 24 | 23 | IA | 31,08 | 1,07 | 0,9 | 12 | 419 | 350 | 12,7 | 10,5 | TP | 0,83 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 350 | 12,7 | 10,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82m | IV | 0,30 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | ZADRZEW | SO | | 29 | 10 | 9 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| 82~a | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 82~b | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82~c | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82~d | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,43** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 135** | | | | |
| | **I** | **26,60** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,53** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 105** | | | | |
| | **IV** | **0,30** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 125** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **10** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 075** | | | | |
| | **I** | **16,13** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,32** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 045** | | | | |
| | **IV** | **0,30** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 065** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **10** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **10,68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 060** | | | | |
| | **I** | **10,47** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,21** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 060** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 060** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83a | I | 4,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 105 | 36 | 28 | I | 27,39 | 0,72 | 0,3 | 2 | 255 | 1 185 | 4,7 | 22,0 | IIIAU (90%) | 4,64 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 105 | 37 | 26 | III | 25,43 | | GRP | 3 | 23 | 105 | 0,8 | 3,9 | AGROT | 3,28 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 2 | 70 | 22 | 24 | II | 28,40 | | | 4 | 35 | 160 | 1,9 | 8,9 | ODN-ZŁOŻ | 3,28 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 105 | | | | | | | | | | | | CP | 1,40 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | DB.C | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | DB.C | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 1 450 | 7,5 | 34,8 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny | PODR | DB.S | 10 | 14 | | 3 | III | 24,65 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | | | DB.C | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,4 ha: DB.S 14 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83b | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | ŚW | 7 | 30 | 14 | 12 | I | 33,59 | 1,11 | 1,0 | 23 | 97 | 85 | 9,6 | 8,3 | TW | 0,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 3 | 30 | 13 | 13 | I | 29,67 | | WKĘP | | 65 | 55 | 3,9 | 3,3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 162 | 140 | 13,5 | 11,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 83c | I | 3,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 101 | 29 | 23 | III | 22,87 | 0,80 | 0,9 | 12 | 303 | 1 005 | 8,4 | 28,0 | TP | 3,32 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | MJS | 101 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.C | PJD | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem: | | | | | | | | | | | 303 | 1 005 | 8,4 | 28,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 3,32 ha | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83d | I | 3,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 17 | | 6 | II | 29,01 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 2,70 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | CP | 1,08 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 105 | 33 | 27 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | Razem: | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 55 l., SO 55 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 83f | I | 3,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 105 | 36 | 30 | I | 29,40 | 0,72 | 0,3 | 2 | 301 | 1 090 | 6,4 | 23,0 | IIIAU (90%) | 3,62 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 70 | 21 | 19 | III | 23,78 | | GRP | 4 | 23 | 85 | 0,8 | 2,9 | AGROT | 2,51 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 320 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,51 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | CP | 1,15 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA | | | | | | | | | | Razem: | | 324 | 1 175 | 7,2 | 25,9 | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | PODR | DB.B | 10 | 12 | | 2 | III | 22,98 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | BRZ | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | gospodarczy drzewostan nasienny | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,15 ha: DB.B 12 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83g | I | 2,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 26 | 23 | IA | 30,81 | 0,93 | 0,9 | 12 | 364 | 970 | 11,3 | 30,1 | TP | 2,66 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.B | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | KL | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | PJD | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 970 | 11,3 | 30,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 83h | I | 3,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 32 | 27 | I | 29,12 | 1,00 | 0,9 | 3 | 446 | 1 565 | 10,1 | 35,3 | IIIA (40%) | 3,51 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | BK | PJD | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,41 |
| | | | ZG | | DB.B | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,41 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 446 | 1 565 | 10,1 | 35,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83i | I | 6,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 48 | 21 | 21 | IA | 31,40 | 1,06 | 0,9 | 12 | 372 | 2 325 | 13,0 | 81,4 | TP | 6,25 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.S | MJS | 48 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | AK | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | KL | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JS | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BRZ | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 372 | 2 325 | 13,0 | 81,4 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,21 ha: BRZ 70 l., OL 70 l., ŚW 40 l., DB.S | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70 l., | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83j | IV | 0,33 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | ZADRZEW | ŚW | | 30 | 14 | 12 | | | | | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | SO | | 30 | 13 | 13 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| 83~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83~b | III | 0,35 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83~c | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83~d | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 83** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 715** | | | | |
| | **I** | **28,64** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,73** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 630** | | | | |
| | **IV** | **0,33** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **60** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 690** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **25** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **17,05** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **3 855** | | | | |
| | **I** | **16,22** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 770** | | | | |
| | **IV** | **0,33** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **60** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **3 830** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **25** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,65** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 860** | | | | |
| | **I** | **12,42** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,23** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 860** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 860** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84a | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 57 | 26 | 23 | II | 28,00 | 0,92 | 0,9 | 4 | 121 | 115 | 4,6 | 4,4 | TP | 0,96 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 57 | 27 | 25 | IA | 32,84 | | DKĘP | 4 | 66 | 65 | 2,4 | 2,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 3 | 36 | 17 | 17 | IA | 31,65 | | | 4 | 105 | 100 | 3,6 | 3,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | 1 | 36 | 16 | 15 | I | 33,53 | | | 4 | 17 | 15 | 1,3 | 1,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WB | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | OS | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | OL | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | DB.S | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 309 | 295 | 11,8 | 11,4 | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: KL 110 l., DB.S 110 l., SO 110 l., | PODSZ | JW | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 110 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | | | SO | | 110 | 39 | 27 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | JW | | 110 | 60 | 22 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | KL | | 11 | 58 | 23 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 56 | | | | |
| 84b | I | 2,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,53 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 6 | | 1 | I | 35,77 | | WKĘP | | | | | | CP | 0,65 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 17 | | 6 | II | 29,01 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | SO | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | SO | | 104 | 39 | 27 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | | 104 | 39 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KL | | 70 | 38 | 19 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna | | JS | | 70 | 45 | 27 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | Razem: | | 31 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 84c | I | 6,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 36 | 16 | 18 | IA | 32,82 | 1,03 | 0,9 | 12 | 294 | 1 875 | 13,5 | 86,3 | TP | 6,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | PJD | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 1 875 | 13,5 | 86,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, nerecznica | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: DB.S 100 l., ŚW 70 l., DB.S 70 l., SO 70 l., BRZ 70 l., | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.C | | 140 | 65 | 27 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| 84d | I | 5,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 17 | | 6 | II | 29,01 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 4,06 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 17 | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 4,06 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 17 | | | | | | | | | | | | CP | 1,62 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 105 | 34 | 26 | | | | | 3 | | 90 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 90 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84f | I | 9,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 39 | 19 | 18 | IA | 31,47 | 0,98 | 0,9 | 12 | 196 | 1 860 | 8,8 | 83,4 | TP | 9,50 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 39 | 13 | 14 | II | 27,06 | | WKĘP | | 16 | 150 | 0,9 | 8,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 39 | 16 | 18 | I | 28,25 | | | | 22 | 210 | 0,9 | 8,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | 1 | 33 | 15 | 15 | IA | 30,68 | | | | 16 | 150 | 1,2 | 11,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | DB.S | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | MD | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | WZ | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.B | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | 250 | 2 370 | 11,8 | 112,1 | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, jeżyna | PODSZ | DB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 120 | 49 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| 84g | I | 1,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 59 | 28 | 24 | IA | 31,30 | 0,89 | 0,9 | 12 | 364 | 475 | 11,0 | 14,3 | TP | 1,30 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 475 | 11,0 | 14,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, rokiet | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 30 l., BK 30 l., AK 30 l., KL 100 l., MD 100 l., SO 100 l., AK 100 l., DB.B 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84h | IV | 0,21 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84~b | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84~c | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 84** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,74** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 212** | | | | |
| | **I** | **26,00** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,53** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 015** | | | | |
| | **IV** | **0,21** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **197** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 212** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **15,79** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 357** | | | | |
| | **I** | **15,20** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,38** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 170** | | | | |
| | **IV** | **0,21** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **187** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 357** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **10,95** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 855** | | | | |
| | **I** | **10,80** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,15** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 845** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **10** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 855** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85a | I | 3,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 28 | 14 | 13 | IA | 30,84 | 1,01 | 0,9 | 12 | 162 | 640 | 11,3 | 44,4 | TW | 3,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 1 | 28 | 18 | 17 | I | 34,84 | | KĘP | | 22 | 85 | 1,3 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 184 | 725 | 12,5 | 49,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 90 l., OL 90 l., DB.S 120 l., | PRZES | DB.S | | 120 | 40 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,36 ha: SO 140 l., AK 70 l., DB.S 70 l., | | DB.S | | 70 | 17 | 15 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 70 l., SO 70 l., | | SO | | 140 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | | | OL | | 90 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 90 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | AK | | 70 | 28 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 70 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 90 | | | | |
| 85b | I | 3,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 10 | 10 | IA | 31,31 | 0,92 | 0,4 | 12 | 87 | 340 | 9,2 | 36,0 | TW | 3,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 21 | 8 | 8 | II | 29,07 | | WKĘP | | 5 | 20 | 0,7 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | 1 | 21 | 9 | 9 | I | 43,28 | | | | 5 | 20 | 0,9 | 3,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | | MD | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 97 | 380 | 10,7 | 42,0 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, rokiet | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części E kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 130 l., DB.S 130 l., OL 90 l., | PRZES | DB.S | | 130 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 130 l., SO 130 l., | | SO | | 130 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 70 | 28 | 22 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | OL | | 90 | 35 | 26 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 130 | 59 | 29 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 72 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 85c | I | 5,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 17 | | 6 | II | 29,01 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | AGROT | 3,83 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 3,83 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | DB.S | | 130 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 55 | | | CP | 1,42 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | | 130 | 35 | 27 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,35 ha: DB.S 58 l., SO 58 l., BRZ 58 l., w części N kępa o pow. 0,27 ha: DB.S 130 l., w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85d | IV | 1,08 | Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85f | I | 1,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 8 | 120 | 49 | 27 | III | 24,96 | 0,90 | 0,9 | 2 | 374 | 660 | 7,4 | 12,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG | | LP | 1 | 120 | 38 | 28 | II | 26,58 | | KĘP | 3 | 35 | 60 | 1,2 | 2,1 | | |
| | | | | | JW | 1 | 80 | 33 | 26 | I | 30,66 | | | 3 | 30 | 55 | 1,4 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DG | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JW | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | | | | | | | | | Razem: | | 439 | 775 | 9,9 | 17,4 | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,76 ha | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 85g | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 35 | 27 | IA | 30,82 | 0,78 | 0,7 | 3 | 295 | 210 | 7,4 | 5,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | BRZ | 1 | 75 | 28 | 26 | I | 28,43 | | GRP | 3 | 34 | 25 | 0,4 | 0,3 | | |
| | | | ZG | | JW | 1 | 50 | 19 | 19 | I | 34,17 | | | 4 | 11 | 10 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | PJD | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | JW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | WZ | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.B | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | 340 | 245 | 9,0 | 6,5 | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85h | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 130 | 37 | 25 | III | 21,76 | 0,50 | 0,7 | 3 | 81 | 70 | 1,6 | 1,4 | IB (70%) | 0,88 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 130 | 42 | 26 | III | 22,96 | | JDN | 3 | 40 | 35 | 1,1 | 1,0 | AGROT | 0,88 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 2 | 70 | 27 | 21 | III | 25,65 | | | 4 | 25 | 20 | 1,3 | 1,2 | ODN-ZRB | 0,88 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | KL | 2 | 70 | 32 | 21 | III | 24,83 | | | 4 | 25 | 20 | 1,7 | 1,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | CZR.P | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JS | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 171 | 145 | 5,7 | 5,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 85i | I | 2,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 59 | 25 | 24 | IA | 31,30 | 1,00 | 0,9 | 12 | 408 | 820 | 12,0 | 24,1 | TP | 2,01 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 820 | 12,0 | 24,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85j | I | 0,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | 0,95 | 0,9 | 12 | 92 | 85 | 7,2 | 6,9 | TW | 0,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 25 | 13 | 13 | I | 29,57 | | KĘP | | 32 | 30 | 1,9 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 25 | 9 | 9 | II | 27,84 | | | | 5 | 5 | 0,7 | 0,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | JW | 1 | 25 | 12 | 12 | I | 44,78 | | | | 5 | 5 | 1,1 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | PJD | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | AK | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 134 | 125 | 10,9 | 10,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 85k | I | 1,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 0,92 | 0,8 | 3 | 419 | 765 | 10,4 | 18,9 | TP | 1,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 765 | 10,4 | 18,9 | | |
| | | | Gosp.: Z | PODR | BK | 10 | 32 | | 10 | I | 31,48 | 0,40 | | 12 | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Miejsce postoju pojazdów | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85l | I | 0,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 0,92 | 0,8 | 3 | 419 | 300 | 10,4 | 7,5 | TP | 0,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 300 | 10,4 | 7,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85~a | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85~b | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85~c | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85~d | III | 0,01 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Podsumowanie dla oddziału: 85** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 512** | | | |
| | **I** | **21,98** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,43** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 280** | | | |
| | **IV** | **1,08** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **232** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 512** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 357** | | | |
| | **I** | **15,60** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,24** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 125** | | | |
| | **IV** | **1,08** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **232** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 357** | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **6,57** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 155** | | | |
| | **I** | **6,38** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,19** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 155** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 155** | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86a | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 25 | 24 | IA | 31,56 | 0,97 | 0,9 | 12 | 397 | 400 | 11,8 | 12,0 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | DB.B | PJD | 78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 400 | 11,8 | 12,0 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | PODSZ | DB | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | DB.B | | 120 | 50 | 21 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | Razem: | | 25 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 86b | I | 3,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 33 | 18 | 17 | II | 28,44 | 1,03 | 1,0 | 12 | 229 | 860 | 12,4 | 46,5 | TP | 3,76 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JS | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 860 | 12,4 | 46,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //gytia wapienna //// | PODSZ | OL | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW bagno o pow. 0,15 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86c | I | 2,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 36 | 17 | 17 | IA | 31,65 | 1,00 | 0,9 | 12 | 185 | 510 | 9,0 | 24,9 | TP | 2,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 36 | 16 | 18 | I | 29,52 | | WKĘP | | 44 | 120 | 1,9 | 5,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 36 | 18 | 19 | I | 29,04 | | | | 27 | 75 | 1,3 | 3,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | OL.S | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 256 | 705 | 12,2 | 33,8 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | OL | | 70 | 35 | 24 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | | 70 | 35 | 24 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | BRZ | | 70 | 35 | 24 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,05 ha: OL 70 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 43 | | | | |
| | | | w części NE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 70 l., BRZ 70 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 86d | I | 3,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 0,93 | 0,8 | 3 | 397 | 1 340 | 9,4 | 31,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | ŚW | 1 | 75 | 28 | 26 | II | 30,99 | | KĘP | 4 | 34 | 115 | 1,4 | 4,6 | | |
| | | | TD: ZG | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | JS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | WZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 455 | 10,8 | 36,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86f | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 33 | 14 | 15 | I | 30,51 | 1,14 | 1,0 | 11 | 164 | 90 | 11,3 | 6,1 | TW | 0,54 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 164 | 90 | 11,3 | 6,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | DB.S | | 270 | 120 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek luźny /piasek słabogliniasty //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 86g | I | 5,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 32 | 27 | I | 29,93 | 0,98 | 0,9 | 2 | 442 | 2 490 | 10,4 | 58,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | JW | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 2 490 | 10,4 | 58,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | JW | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, nerecznica | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86h | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 75 | 33 | 25 | II | 27,38 | 0,99 | 0,9 | 3 | 476 | 455 | 11,3 | 10,9 | TP | 0,96 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 455 | 11,3 | 10,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86i | I | 3,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 27 | 25 | I | 29,81 | 0,93 | 0,9 | 12 | 392 | 1 480 | 10,5 | 39,6 | TP | 3,78 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 480 | 10,5 | 39,6 | | |
| | | | Gosp.: Z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 86j | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 54 | 23 | 22 | IA | 30,60 | 0,85 | 0,9 | 12 | 254 | 460 | 9,6 | 17,4 | TP | 1,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 30 | 16 | 15 | III | 23,03 | | KĘP | | 17 | 30 | 0,7 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 271 | 490 | 10,3 | 18,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | AK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86k | I | 0,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 10 | 70 | 28 | 22 | II | 24,24 | 0,89 | 1,0 | 3 | 240 | 235 | 5,2 | 5,1 | IB (100%) | 0,98 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | PJD | 70 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,98 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | PJD | 70 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 0,98 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | WZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 235 | 5,2 | 5,1 | INTENS | |
| | | | | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 86l | I | 2,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 56 | 27 | 24 | IA | 32,10 | 1,01 | 0,9 | 12 | 375 | 970 | 11,2 | 29,0 | TP | 2,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | 1 | 56 | 25 | 24 | I | 28,89 | | KĘP | | 44 | 115 | 1,3 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | WZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 1 085 | 12,5 | 32,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86m | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 10 | 11 | I | 29,88 | 1,28 | 1,0 | 12 | 108 | 120 | 11,4 | 12,6 | TW | 1,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 25 | 10 | 12 | III | 20,60 | | KĘP | | 27 | 30 | 1,6 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BK | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 150 | 12,9 | 14,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | DB.S | | 160 | 50 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | 160 | 37 | 24 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | | | WZ | | 60 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | LP | | 60 | 35 | 21 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 53 | | | | |
| | | | Runo: trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 160 l., DB.S 160 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 160 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 86n | I | 3,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,9 | 2 | 408 | 1 290 | 9,7 | 30,6 | TP | 3,16 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 80 | 30 | 26 | II | 27,74 | | KĘP | 3 | 40 | 125 | 1,1 | 3,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JS | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 448 | 1 415 | 10,8 | 34,2 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | AK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,09 ha | | DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86~a | III | 0,32 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 86** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 446** | | | | |
| | **I** | **31,48** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,32** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 310** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **136** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 446** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87a | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 85 | 35 | 27 | II | 28,19 | 0,81 | 0,8 | 3 | 352 | 285 | 7,8 | 6,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | DB.S | 1 | 150 | 55 | 27 | III | 22,48 | | DKĘP | 3 | 47 | 40 | 0,7 | 0,6 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 1 | 105 | 42 | 28 | II | 27,67 | | | 3 | 41 | 35 | 0,9 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WB | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OS | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 440 | 360 | 9,4 | 7,6 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF, Ruiny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87b | I | 4,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 29 | 27 | IA | 32,87 | 0,80 | 0,7 | 32 | 371 | 1 525 | 10,3 | 42,2 | TP | 4,11 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | AK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 1 525 | 10,3 | 42,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 87c | I | 2,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 85 | 34 | 29 | IA | 31,10 | 1,06 | 0,8 | 3 | 364 | 1 000 | 7,7 | 21,1 | IIIA (40%) | 2,75 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | AK | 2 | 85 | 29 | 24 | II | 25,00 | | WKĘP | 3 | 65 | 180 | 0,9 | 2,5 | AGROT | 1,10 |
| | | | CZ ZG | | DB.S | 1 | 150 | 49 | 28 | III | 23,67 | | | 3 | 53 | 145 | 0,9 | 2,4 | ODN-ZŁOŻ | 1,10 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 482 | 1 325 | 9,4 | 25,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87d | I | 0,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 56 | 25 | 24 | IA | 32,10 | 0,94 | 0,9 | 22 | 386 | 240 | 11,8 | 7,3 | TP | 0,62 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | PJD | 56 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 240 | 11,8 | 7,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 87f | I | 4,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 20 | 20 | IA | 31,36 | 1,16 | 1,0 | 23 | 383 | 1 640 | 14,0 | 59,9 | TP | 4,28 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 383 | 1 640 | 14,0 | 59,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 170 | 65 | 18 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87g | I | 3,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 37 | 30 | IA | 33,78 | 0,71 | 0,6 | 3 | 363 | 1 450 | 9,1 | 36,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 363 | 1 450 | 9,1 | 36,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODR | BK | 10 | 33 | 8 | 12 | I | 34,87 | 0,40 | | 12 | 11 | 45 | 5,9 | 23,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 11 | 45 | 5,9 | 23,7 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, nerecznica, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 87h | I | 4,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 80 | 33 | 27 | II | 28,62 | 0,86 | 0,8 | 3 | 476 | 1 905 | 10,7 | 42,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz //torf niski //// POROL | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4 ha | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 1 905 | 10,7 | 42,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87i | I | 1,33 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 85 | 36 | 29 | IA | 31,10 | 1,04 | 0,8 | 3 | 364 | 485 | 7,6 | 10,1 | TP | 1,33 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 3 | 60 | 29 | 26 | IA | 33,06 | | KĘP | 3 | 129 | 170 | 3,8 | 5,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 655 | 11,4 | 15,2 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 87j | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 54 | 24 | 23 | IA | 31,63 | 0,31 | 0,2 | 33 | 121 | 95 | 5,2 | 4,1 | AGROT | 0,78 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | MJS | 54 | | | | | | --- | | | | | | ODN-IIP | 0,78 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JS | MJS | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 121 | 95 | 5,2 | 4,1 | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | JS | | | | | | | 0,60 | | | | | | | CZĘŚĆ | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //// POROL | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87~c | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 87** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 242** | | | | |
| | **I** | **22,67** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,41** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 240** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **2** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 242** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88a | I | 12,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 35 | 28 | IA | 30,11 | 1,13 | 0,9 | 3 | 528 | 6 415 | 11,2 | 136,4 | IIIA (30%)/1 | 2,85 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 0,90 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/1 | 0,90 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | IIIA (30%)/2 | 4,45 |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 1,34 |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/2 | 1,34 |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | TP | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | Razem: | | 528 | 6 415 | 11,2 | 136,4 | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | PODR | BK | 10 | 25 | | 8 | I | 33,98 | 0,10 | | 12 | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, malina właściwa | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,19 ha: OL 85 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 60 l., | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88b | I | 1,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 4 | 19 | 9 | 13 | I | 30,56 | 0,90 | 1,0 | 12 | 25 | 30 | 4,8 | 6,0 | TW | 1,24 |
| | | | TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; | | DB.S | 3 | 19 | 7 | 10 | I | 33,49 | | KĘP | | 10 | 10 | 2,5 | 3,1 | | |
| | | | Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 2 | 19 | | 8 | I | 36,15 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 19 | | 9 | I | 47,42 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WB | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | Razem: | | 35 | 40 | 7,3 | 9,0 | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie murszaste, mursz /piasek gliniasty //// POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PRZES | DB.S | | 150 | 56 | 27 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | Razem: | | 30 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 bagna o pow. 0,23 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 88c | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 22 | 9 | 11 | II | 27,70 | 1,30 | 1,0 | 11 | 119 | 115 | 12,7 | 12,2 | TW | 0,96 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 22 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 115 | 12,7 | 12,2 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, torf niski /gytia wapienna //piasek luźny //// POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | OL | | 60 | 24 | 23 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | ŚW | | 60 | 26 | 23 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88d | I | 2,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 60 | 31 | 26 | I | 29,87 | 0,77 | 1,0 | 3 | 397 | 975 | 11,0 | 27,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | JS | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, torf niski /gytia wapienna //piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 975 | 11,0 | 27,0 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,45 ha | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, turzyca | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 88f | I | 1,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 27 | 11 | 12 | IA | 30,05 | 0,96 | 1,0 | 11 | 130 | 245 | 9,4 | 17,7 | TW | 1,89 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 27 | 9 | 11 | II | 29,20 | | PAS | | 11 | 20 | 1,6 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 141 | 265 | 11,0 | 20,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 135 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88g | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 21 | 9 | 10 | IA | 31,31 | 0,90 | 1,0 | 12 | 76 | 60 | 7,9 | 6,4 | TW | 0,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 21 | | 7 | II | 27,51 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 76 | 60 | 7,9 | 6,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | DB.S | | 130 | 38 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: trawy, trzcinnik, rokiet | | SO | | 130 | 44 | 28 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 60 l., SO 130 l., DB.S 130 l., | | BRZ | | 60 | 22 | 21 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 18 | | | | |
| 88h | I | 1,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 13 | | 9 | I | 30,83 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,62 |
| | | | TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | 4 | 13 | | 6 | I | 33,36 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby stagnoglejowe właściwe, glina lekka /glina ciężka //piasek słabogliniasty //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | OL | | 90 | 32 | 24 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | DB.S | | 130 | 45 | 27 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 75 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,29 ha: DB.S 130 l., OL 90 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 88i | I | 2,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,9 | 3 | 261 | 560 | 6,5 | 13,9 | TP | 2,15 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 55 | 26 | 25 | IA | 33,39 | | WKĘP | 3 | 170 | 365 | 5,0 | 10,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 925 | 11,5 | 24,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88~a | III | 0,41 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88~b | III | 0,40 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88~c | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 88** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 943** | | | | |
| | **I** | **23,27** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,96** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 795** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **148** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 943** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89a | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 37 | 29 | IA | 31,91 | 0,72 | 0,6 | 3 | 261 | 285 | 6,0 | 6,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; | | OL | 2 | 80 | 41 | 28 | I | 29,50 | | DKĘP | 3 | 57 | 65 | 1,9 | 2,1 | | |
| | | | Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 80 | 32 | 26 | I | 27,82 | | | 3 | 34 | 35 | 0,4 | 0,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek luźny /piasek słabogliniasty //// | | JS | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 352 | 385 | 8,4 | 9,2 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89b | I | 7,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 34 | 16 | 17 | IA | 32,62 | 0,74 | 1,0 | 11 | 174 | 1 370 | 9,5 | 75,0 | TW | 7,88 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 34 | 15 | 17 | I | 29,28 | | KĘP | | 16 | 125 | 0,8 | 6,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 190 | 1 495 | 10,3 | 81,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | DB.S | | 110 | 44 | 21 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek darniowy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 89c | I | 3,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 27 | 12 | 14 | IA | 32,85 | 0,90 | 1,0 | 11 | 130 | 485 | 9,8 | 36,4 | TW | 3,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 27 | | 8 | III | 25,30 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 27 | 12 | 14 | I | 29,53 | | | | 16 | 60 | 0,9 | 3,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MD | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 146 | 545 | 10,7 | 39,9 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 135 l., AK 50 l., DB.S 50 l., BRZ 50 l., | PRZES | SO | | 135 | 42 | 24 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | | | DB | | 55 | 22 | 19 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | AK | | 55 | 20 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 55 | 24 | 21 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 51 | | | | |
| 89d | I | 3,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 21 | 9 | 10 | IA | 31,31 | 0,90 | 1,0 | 11 | 65 | 235 | 7,9 | 28,7 | TW | 3,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 21 | | 7 | II | 27,51 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 21 | | 5 | II | 29,17 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BRZ | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 65 | 235 | 7,9 | 28,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | DB.S | | 135 | 40 | 23 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | 135 | 40 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB.S | | 80 | 29 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 45 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 135 l., DB.S 135 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 89f | I | 3,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 15 | | 7 | IA | 31,54 | 0,90 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,11 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 15 | | 5 | II | 28,93 | | WKĘP | | | | | | TW | 2,60 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB.S | | 135 | 45 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 135 | 34 | 27 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 80 | 29 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | WZ | | 80 | 30 | 21 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 41 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 135 l., DB.S 135 l., DB.S 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89g | I | 2,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 10 | | 4 | IA | 30,38 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,96 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 10 | | 3 | I | 29,84 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PRZES | SO | | 135 | 40 | 27 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | | 135 | 44 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | | 80 | 31 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 80 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,08 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C bagno o pow. 0,08 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 135 l., DB.S 80 l., DB.S 135 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89h | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 64 | 28 | 24 | IA | 30,10 | 0,88 | 0,9 | 22 | 360 | 280 | 10,4 | 8,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 280 | 10,4 | 8,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89i | I | 0,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 11 | | 4 | I | 28,67 | 1,00 | 1,0 | 12 | | | | | CP | 0,67 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: | | DB.B | 1 | 11 | | 2 | III | 24,28 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | ZG | | BRZ | 1 | 11 | | 4 | I | 27,00 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89j | IV | 0,46 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | DB.S | | 135 | 44 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Informacje: REF | | OL | | 80 | 32 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | 15 | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 89k | I | 1,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 0,68 | 0,5 | 3 | 147 | 235 | 4,2 | 6,6 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | 2 | 75 | 32 | 25 | I | 27,42 | | WKĘP | 3 | 57 | 90 | 0,8 | 1,3 | | |
| | | | ZG | | SO | 3 | 60 | 28 | 24 | IA | 31,05 | | | 3 | 79 | 125 | 2,7 | 4,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 283 | 450 | 7,6 | 12,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 89l | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 12 | | 8 | I | 30,63 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,16 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | 2 | 12 | | 5 | I | 32,53 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | PJD | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //pył zwykły ///piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89~a | III | 0,35 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89~b | III | 0,52 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 80 | 32 | 27 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 80 | 37 | 27 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 75 | 29 | 27 | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 75 | 28 | 24 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 17 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 89** | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **28,54** | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | **Grubizna ogółem:** | **3 646** | | | | | | |
| | **I** | **27,21** | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,87** | **I - drzewostany:** | **3 390** | | | | | | |
| | **IV** | **0,46** | **I - przestoje:** | **219** | | | | | | |
| | | | **razem:** | **3 609** | | | | | | |
| | | | **III - zadrzewienia:** | **17** | | | | | | |
| | | | **IV - zadrzewienia:** | **20** | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90a | I | 1,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 5 | 65 | 24 | 25 | I | 28,90 | 0,76 | 0,7 | 4 | 142 | 205 | 2,6 | 3,8 | TP | 1,45 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: | | OL | 3 | 65 | 30 | 27 | I | 30,08 | | DKĘP | 3 | 109 | 160 | 3,3 | 4,7 | | |
| | | | CZ ZG | | DB.S | 1 | 65 | 23 | 22 | II | 27,54 | | | 4 | 27 | 40 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 40 | 14 | 15 | I | 31,84 | | | 4 | 16 | 25 | 1,1 | 1,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 430 | 8,0 | 11,5 | | |
| | | | POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,16 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90b | II | 0,83 | Rodzaj powierzchni: RETENCJA | PRZES | OL | | 65 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB | | BRZ | | 65 | 27 | 25 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | | 65 | 30 | 24 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | | 16 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 90c | I | 4,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 4,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.S | 3 | 17 | | 5 | II | 27,00 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | OL | 1 | 20 | 8 | 11 | II | 28,58 | | | | 10 | 40 | 1,1 | 4,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 10 | 40 | 1,1 | 4,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 130 | 38 | 28 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 95 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB.S | | 55 | 21 | 19 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | Razem: | | | 56 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90d | I | 1,46 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 32 | 28 | IA | 32,78 | 0,84 | 0,8 | 23 | 403 | 590 | 10,4 | 15,1 | TP | 1,46 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z | | OL | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 590 | 10,4 | 15,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, wiechlina | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 90f | I | 2,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 38 | 29 | I | 29,00 | 0,67 | 0,5 | 3 | 313 | 875 | 6,9 | 19,2 | IIIAU (90%) | 2,80 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | SO | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,93 |
| | | | TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,93 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | CW | 0,87 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | JW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 875 | 6,9 | 19,2 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODR | DB.S | 10 | 6 | | 1 | II | 26,80 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | JW | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | PODSZ | DER.B | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,87 ha: DB.S 6 l., | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90g | I | 5,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 30 | 26 | IA | 31,87 | 1,00 | 0,8 | 23 | 371 | 1 970 | 9,5 | 50,3 | TP | 5,31 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | ŚW | 1 | 65 | 24 | 24 | I | 31,61 | | KĘP | | 44 | 235 | 1,5 | 8,0 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 1 | 65 | 26 | 24 | II | 27,70 | | | | 38 | 200 | 1,2 | 6,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | WZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | WB | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 2 405 | 12,2 | 64,6 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nawłoć, nerecznica | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: JS 15 l., WZ 15 l., | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 90h | I | 2,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 4 | 60 | 17 | 17 | III | 19,94 | 0,87 | 0,6 | 4 | 72 | 170 | 2,1 | 5,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 75 | 32 | 26 | I | 29,83 | | KĘP | 3 | 61 | 145 | 2,0 | 4,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 2 | 75 | 25 | 24 | II | 26,42 | | | 3 | 50 | 120 | 1,0 | 2,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | 2 | 100 | 35 | 26 | II | 26,00 | | | 3 | 66 | 155 | 2,0 | 4,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | WZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia | | JW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | DB.S | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: niecierpek, rokiet | | | | | | | | | | Razem: | | 249 | 590 | 7,0 | 16,5 | | |
| | | | PNSW: w części E bagno o pow. 0,09 ha | PODSZ | AK | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90i | I | 2,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 36 | 17 | 18 | IA | 32,82 | 0,69 | 0,9 | 22 | 131 | 285 | 7,1 | 15,5 | TP | 2,19 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 2 | 36 | 17 | 17 | I | 28,35 | | GRP | | 33 | 70 | 1,4 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 36 | 17 | 18 | II | 25,12 | | | | 11 | 25 | 0,6 | 1,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | MD | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 175 | 380 | 9,1 | 20,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, niecierpek, malina właściwa | PRZES | DB.S | | 100 | 37 | 25 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 90j | I | 1,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 28 | 25 | IA | 30,87 | 0,97 | 0,9 | 22 | 414 | 735 | 11,3 | 20,0 | TP | 1,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 735 | 11,3 | 20,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90k | I | 1,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 33 | 13 | 15 | IA | 30,68 | 0,59 | 1,0 | 13 | 131 | 160 | 8,5 | 10,3 | TW | 1,22 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 33 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | MD | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 131 | 160 | 8,5 | 10,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90~a | III | 0,17 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | BRZ | | 65 | 24 | 23 | | | | | 4 | | 3 | | | DRZEW (100%) | |
| | | | Informacje: L. proj. | | OL | | 65 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| 90~c | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 90** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 307** | | | | |
| | **I** | **22,67** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,83** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 205** | | | | |
| | **III** | **0,58** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **81** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **16** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 302** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **5** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) | | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) | | | Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91a | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 36 | 16 | 16 | IA | 30,46 | 1,11 | 0,9 | 12 | 240 | 225 | 12,0 | 11,2 | TP | 0,93 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 29 | 16 | 15 | I | 29,56 | | WKĘP | | 22 | 20 | 1,1 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 245 | 13,1 | 12,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 11 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91b | I | 2,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 85 | 27 | 24 | I | 26,13 | 0,87 | 0,8 | 3 | 305 | 770 | 7,6 | 19,3 | IB (90%) | 2,53 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 55 | 21 | 22 | IA | 30,32 | | WKĘP | 4 | 35 | 90 | 1,1 | 2,7 | AGROT | 2,53 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,53 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KL | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | DB.S | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 340 | 860 | 8,7 | 22,0 | | |
| | | | Gosp.: OS | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 91c | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 29 | 24 | I | 27,84 | 1,06 | 0,8 | 3 | 385 | 425 | 9,7 | 10,7 | TP | 1,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 49 | 21 | 20 | IA | 30,01 | | WKĘP | 4 | 34 | 40 | 1,3 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 465 | 10,9 | 12,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91d | I | 0,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 25 | 23 | I | 28,86 | 0,87 | 0,9 | 12 | 338 | 270 | 10,0 | 8,0 | TP | 0,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | TP | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | LP | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 338 | 270 | 10,0 | 8,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | JW | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 91f | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 50 | 25 | 22 | IA | 31,80 | 0,91 | 0,9 | 23 | 339 | 460 | 11,7 | 15,9 | TP | 1,36 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO.C | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 460 | 11,7 | 15,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 6 | 19 | | 5 | I | 32,20 | 0,50 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | DB.S | 3 | 19 | | 5 | III | 25,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | 1 | 19 | | 9 | II | 26,79 | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91g | I | 4,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 50 | 20 | 20 | I | 29,69 | 0,76 | 0,9 | 22 | 153 | 700 | 6,8 | 31,0 | TP | 4,56 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 33 | 15 | 15 | IA | 30,68 | | WKĘP | | 49 | 225 | 2,0 | 9,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | 1 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | | | | 33 | 150 | 0,9 | 3,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO.C | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// POROL | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | ŚW | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KL | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB.S | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 235 | 1 075 | 9,7 | 44,3 | | |
| | | | Gosp.: OS | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE luka o pow. 0,07 ha | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 91h | I | 0,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 33 | 25 | I | 26,37 | 1,04 | 0,8 | 3 | 423 | 300 | 9,5 | 6,7 | TP | 0,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 423 | 300 | 9,5 | 6,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91i | I | 2,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 56 | 23 | 23 | IA | 31,08 | 0,97 | 0,8 | 22 | 342 | 1 000 | 10,6 | 31,0 | TP | 2,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 80 | 32 | 25 | I | 27,95 | | WKĘP | | 39 | 115 | 1,0 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | OS | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 1 115 | 11,6 | 33,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: KL 10 l., OS 10 l., SO 30 l., OS 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 91j | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 0,8 | 11 | | | | | CW | 0,90 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 6 | | 3 | I | 36,88 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | AK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91k | I | 3,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 56 | 23 | 23 | IA | 31,08 | 1,12 | 0,9 | 13 | 364 | 1 370 | 10,5 | 39,5 | TP | 3,77 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 2 | 56 | 22 | 22 | II | 25,91 | | WKĘP | | 50 | 190 | 1,6 | 5,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 1 560 | 12,0 | 45,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91l | I | 0,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 10 | 10 | I | 28,30 | 1,21 | 1,0 | 11 | 97 | 80 | 10,3 | 8,3 | TW | 0,80 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 25 | 13 | 13 | I | 29,57 | | DKĘP | | 16 | 15 | 1,2 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | 1 | 25 | 12 | 11 | IV | 19,16 | | | | 11 | 10 | 0,7 | 0,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 124 | 105 | 12,2 | 9,7 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PRZES | SO | | 130 | 36 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 91m | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 1,53 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 8 | | 2 | II | 29,18 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DER.Ś | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | JRZ | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JW | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | KL.P | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SZK | MJS | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 97 | 29 | 23 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 97 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91n | I | 1,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 60 | 25 | 23 | IA | 30,04 | 1,04 | 0,9 | 23 | 287 | 550 | 8,3 | 16,0 | TP | 1,92 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 80 | 29 | 25 | I | 27,95 | | WKĘP | | 77 | 150 | 2,1 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | 1 | 33 | 15 | 16 | I | 28,57 | | | | 22 | 40 | 1,0 | 1,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 740 | 11,4 | 21,9 | | |
| | | | POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91~a | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 91** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 245** | | | | |
| | **I** | **23,84** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,14** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 195** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **50** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 245** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92a | I | 0,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 24 | 23 | I | 28,64 | 0,84 | 0,8 | 12 | 327 | 315 | 9,6 | 9,3 | TP | 0,97 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 327 | 315 | 9,6 | 9,3 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92b | I | 2,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 24 | 23 | I | 28,64 | 1,04 | 0,9 | 12 | 403 | 1 020 | 11,2 | 28,4 | TP | 2,53 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.C | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 1 020 | 11,2 | 28,4 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W luka o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: Miejsce postoju pojazdów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92c | I | 2,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 52 | 18 | 18 | I | 26,94 | 1,07 | 0,9 | 12 | 287 | 640 | 10,4 | 23,1 | TP | 2,23 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 65 | 26 | 22 | I | 27,85 | | WKĘP | | 33 | 75 | 1,1 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | PJD | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 320 | 715 | 11,5 | 25,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, chrobotki | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92d | I | 0,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 14 | 14 | I | 28,45 | 1,03 | 0,9 | 12 | 207 | 120 | 11,9 | 6,9 | TP | 0,58 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 120 | 11,9 | 6,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92f | I | 2,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 83 | 26 | 22 | II | 24,44 | 1,02 | 0,9 | 3 | 364 | 890 | 9,2 | 22,6 | TP | 2,45 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 890 | 9,2 | 22,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92g | I | 2,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 24 | 22 | I | 27,85 | 0,97 | 0,9 | 12 | 327 | 770 | 9,5 | 22,3 | TP | 2,36 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 90 | 34 | 24 | II | 25,37 | | WKĘP | | 33 | 80 | 0,9 | 2,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | AK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | KL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 850 | 10,3 | 24,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 92h | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 37 | 16 | 16 | IA | 30,01 | 0,93 | 0,9 | 13 | 142 | 115 | 7,0 | 5,6 | TP | 0,81 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 4 | 37 | 17 | 18 | I | 29,07 | | WKĘP | | 76 | 60 | 3,6 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | OS | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | JW | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny //// POROL | | DB.B | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WB | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 218 | 175 | 10,5 | 8,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92i | I | 0,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 68 | 25 | 23 | I | 28,21 | 0,95 | 0,9 | 13 | 327 | 220 | 9,3 | 6,2 | TP | 0,67 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 32 | 13 | 12 | I | 27,24 | | KĘP | | 16 | 10 | 1,1 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 343 | 230 | 10,4 | 6,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92j | IV | 0,08 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 92** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 315** | | | | |
| | **I** | **12,60** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **IV** | **0,08** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 315** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 315** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **0,97** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **315** | | | | |
| | **I** | **0,97** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **315** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,71** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | | **4 000** | | | | |
| | **I** | **11,63** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **IV** | **0,08** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | | **4 000** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | | **4 000** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93a | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 30 | 24 | II | 25,37 | 0,97 | 0,9 | 2 | 376 | 295 | 8,8 | 6,9 | IB (90%) | 0,79 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OS | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,79 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 0,79 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 376 | 295 | 8,8 | 6,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93b | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 34 | 25 | I | 28,84 | 0,97 | 0,9 | 2 | 408 | 410 | 10,3 | 10,4 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 410 | 10,3 | 10,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 93c | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,87 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 7 | | 3 | I | 32,77 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | PRZES | SO | | 75 | 33 | 23 | | | | | 2 | | 50 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 75 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93d | I | 0,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 31 | 25 | I | 28,84 | 0,93 | 0,9 | 3 | 317 | 80 | 8,0 | 2,0 | TP | 0,25 |
| | | | TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 30 | 12 | 12 | I | 28,29 | | KĘP | 4 | 28 | 5 | 2,2 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 345 | 85 | 10,2 | 2,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93f | IV | 0,04 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93g | IV | 1,03 | Rodzaj powierzchni: R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93h | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 24 | 20 | II | 25,79 | 0,79 | 0,9 | 11 | 262 | 280 | 8,6 | 9,2 | TP | 1,07 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 280 | 8,6 | 9,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93i | I | 1,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 18 | 17 | I | 28,04 | 0,89 | 0,9 | 11 | 241 | 315 | 10,5 | 13,7 | TP | 1,30 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 241 | 315 | 10,5 | 13,7 | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93j | IV | 0,21 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | ZADRZEW | SO | 10 | 29 | 11 | 10 | II | 25,89 | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| 93k | I | 0,33 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 29 | 12 | 12 | I | 28,85 | 0,92 | 0,9 | 11 | 108 | 35 | 7,7 | 2,5 | TW | 0,33 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 29 | 14 | 13 | I | 26,90 | | DKĘP | | 32 | 10 | 2,6 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | ŚW | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 140 | 45 | 10,3 | 3,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93l | I | 2,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 44 | 16 | 15 | I | 26,08 | 0,83 | 0,9 | 11 | 164 | 350 | 8,5 | 18,0 | TP | 2,12 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 44 | 22 | 20 | II | 25,69 | | WKĘP | | 22 | 45 | 0,7 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | OS | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 186 | 395 | 9,2 | 19,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l., | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | SO | | 130 | 36 | 22 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 93m | I | 2,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,12 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 7 | | 4 | I | 38,01 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | PRZES | SO | | 102 | 30 | 22 | | | | | 2 | | 30 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, modrzaczek siny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 102 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 93** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **11,29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **1 937** | | | | |
| | **I** | **9,86** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,15** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **1 825** | | | | |
| | **IV** | **1,28** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **110** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **1 935** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **2** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 94a | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 28 | 25 | IA | 32,06 | 0,90 | 0,9 | 11 | 386 | 785 | 11,3 | 22,8 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 785 | 11,3 | 22,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 20 | | 4 | II | 26,29 | 0,10 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94b | I | 1,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 56 | 24 | 23 | IA | 31,08 | 0,89 | 0,9 | 12 | 320 | 565 | 10,0 | 17,6 | TP | 1,76 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 56 | 24 | 23 | I | 28,60 | | GRP | | 22 | 40 | 0,7 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 605 | 10,7 | 18,7 | | |
| | | | Gleba: Rędziny próchniczne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny i słabogliniasty //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94c | I | 3,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 28 | 24 | I | 28,81 | 0,94 | 0,9 | 11 | 382 | 1 480 | 10,3 | 40,0 | TP | 3,88 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 1 480 | 10,3 | 40,0 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 94d | I | 3,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 61 | 39 | 25 | IA | 31,81 | 1,08 | 0,9 | 11 | 207 | 675 | 6,4 | 20,7 | TP | 3,25 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 4 | 61 | 28 | 24 | I | 30,15 | | DKĘP | | 174 | 565 | 5,4 | 17,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 130 | 45 | 26 | III | 22,96 | | | | 44 | 145 | 1,0 | 3,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Rędziny próchniczne, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 425 | 1 385 | 12,7 | 41,2 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny i | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | słabogliniasty //// | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, konwalia majowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94f | I | 4,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 49 | 22 | 21 | IA | 31,07 | 1,22 | 0,9 | 11 | 383 | 1 535 | 12,8 | 51,5 | TP | 4,01 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 49 | 21 | 21 | I | 30,41 | | GRP | | 33 | 130 | 1,4 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Rędziny próchniczne, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | CIS | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny i | | | | | | | | | | Razem: | | 416 | 1 665 | 14,2 | 57,1 | | |
| | | | słabogliniasty //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94g | I | 2,52 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 39 | 19 | 18 | IA | 31,47 | 0,88 | 0,9 | 12 | 251 | 635 | 11,6 | 29,2 | TP | 2,52 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 39 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 635 | 11,6 | 29,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, konwalia majowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 94h | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 24 | 23 | I | 27,80 | 0,90 | 0,9 | 11 | 349 | 380 | 9,7 | 10,6 | TP | 1,09 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | Razem: | | | 349 | 380 | 9,7 | 10,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | PRZES | SO | | 180 | 67 | 20 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | Razem: | | | | 10 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94i | I | 0,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 56 | 22 | 21 | I | 29,02 | 0,70 | 0,9 | 11 | 188 | 120 | 7,1 | 4,5 | TP | 0,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 65 | 30 | 23 | I | 28,86 | | WKĘP | | 66 | 40 | 1,7 | 1,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | Razem: | | | 254 | 160 | 8,8 | 5,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94j | I | 2,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 37 | 18 | 17 | IA | 31,19 | 1,14 | 0,9 | 11 | 185 | 430 | 9,7 | 22,6 | TP | 2,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 37 | 18 | 18 | I | 29,07 | | GRP | | 60 | 140 | 2,1 | 4,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | 1 | 37 | 15 | 14 | II | 27,82 | | | | 22 | 50 | 1,0 | 2,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | Razem: | | | 267 | 620 | 12,8 | 29,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94k | I | 0,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 90 | 33 | 26 | II | 26,84 | 1,10 | 0,9 | 3 | 470 | 70 | 9,2 | 1,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | BRZ | 1 | 90 | 37 | 25 | II | 25,81 | | GRP | 3 | 35 | 5 | 0,4 | 0,1 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 1 | 60 | 26 | 21 | III | 26,04 | | | 4 | 23 | 5 | 1,2 | 0,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | | | | | | | | | Razem: | | 528 | 80 | 10,8 | 1,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | PRZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, kuklik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94l | IV | 2,07 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | SO | | 130 | 63 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 70 | 26 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 70 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | OL | | 30 | 14 | 15 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | DB | | 30 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 30 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 30 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 65 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | BEZ.C | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94m | I | 6,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 33 | 26 | I | 28,12 | 1,07 | 0,9 | 3 | 458 | 2 765 | 10,3 | 62,4 | TP | 6,04 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | CZ ZG | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | ŚW | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | CZĘŚĆ | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | LP | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 2 765 | 10,3 | 62,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E luka o pow. 0,17 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 94n | IV | 0,12 | Rodzaj powierzchni: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94~a | III | 0,36 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 94** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 635** | | | | |
| | **I** | **27,68** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,49** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 560** | | | | |
| | **IV** | **2,19** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **10** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 570** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **65** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95a | I | 3,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 39 | 21 | 20 | IA | 33,72 | 0,95 | 0,9 | 11 | 218 | 800 | 10,4 | 38,3 | TP | 3,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | DB.B | 1 | 39 | 19 | 19 | I | 31,84 | | GRP | | 33 | 120 | 1,2 | 4,3 | | |
| | | | ZG | | BRZ | 1 | 39 | 21 | 20 | I | 30,51 | | | | 33 | 120 | 0,9 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OS | PJD | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 284 | 1 040 | 12,5 | 45,9 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95b | I | 5,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 14 | | 6 | IA | 30,37 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | TW | 5,79 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 2 | 14 | | 5 | I | 43,19 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 26 | | 8 | II | 25,85 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | BK | | 150 | 52 | 23 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | SO | | 150 | 46 | 26 | | | | | 2 | | 80 | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | DB.B | | 150 | 46 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | 80 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | 80 | 27 | 20 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | Razem: | | | 146 | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: DB.B 150 l., SO 150 l., BK 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ŚW 80 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 150 l., DB.B 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95c | I | 5,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 3,55 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 19 | | 6 | II | 27,30 | | KĘP | | | | | | CP | 2,40 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PRZES | SO | | 149 | 39 | 28 | | | | | 2 | | 40 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | | OL | | 59 | 25 | 20 | | | | | 4 | | 30 | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB.S | | 59 | 23 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | 59 | 23 | 21 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | 65 | 25 | 21 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 82 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 149 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części W kępa o pow. 0,19 ha: BK 59 l., ŚW 65 l., OL 59 l., SO 149 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DB.S 59 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 95d | I | 5,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | IP | SO | 10 | 150 | 38 | 28 | II | 23,17 | 0,57 | 0,7 | 3 | 220 | 1 270 | 3,9 | 22,3 | IIIAU (90%) | 5,77 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | PJD | 150 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,57 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 3,57 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | CP | 2,20 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | OL | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 220 | 1 270 | 3,9 | 22,3 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany; gospodarczy drzewostan nasienny | IIP | DB.S | 5 | 40 | 15 | 15 | II | 27,70 | 0,43 | 0,7 | 4 | 35 | 200 | 2,7 | 15,3 | | |
| | | | | | DB.S | 5 | 55 | 19 | 19 | II | 27,03 | | DKĘP | 4 | 46 | 265 | 3,0 | 17,1 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,74 ha: DB.S 13 l., | | | | | | | | | | Razem: | | 81 | 465 | 5,6 | 32,4 | | |
| | | | w części N gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: KL 13 l., JW 13 l., BK 13 l., DB.S 13 l., | PODR | DB.S | 8 | 13 | | 3 | II | 25,77 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | | | KL | 2 | 13 | | 4 | IV | 19,53 | | | | | | | | | |
| | | | | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95f | I | 1,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 100 | 36 | 27 | I | 27,00 | 1,04 | 0,9 | 3 | 337 | 575 | 6,3 | 10,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 3 | 80 | 31 | 24 | III | 25,99 | | WKĘP | 3 | 112 | 190 | 3,2 | 5,5 | | |
| | | | | | DB.B | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | WZ | PJD | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JS | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 449 | 765 | 9,6 | 16,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95~a | III | 0,37 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Podsumowanie dla oddziału: 95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **3 768** | | | | |
| | **I** | **22,90** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,50** | | | | | | | | | | | | | | **3 540** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **228** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **3 768** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96a | I | 0,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 24 | 25 | IA | 31,57 | 0,92 | 0,9 | 12 | 392 | 295 | 11,2 | 8,4 | TP | 0,75 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | PJD | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 295 | 11,2 | 8,4 | | |
| | | | | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96b | I | 1,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 95 | 38 | 29 | I | 29,65 | 0,54 | 0,7 | 3 | 151 | 255 | 3,7 | 6,2 | IIIAU (90%) | 1,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 3 | 95 | 35 | 28 | II | 28,89 | | DKĘP | 3 | 87 | 145 | 2,2 | 3,7 | AGROT | 1,18 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 95 | 36 | 27 | II | 28,01 | | | 3 | 35 | 60 | 1,0 | 1,6 | ODN-ZŁOŻ | 1,18 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | CW | 0,50 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | PJD | 155 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | PJD | 155 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 460 | 6,8 | 11,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | PODS | DB.S | 10 | 4 | | | | | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,5 ha: DB.S 4 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 96c | I | 6,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 50 | 22 | 22 | IA | 31,80 | 0,97 | 0,9 | 12 | 361 | 2 255 | 12,3 | 76,6 | TP | 6,25 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 361 | 2 255 | 12,3 | 76,6 | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,18 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96d | I | 4,49 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 34 | 18 | 17 | IA | 32,62 | 1,13 | 0,9 | 11 | 218 | 980 | 11,5 | 51,7 | TW | 4,49 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 34 | 16 | 15 | I | 30,06 | | DKĘP | | 44 | 200 | 2,2 | 10,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚW | MJS | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 1 180 | 13,8 | 61,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 96f | I | 3,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 8 | | 4 | IA | 34,63 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 3,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 24 | 8 | 8 | II | 27,05 | | KĘP | | 5 | 20 | 1,9 | 7,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | GB | PJD | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | | BRZ | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚW | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | Razem: | | 5 | 20 | 1,9 | 7,1 | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | PUN, WDN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 154 | 45 | 28 | | | | | 2 | | 60 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | 154 | 60 | 20 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | SO | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,24 ha: ŚW 70 l., SO 50 l., DB.S 50 l., | | ŚW | | 70 | 24 | 20 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | SO 154 l., | | DB.S | | 50 | 20 | 18 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 76 | | | | |
| 96g | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 3 | 8 | | 2 | II | 24,80 | 0,70 | 0,7 | 12 | | | | | CP | 0,27 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | GB | 1 | 8 | | 1 | II | 27,96 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 24 | | 7 | III | 25,51 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | 2 | 32 | 15 | 15 | II | 27,31 | | | | 5 | 5 | 1,6 | 0,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | | BRZ | 2 | 32 | 14 | 13 | II | 25,29 | | | | 5 | 5 | 1,3 | 0,7 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BRZ | 1 | 50 | 19 | 18 | II | 24,76 | | | | 10 | 5 | 0,6 | 0,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 20 | 15 | 3,5 | 1,9 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | WB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | PRZES | BRZ | | 130 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 96h | I | 2,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 2 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 1,84 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 13 | | 4 | II | 28,75 | | WKĘP | | | | | | CP | 1,11 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 13 | | 4 | I | 40,21 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z | PRZES | SO | | 155 | 46 | 28 | | | | | 2 | | 40 | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | | 70 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | | 55 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | 55 | 23 | 21 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,3 ha: ŚW 55 l., OL 55 l., BK 70 l., SO 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96i | I | 0,51 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 80 | 29 | 22 | III | 24,22 | 0,95 | 0,9 | 4 | 249 | 125 | 6,2 | 3,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z | | BRZ | 2 | 45 | 17 | 17 | II | 25,05 | | DKĘP | 4 | 34 | 15 | 1,5 | 0,8 | | |
| | | | TD: ZG | | OL | 1 | 45 | 18 | 18 | II | 26,38 | | | 4 | 23 | 10 | 1,0 | 0,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 150 | 8,8 | 4,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 155 | 50 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 96j | I | 1,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 155 | 46 | 28 | II | 22,80 | 1,03 | 0,9 | 2 | 232 | 415 | 2,9 | 5,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 2 | 110 | 51 | 27 | III | 25,23 | | GRP | 3 | 86 | 155 | 2,6 | 4,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 2 | 90 | 33 | 27 | II | 29,13 | | | 3 | 71 | 125 | 2,9 | 5,1 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | 1 | 70 | 23 | 22 | II | 29,26 | | | 4 | 20 | 35 | 1,4 | 2,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | BK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 409 | 730 | 9,8 | 17,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany; gospodarczy drzewostan nasienny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N bagno o pow. 0,24 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96~a | III | 0,03 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96~b | III | 0,40 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 62 | 20 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 96** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 253** | | | | |
| | **I** | **22,64** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,43** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 105** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **143** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 248** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **5** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97a | I | 3,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 52 | 22 | 21 | IA | 30,14 | 0,91 | 0,9 | 12 | 287 | 860 | 8,9 | 26,8 | TP | 3,00 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 1 | 52 | 19 | 19 | II | 31,05 | | GRP | | 22 | 65 | 1,4 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 35 | 14 | 13 | I | 32,12 | | | | 6 | 20 | 1,2 | 3,7 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | JD | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | JD | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 315 | 945 | 11,6 | 34,7 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | JD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | BK | | 130 | 52 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 130 | 42 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| 97b | I | 6,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 39 | 20 | 19 | IA | 32,60 | 0,89 | 0,9 | 12 | 229 | 1 375 | 10,8 | 65,1 | TP | 6,00 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | 1 | 39 | 22 | 22 | I | 34,93 | | KĘP | | 44 | 265 | 1,2 | 7,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 1 640 | 12,0 | 72,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97c | IV | 0,95 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | BRZ | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 97d | I | 4,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 11 | | 5 | IA | 31,99 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 4,24 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 11 | | 5 | I | 54,09 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 26 | | 8 | II | 25,85 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PRZES | SO | | 150 | 35 | 28 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 150 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97f | I | 4,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 63 | 25 | 25 | IA | 31,33 | 1,11 | 0,9 | 11 | 360 | 1 680 | 8,9 | 41,5 | TP | 4,66 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 63 | 25 | 23 | II | 28,84 | | DKĘP | | 87 | 405 | 3,9 | 18,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //// | | CZM.P | PJD | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | MD | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 2 085 | 12,8 | 59,8 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97g | I | 0,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 21 | 19 | IA | 32,18 | 0,99 | 0,9 | 12 | 305 | 215 | 12,9 | 9,0 | TP | 0,70 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 215 | 12,9 | 9,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 97h | I | 4,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 150 | 44 | 28 | II | 23,17 | 0,51 | 0,9 | 2 | 197 | 900 | 3,6 | 16,3 | IIIAU (90%) | 4,57 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | PJD | 150 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 3,22 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 3,22 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | CP | 1,35 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | | 197 | 900 | 3,6 | 16,3 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODR | DB.S | 10 | 12 | | 1 | IV | 16,54 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany; gospodarczy drzewostan nasienny | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,35 ha: DB.S 12 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97i | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 42 | 20 | 21 | IA | 33,57 | 0,95 | 0,9 | 12 | 252 | 405 | 10,3 | 16,6 | TP | 1,61 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | 1 | 42 | 22 | 21 | I | 30,46 | | DKĘP | | 33 | 55 | 0,9 | 1,4 | | |
| | | | | | SO | 1 | 32 | 15 | 15 | IA | 31,20 | | | | 22 | 35 | 1,2 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | ŚW | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 307 | 495 | 12,4 | 20,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97j | I | 0,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 20 | 19 | IA | 32,18 | 0,89 | 0,9 | 11 | 273 | 225 | 11,9 | 9,8 | TP | 0,82 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 273 | 225 | 11,9 | 9,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 97~a | III | 0,48 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97~b | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 97** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 590** | | | |
| | **I** | **25,60** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **III** | **0,71** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 505** | | | |
| | **IV** | **0,95** | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **60** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 565** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **25** | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98a | I | 9,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 40 | 20 | 19 | IA | 32,18 | 0,99 | 0,9 | 12 | 305 | 2 825 | 12,9 | 119,1 | TP | 9,26 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | DB.B | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 2 825 | 12,9 | 119,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98b | I | 2,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 33 | 18 | 17 | IA | 33,14 | 0,79 | 0,9 | 12 | 207 | 555 | 11,3 | 30,2 | TW | 2,68 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | MD | MJS | 33 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | ŚW | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 555 | 11,3 | 30,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 98c | I | 4,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 15 | | 5 | I | 26,52 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 4,14 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 2 | 15 | | 5 | I | 40,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 27 | | 8 | III | 25,30 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BK | PJD | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | DB.C | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | PRZES | SO | | 146 | 29 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: BK 80 l., DB.S 80 l., SO 146 l., | | DB | | 80 | 20 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | BK | | 80 | 22 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| 98d | I | 2,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 22 | 8 | 8 | I | 26,96 | 1,00 | 1,0 | 11 | 54 | 125 | 8,4 | 19,4 | TW | 2,32 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 22 | | 7 | II | 26,81 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 54 | 125 | 8,4 | 19,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 125 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | 125 | 49 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | DB.B | | 125 | 50 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: DB.B 125 l., BK 125 l., SO 125 l., | | JW | | 125 | 44 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,1 ha: DB.B 125 l., SO 125 l., BK 125 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 65 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 98f | I | 3,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 7 | | 3 | IA | 32,76 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,14 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 15 | | 6 | I | 30,99 | | KĘP | | | | | | CP | 1,42 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 15 | | 6 | I | 45,45 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BRZ | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 122 | 34 | 27 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 122 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98g | I | 3,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 2 | | | | | 0,40 | 0,0 | 11 | | | | | PIEL | 2,33 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 13 | | 4 | II | 28,75 | | WKĘP | | | | | | CP | 1,31 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 13 | | 4 | I | 40,21 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 145 | 40 | 25 | | | | | 3 | | 60 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.B | | 145 | 38 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | BK | | 70 | 30 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 75 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: DB.B 145 l., SO 145 l., w części E kępa o pow. 0,12 ha: DB.B 145 l., SO 145 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98~a | III | 0,39 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98~b | III | 0,30 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 98** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **3 735** | | | | |
| | **I** | **25,60** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,69** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 505** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **230** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **3 735** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99a | I | 2,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 25 | 25 | IA | 33,39 | 0,93 | 0,9 | 12 | 397 | 1 165 | 12,1 | 35,5 | TP | 2,93 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.B | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BK | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 1 165 | 12,1 | 35,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99b | I | 3,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 36 | 27 | I | 27,00 | 0,75 | 0,7 | 3 | 324 | 1 275 | 7,1 | 28,1 | IIIAU (90%) | 3,93 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,82 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,82 |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | CP | 1,11 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | | | | | | | | | Razem: | | 324 | 1 275 | 7,1 | 28,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODR | DB.B | 7 | 8 | | 3 | I | 33,56 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | 3 | 8 | | 3 | I | 53,30 | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,11 ha: BK 9 l., DB.B 8 l., | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99c | I | 1,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 32 | 16 | 15 | IA | 31,20 | 0,94 | 0,9 | 11 | 207 | 240 | 12,1 | 14,1 | TW | 1,17 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 32 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 240 | 12,1 | 14,1 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 99d | I | 3,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 27 | 13 | 12 | IA | 30,05 | 1,34 | 1,0 | 11 | 141 | 520 | 11,9 | 44,0 | TW | 3,69 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 27 | 11 | 10 | II | 27,98 | | KĘP | | 32 | 120 | 1,9 | 6,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 173 | 640 | 13,8 | 51,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 140 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.B | | 50 | 21 | 16 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | BK | | 50 | 21 | 16 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l., | | BK | | 140 | 45 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 140 l., | | BK | | 80 | 25 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB.B 50 l., BK 50 l., SO 50 l., BK 80 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| 99f | I | 2,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 9 | | 4 | IA | 32,33 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,48 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 9 | | 6 | I | 72,42 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 23 | 9 | 9 | II | 29,10 | | | | 5 | 10 | 2,2 | 5,5 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty | | | | | | | | | | Razem: | | 5 | 10 | 2,2 | 5,5 | | |
| | | | ///piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 139 | 40 | 28 | | | | | 2 | | 35 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BK | | 50 | 19 | 15 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | uprawa po rębni złożonej | | DB.S | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | 90 | 38 | 25 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 50 l., BK 50 l., SO 139 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 139 l., BK 90 l., DB.S 50 l., BK 50 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 99g | I | 1,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 20 | 9 | 9 | IA | 30,42 | 1,00 | 1,0 | 11 | 70 | 120 | 8,2 | 13,9 | TW | 1,69 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 20 | 9 | 9 | I | 31,28 | | WKĘP | | 20 | 35 | 2,4 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 90 | 155 | 10,6 | 17,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 140 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, rokiet | | DB.B | | 120 | 45 | 19 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 140 l., DB.B 120 l., BK 140 l., | | BK | | 140 | 52 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | DB 60 l., | | DB.B | | 60 | 16 | 15 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| 99h | I | 2,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 32 | 16 | 16 | IA | 32,45 | 1,03 | 0,9 | 11 | 185 | 385 | 10,7 | 22,4 | TW | 2,09 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 32 | 15 | 15 | I | 30,97 | | DKĘP | | 38 | 80 | 2,1 | 4,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BK | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 223 | 465 | 12,8 | 26,8 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | BK | | 122 | 48 | 21 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.B | | 70 | 22 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| 99i | I | 4,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 25 | 24 | IA | 31,56 | 1,02 | 0,9 | 11 | 419 | 2 035 | 12,3 | 59,7 | TP | 4,86 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 2 035 | 12,3 | 59,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 99j | I | 2,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 35 | 19 | 19 | IA | 34,46 | 0,68 | 0,9 | 12 | 207 | 460 | 10,4 | 23,3 | TP | 2,23 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 460 | 10,4 | 23,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99k | I | 3,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 42 | 19 | 19 | IA | 31,38 | 1,06 | 0,9 | 11 | 273 | 925 | 10,6 | 35,7 | TP | 3,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 42 | 20 | 20 | I | 29,36 | | KĘP | | 22 | 75 | 0,9 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 35 | 16 | 16 | IA | 30,93 | | | | 22 | 75 | 1,3 | 4,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 317 | 1 075 | 12,8 | 43,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99l | I | 1,74 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 58 | 28 | 24 | IA | 31,56 | 1,02 | 0,9 | 12 | 254 | 440 | 7,4 | 12,8 | TP | 1,74 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 100 | 36 | 28 | I | 28,00 | | WKĘP | | 177 | 310 | 3,7 | 6,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 750 | 11,0 | 19,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99~a | III | 0,12 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99~b | III | 0,46 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 99** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **30,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 440** | | | | |
| | **I** | **30,19** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,58** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 270** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **170** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 440** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100a | I | 0,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 40 | 19 | 19 | IA | 32,18 | 0,91 | 0,9 | 11 | 240 | 190 | 10,9 | 8,6 | TP | 0,79 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 40 | 16 | 16 | II | 28,67 | | GRP | | 22 | 15 | 1,0 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty | | ŚW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ///piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 205 | 11,8 | 9,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100b | I | 5,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 85 | 36 | 28 | IA | 30,11 | 1,14 | 0,9 | 3 | 458 | 2 725 | 9,0 | 53,8 | IIIA (40%) | 5,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 85 | 36 | 25 | II | 26,95 | | DKĘP | 3 | 35 | 210 | 1,3 | 7,6 | AGROT | 2,38 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 85 | 35 | 28 | II | 30,74 | | | 3 | 47 | 280 | 1,5 | 8,9 | ODN-ZŁOŻ | 2,38 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | DB.B | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 540 | 3 215 | 11,8 | 70,2 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 100c | I | 1,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 58 | 26 | 24 | IA | 31,56 | 1,25 | 0,9 | 12 | 353 | 595 | 10,0 | 16,9 | TP | 1,69 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 3 | 38 | 19 | 18 | IA | 31,91 | | WKĘP | | 110 | 185 | 4,6 | 7,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | PJD | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | PJD | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 463 | 780 | 14,5 | 24,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pióropusznik strusi 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100d | I | 9,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 100 | 36 | 28 | I | 28,00 | 1,12 | 0,9 | 3 | 426 | 4 160 | 7,8 | 76,3 | IIIA (40%)/1 | 4,17 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 100 | 35 | 26 | II | 26,00 | | DKĘP | 3 | 45 | 440 | 1,2 | 11,6 | AGROT/1 | 1,67 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 100 | 39 | 29 | II | 29,00 | | | 3 | 45 | 440 | 1,3 | 12,5 | ODN-ZŁOŻ/1 | 1,67 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/2 | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | MD | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 516 | 5 040 | 10,3 | 100,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 100f | I | 4,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 100 | 36 | 28 | I | 28,00 | 0,75 | 0,7 | 3 | 301 | 1 425 | 6,6 | 31,1 | PIEL | 1,54 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 100 | 35 | 26 | II | 26,00 | | DKĘP | 3 | 35 | 165 | 0,9 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | MD | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | | | | | | | | | Razem: | | 336 | 1 590 | 7,5 | 35,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODS | DB.S | 8 | 5 | | | | | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: BK 3 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,16 ha: DB.S 5 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100g | I | 5,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 100 | 36 | 27 | I | 27,00 | 0,77 | 0,7 | 3 | 266 | 1 475 | 5,8 | 32,2 | IIIAU (90%) | 5,54 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 100 | 36 | 26 | II | 26,00 | | DKĘP | 3 | 35 | 195 | 0,9 | 5,0 | AGROT | 2,88 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 100 | 40 | 28 | II | 28,00 | | | 3 | 46 | 255 | 0,9 | 5,2 | ODN-ZŁOŻ | 2,88 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | CW | 2,66 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | MD | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | GB | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | | | | | | | | | Razem: | | 347 | 1 925 | 7,7 | 42,4 | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODR | DB.S | 8 | 6 | | 1 | II | 26,80 | 0,40 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | 2 | 6 | | 1 | I | 35,77 | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | GB | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JW | MJS | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 5 gniazd odnowionych o pow. 2,36 ha: BK 6 l., DB.S 6 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB.S 4 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100~a | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100~b | III | 0,47 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | SO | | 58 | 21 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 760** | | | | |
| | **I** | **28,46** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,74** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 755** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 755** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **5** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101a | I | 1,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 25 | 12 | 11 | I | 29,88 | 0,90 | 0,9 | 12 | 97 | 140 | 6,6 | 9,4 | TW | 1,43 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 25 | 7 | 8 | II | 26,44 | | KĘP | | 5 | 5 | 1,2 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 25 | 12 | 11 | IV | 19,16 | | | | 16 | 25 | 0,5 | 0,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | 1 | 15 | | 3 | IV | 18,22 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 118 | 170 | 8,3 | 11,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | DB.B | | 130 | 40 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | | 130 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | SO | | 75 | 23 | 23 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,25 ha: DB.B 130 l., SO 130 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 80 | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 75 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 130 l., DB.B 130 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101b | I | 2,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 47 | 24 | 21 | II | 28,15 | 0,97 | 0,9 | 12 | 263 | 690 | 9,6 | 25,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 85 | 31 | 25 | II | 26,37 | | WKĘP | | 93 | 245 | 2,1 | 5,4 | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | WZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 356 | 935 | 11,7 | 30,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///glina lekka //// POROL | PODSZ | OL | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,63 ha | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW bagno o pow. 0,31 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 101c | I | 9,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,8 | 3 | 442 | 4 100 | 10,8 | 99,9 | TP | 9,28 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 4 100 | 10,8 | 99,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 33 | | 10 | I | 30,58 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty //// POROL | | KL | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB.S | MJS | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,47 ha: OL 75 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101d | I | 4,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 34 | 28 | IA | 30,92 | 0,96 | 0,9 | 2 | 453 | 2 065 | 10,4 | 47,6 | TP | 4,56 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | KSZ | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 2 065 | 10,4 | 47,6 | | |
| | | | | PODR | BK | 10 | 35 | | 11 | I | 31,02 | 0,40 | | 12 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 101f | I | 2,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 29 | 27 | IA | 32,87 | 0,84 | 0,8 | 13 | 305 | 615 | 8,5 | 17,2 | TP | 2,02 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | SO | 2 | 55 | 26 | 24 | IA | 32,37 | | KĘP | | 76 | 155 | 2,2 | 4,4 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 381 | 770 | 10,7 | 21,6 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101g | I | 1,34 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 25 | 12 | 12 | IA | 31,38 | 1,00 | 1,0 | 11 | 65 | 85 | 5,0 | 6,7 | TW | 1,34 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 25 | 11 | 12 | I | 28,11 | | KĘP | | 49 | 65 | 2,9 | 3,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 2 | 25 | 8 | 8 | II | 26,44 | | | | 5 | 5 | 1,3 | 1,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | 1 | 25 | | 6 | II | 27,84 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 119 | 155 | 9,1 | 12,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 130 | 32 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | | 100 | 39 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | BK | | 130 | 65 | 27 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 23 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 101h | I | 5,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 28 | IA | 30,92 | 0,99 | 0,8 | 2 | 465 | 2 335 | 10,7 | 53,5 | TP | 5,02 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 2 335 | 10,7 | 53,5 | | |
| | | | POROL | PODR | BK | 10 | 35 | | 11 | I | 31,02 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101i | I | 0,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 4 | 90 | 38 | 26 | II | 27,23 | 1,06 | 0,9 | 12 | 188 | 185 | 4,8 | 4,8 | TP | 0,99 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 90 | 34 | 27 | I | 28,36 | | GRP | | 188 | 185 | 4,0 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 2 | 110 | 48 | 28 | II | 26,97 | | | | 106 | 105 | 2,3 | 2,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | PJD | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | GB | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 482 | 475 | 11,1 | 11,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | GB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 101j | I | 1,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 7 | | 2 | I | 27,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,38 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 19 | | 7 | II | 29,04 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 2 | 19 | | 7 | I | 40,25 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 107 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | | 107 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 107 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101k | I | 1,69 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 8 | 100 | 36 | 26 | II | 26,00 | 1,02 | 0,9 | 12 | 393 | 665 | 8,9 | 15,0 | TP | 1,69 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 100 | 39 | 27 | I | 27,00 | | GRP | | 67 | 115 | 1,8 | 3,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 460 | 780 | 10,7 | 18,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 101l | I | 1,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 42 | 22 | 21 | I | 29,09 | 0,91 | 1,0 | 12 | 306 | 385 | 12,2 | 15,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 385 | 12,2 | 15,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,25 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W bagno o pow. 0,12 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101m | I | 1,14 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 27 | 24 | IA | 31,83 | 0,86 | 0,8 | 23 | 353 | 400 | 11,0 | 12,5 | TP | 1,14 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 400 | 11,0 | 12,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW bagno o pow. 0,07 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101~a | III | 0,42 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101~b | III | 0,49 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Podsumowanie dla oddziału: 101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **33,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 698** | | | | |
| | **I** | **32,73** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,91** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 570** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **128** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 698** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102a | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 80 | 31 | 24 | III | 25,99 | 1,00 | 0,9 | 3 | 442 | 445 | 10,4 | 10,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 150 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JS | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 445 | 10,4 | 10,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /pył zwykły //piasek luźny //// POROL | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,01 ha | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102b | I | 1,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 9 | 48 | 24 | 23 | I | 30,64 | 0,71 | 0,9 | 13 | 186 | 210 | 6,0 | 6,7 | TP | 1,13 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: NIEZG | | SO | 1 | 48 | 26 | 23 | IA | 33,49 | | DKĘP | | 38 | 45 | 1,0 | 1,2 | AGROT | 1,13 |
| | | | | | DB.S | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | ODN-IIP | 1,13 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 224 | 255 | 7,0 | 7,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 102c | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 35 | 18 | 18 | IA | 33,30 | 0,78 | 0,9 | 23 | 185 | 215 | 9,0 | 10,4 | TW | 1,16 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z | | BRZ | 2 | 35 | 17 | 18 | I | 29,99 | | WKĘP | | 27 | 30 | 1,6 | 1,9 | AGROT | 1,16 |
| | | | TD: CZ ZG | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | ODN-IIP | 1,16 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 212 | 245 | 10,6 | 12,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek darniowy, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102d | I | 2,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 7 | | 5 | I | 32,20 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,01 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: | | JW | PJD | 7 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | ZG | | BRZ | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | OL | | 80 | 35 | 28 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz //torf niski //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | Pokrywa: zielna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: OL 79 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 102f | I | 5,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 35 | 29 | IA | 32,80 | 1,01 | 0,8 | 3 | 499 | 2 900 | 11,6 | 67,2 | TP | 5,81 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | KSZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BK | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | PJD | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | 499 | 2 900 | 11,6 | 67,2 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, nerecznica | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102g | I | 2,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 38 | 29 | I | 29,00 | 0,72 | 0,7 | 3 | 336 | 675 | 7,2 | 14,5 | IIIAU (75%) | 2,01 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,40 |
| | | | TD: ZG | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,40 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | CP | 0,61 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | Razem: | | 336 | 675 | 7,2 | 14,5 | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODR | DB.S | 10 | 8 | | 1 | III | 22,45 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW bagno o pow. 0,17 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,61 ha: DB.S 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102h | I | 1,75 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 36 | 28 | IA | 31,81 | 0,81 | 0,7 | 3 | 385 | 675 | 9,6 | 16,9 | TP | 1,75 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z | | AK | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 385 | 675 | 9,6 | 16,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina średnia //// | PODR | BK | 10 | 34 | 9 | 12 | I | 33,94 | 0,30 | | 21 | 11 | 20 | 5,0 | 8,7 | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 11 | 20 | 5,0 | 8,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, nerecznica, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102i | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 9 | | 4 | IA | 32,33 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 1,72 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.S | 3 | 12 | | 3 | II | 26,99 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | BK | 1 | 12 | | 2 | II | 27,76 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | GB | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JW | MJS | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | DB.S | | 95 | 39 | 27 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | 95 | 36 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | 95 | 39 | 29 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | | 65 | 25 | 23 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | AK | | 65 | 26 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | PNSW: w części SE bagno o pow. 0,11 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB 65 l., DB.S 95 l., SO 95 l., AK 65 l., AK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 102j | I | 9,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 37 | 29 | IA | 32,80 | 0,90 | 0,8 | 3 | 347 | 3 375 | 8,5 | 82,6 | IIA (50%) | 9,72 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG | | OL | 1 | 75 | 32 | 28 | I | 29,93 | | KĘP | 3 | 46 | 445 | 1,2 | 11,6 | | |
| | | | | | AK | 1 | 75 | 33 | 26 | I | 27,92 | | | 3 | 41 | 400 | 0,5 | 4,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty //// POROL | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 4 220 | 10,2 | 99,1 | | |
| | | | | PODR | BK | 10 | 34 | 8 | 12 | I | 33,94 | 0,60 | | 21 | 23 | 225 | 7,5 | 73,2 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | 23 | 225 | 7,5 | 73,2 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, trawy | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102k | I | 2,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 28 | 26 | IA | 32,33 | 0,93 | 0,9 | 12 | 414 | 895 | 11,4 | 24,7 | TP | 2,16 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | AK | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 414 | 895 | 11,4 | 24,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 102l | I | 1,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 37 | 18 | 20 | I | 29,47 | 0,87 | 0,9 | 12 | 164 | 265 | 7,2 | 11,6 | TP | 1,62 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: | | OL | 3 | 65 | 30 | 25 | II | 28,49 | | WKĘP | | 109 | 175 | 3,3 | 5,4 | | |
| | | | CZ ZG | | DB.S | 1 | 65 | 31 | 25 | I | 30,23 | | | | 38 | 60 | 1,2 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JS | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, | | ŚW | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | SO | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 311 | 500 | 11,7 | 18,9 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102m | I | 2,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 95 | 30 | 26 | I | 26,66 | 0,73 | 0,7 | 3 | 255 | 675 | 5,7 | 15,2 | IIIAU (90%) | 2,65 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 95 | 30 | 26 | II | 26,41 | | WKĘP | 3 | 58 | 155 | 1,6 | 4,2 | AGROT | 1,73 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,73 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | CP | 0,92 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 830 | 7,3 | 19,4 | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | PODR | DB.S | 10 | 13 | | 3 | II | 25,77 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek darniowy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,92 ha: DB.S 13 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 35 l., MD 35 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102~b | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102~c | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 102** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **33,03** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 970** | | | | | |
| | **I** | **32,75** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,28** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 885** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **85** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 970** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **13,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 555** | | | | | |
| | **I** | **13,13** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,13** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 520** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **35** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 555** | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 415** | | | | | |
| | **I** | **19,62** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,15** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 365** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **50** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 415** | | | | | |
| | | Województwo: LUBUSKIE (08) | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | |
| | | Powiat: Międzyrzecki (03) | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103a | II | 0,67 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 100 | 38 | 28 | | | | | 3 | | 60 | | | AGROT | 0,67 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 60 | | | ODN-ZRB | 0,67 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | PIEL | 0,67 |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 103b | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 5 | 28 | 13 | 16 | I | 29,20 | 0,98 | 1,0 | 23 | 92 | 100 | 6,2 | 6,8 | TW | 1,10 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 28 | 11 | 13 | I | 30,91 | | WKĘP | | 32 | 35 | 2,8 | 3,1 | | |
| | | | | | ŚW | 2 | 28 | 11 | 12 | I | 34,66 | | | | 27 | 30 | 2,4 | 2,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 151 | 165 | 11,4 | 12,6 | | |
| | | | POROL | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, turzyca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103c | I | 1,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 75 | 31 | 26 | II | 28,23 | 0,62 | 0,9 | 3 | 215 | 385 | 5,7 | 10,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | OL | 3 | 60 | 24 | 23 | II | 27,58 | | WKĘP | 4 | 85 | 155 | 2,4 | 4,4 | | |
| | | | | | SO | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //piasek luźny //// | | JW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | | | | | | | | | Razem: | | 300 | 540 | 8,1 | 14,7 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, malina właściwa, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,13 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103d | IV | 0,43 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 75 | 31 | 23 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 103f | I | 4,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 58 | 28 | 25 | IA | 32,57 | 0,85 | 0,8 | 23 | 232 | 1 055 | 6,6 | 30,0 | TP | 4,54 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 3 | 58 | 25 | 23 | II | 27,86 | | WKĘP | | 88 | 400 | 3,2 | 14,4 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 58 | 26 | 25 | I | 30,23 | | | | 33 | 150 | 0,7 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //piasek luźny //// POROL | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | MJS | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 1 605 | 10,4 | 47,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, nerecznica, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103g | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 38 | 29 | IA | 32,80 | 0,97 | 0,8 | 3 | 476 | 510 | 11,2 | 12,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | OL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 510 | 11,2 | 12,0 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: OL 45 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103h | I | 3,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 3,59 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 5 | | 1 | I | 29,67 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | JW | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PRZES | OL | | 100 | 36 | 25 | | | | | 3 | | 45 | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | | 100 | 35 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | 100 | 41 | 28 | | | | | 3 | | 10 | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | 100 | 37 | 26 | | | | | 3 | | 1 | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.S | | 50 | 21 | 18 | | | | | 4 | | 3 | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | 50 | 23 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trzcinnik, nerecznica | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: DB 50 l., OL 100 l., DB 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SE kępa o pow. 0,12 ha: OL 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S bagno o pow. 0,05 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103i | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 35 | 16 | 17 | IA | 32,13 | 0,95 | 1,0 | 12 | 142 | 290 | 7,5 | 15,3 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 35 | 15 | 16 | I | 30,62 | | WKĘP | | 49 | 100 | 3,1 | 6,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 35 | 14 | 18 | II | 28,61 | | | | 27 | 55 | 1,2 | 2,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 218 | 445 | 11,8 | 23,9 | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | BK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103j | I | 1,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 5 | | 1 | II | 23,85 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,35 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 5 | | 1 | I | 29,67 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | 1 | 7 | | 1 | I | 32,29 | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | | OL | 1 | 7 | | 3 | II | 28,63 | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | OL | | 100 | 36 | 28 | | | | | 3 | | 20 | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: OL 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 103k | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 80 | 35 | 28 | IA | 30,92 | 0,96 | 0,9 | 3 | 261 | 450 | 6,3 | 10,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | 2 | 80 | 31 | 26 | I | 27,46 | | WKĘP | 3 | 79 | 135 | 1,0 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 2 | 50 | 22 | 21 | II | 27,63 | | | 4 | 62 | 105 | 2,3 | 4,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, śmiałek pogięty, nerecznica | | MD | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 402 | 690 | 9,5 | 16,4 | | |
| | | | | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103l | I | 1,48 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 58 | 27 | 25 | IA | 32,57 | 0,90 | 0,9 | 12 | 309 | 455 | 9,2 | 13,6 | TP | 1,48 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | AK | 2 | 58 | 25 | 23 | II | 26,72 | | WKĘP | | 50 | 75 | 1,3 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 530 | 10,5 | 15,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 103m | I | 4,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 65 | 28 | 24 | II | 27,70 | 0,78 | 0,8 | 3 | 349 | 1 530 | 9,7 | 42,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JS | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | OL | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 349 | 1 530 | 9,7 | 42,7 | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4,39 ha | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, wiechlina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103n | I | 1,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 27 | 10 | 14 | II | 28,13 | 0,88 | 1,0 | 12 | 97 | 105 | 9,2 | 10,1 | TW | 1,10 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 1 | 27 | 7 | 7 | II | 28,99 | | KĘP | | 11 | 10 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | 108 | 115 | 10,1 | 11,1 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz ///gytia wapienna ///piasek luźny //// | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | PRZES | TP | | 80 | 48 | 28 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103o | I | 0,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 38 | 29 | I | 29,65 | 0,76 | 0,6 | 3 | 359 | 350 | 7,9 | 7,7 | IIBU (100%) | 0,98 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 350 | 7,9 | 7,7 | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PODR | BK | 10 | 37 | 8 | 12 | I | 31,41 | 0,90 | | 12 | 22 | 20 | 9,5 | 9,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 22 | 20 | 9,5 | 9,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103p | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 60 | 26 | 25 | IA | 32,06 | 0,78 | 0,9 | 22 | 254 | 205 | 8,1 | 6,6 | TP | 0,81 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 60 | 23 | 22 | II | 26,74 | | KĘP | | 55 | 45 | 1,1 | 0,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 309 | 250 | 9,2 | 7,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103~b | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103~c | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103~d | III | 0,14 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103~f | III | 0,03 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 103** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **27,65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 915** | | | | |
| | **I** | **25,96** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,67** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 750** | | | | |
| | **III** | **0,59** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **95** | | | | |
| | **IV** | **0,43** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **60** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 905** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **10** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **9,91** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **2 890** | | | | |
| | **I** | **8,51** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **0,67** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **2 820** | | | | |
| | **III** | **0,30** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **60** | | | | |
| | **IV** | **0,43** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **2 880** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **10** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **17,74** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | **4 025** | | | | |
| | **I** | **17,45** | | | | | | | | | | | | | | **4 025** | | | | |
| | **III** | **0,29** | | | | | | | | | | | | | | **3 930** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **95** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **4 025** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104a | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 8 | 85 | 34 | 25 | II | 26,37 | 1,08 | 0,9 | 3 | 399 | 685 | 9,0 | 15,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 85 | 35 | 28 | IA | 30,11 | | WKĘP | 3 | 112 | 195 | 2,2 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //pył zwykły //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 511 | 880 | 11,1 | 19,2 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,72 ha | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104b | I | 3,82 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 37 | 29 | IA | 32,80 | 1,10 | 0,9 | 3 | 544 | 2 080 | 12,3 | 47,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 544 | 2 080 | 12,3 | 47,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 104c | I | 2,99 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 85 | 33 | 26 | II | 27,28 | 1,10 | 0,9 | 3 | 564 | 1 685 | 12,0 | 35,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | JS | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///pył zwykły //// POROL | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,99 ha | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | MJS | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 564 | 1 685 | 12,0 | 35,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104d | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 36 | 29 | IA | 31,91 | 0,95 | 0,6 | 3 | 465 | 395 | 10,6 | 9,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 395 | 10,6 | 9,0 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104f | I | 5,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 95 | 35 | 28 | I | 28,65 | 0,74 | 0,7 | 3 | 289 | 1 615 | 6,0 | 33,8 | IIIAU (60%) | 5,59 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | 2 | 95 | 33 | 25 | III | 25,44 | | WKĘP | 3 | 46 | 255 | 1,5 | 8,6 | AGROT | 3,54 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 3,54 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | CP | 2,05 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 335 | 1 870 | 7,6 | 42,3 | | |
| | | | Gosp.: S | PODR | DB.S | 10 | 12 | | 3 | II | 26,99 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 5 gniazd odnowionych o pow. 2,05 ha: DB.S 12 l., | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104g | I | 2,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 13 | | 9 | I | 30,83 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,09 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 13 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PRZES | OL | | 90 | 30 | 24 | | | | | 4 | | 25 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: OL 90 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104h | IV | 0,71 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 90 | 32 | 27 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | | | OL | | 90 | 29 | 22 | | | | | 4 | | 20 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 90 | 30 | 23 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 63 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 104i | I | 3,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 38 | 29 | I | 29,65 | 1,09 | 0,8 | 3 | 516 | 1 995 | 10,2 | 39,6 | IIIA (40%) | 3,87 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | OL | MJS | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,55 |
| | | | ZG | | BRZ | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,55 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 516 | 1 995 | 10,2 | 39,6 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104j | I | 2,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 33 | 27 | IA | 30,82 | 1,07 | 0,9 | 3 | 453 | 920 | 10,4 | 21,1 | TP | 2,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 75 | 26 | 23 | II | 26,62 | | GRP | 3 | 28 | 55 | 1,2 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 481 | 975 | 11,6 | 23,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104k | I | 1,06 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 5 | 12 | | 3 | II | 26,99 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 1,06 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | OL | 3 | 8 | | 5 | I | 30,91 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 2 | 8 | | 1 | II | 30,02 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | JW | PJD | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 95 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | 50 | 17 | 16 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 28 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 50 l., SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 104l | I | 2,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 63 | 27 | 25 | IA | 31,33 | 0,92 | 0,9 | 12 | 392 | 885 | 11,1 | 25,1 | TP | 2,26 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 63 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 885 | 11,1 | 25,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104m | II | 1,44 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 95 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 45 | | | ODN-ZRB | 1,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 45 | | | PIEL | 1,44 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104~a | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104~b | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104~c | III | 0,17 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | OL | | 95 | 34 | 26 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 95 | 34 | 27 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| 104~d | III | 0,03 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104~f | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna:<br>I – zalesiona<br>II – niezalesiona<br>III – związana z gosp. leśną<br>Nieleśna:<br>IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 104** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **29,16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 941** | | | | |
| | **I** | **26,28** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,44** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 765** | | | | |
| | **III** | **0,73** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **53** | | | | |
| | **IV** | **0,71** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **45** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 863** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **63** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **9,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 040** | | | | |
| | **I** | **9,38** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,26** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 040** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 040** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **19,52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 901** | | | | |
| | **I** | **16,90** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,44** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 725** | | | | |
| | **III** | **0,47** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **53** | | | | |
| | **IV** | **0,71** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **45** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 823** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **63** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105a | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 37 | 29 | IA | 31,91 | 0,93 | 0,6 | 3 | 453 | 695 | 10,4 | 15,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: ZG | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 695 | 10,4 | 15,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105b | I | 1,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 80 | 34 | 25 | II | 26,86 | 1,05 | 0,9 | 3 | 374 | 715 | 8,0 | 15,2 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność | | SO | 2 | 80 | 35 | 29 | IA | 31,91 | | WKĘP | 3 | 79 | 150 | 2,3 | 4,3 | | |
| | | | z TD: ZG | | BRZ | 1 | 80 | 35 | 27 | I | 28,82 | | | 3 | 40 | 75 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | WZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///pył zwykły //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 940 | 10,8 | 20,6 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,91 ha | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 105c | I | 1,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 59 | 29 | 26 | IA | 33,31 | 1,05 | 0,9 | 12 | 177 | 210 | 5,2 | 6,2 | TP | 1,19 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 2 | 59 | 24 | 23 | II | 27,72 | | DKĘP | | 83 | 100 | 2,5 | 3,0 | | |
| | | | TD: ZG | | BRZ | 2 | 59 | 25 | 24 | I | 29,00 | | | | 66 | 80 | 1,5 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 59 | 23 | 22 | II | 28,80 | | | | 39 | 45 | 1,2 | 1,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | 1 | 59 | 22 | 23 | II | 26,58 | | | | 33 | 40 | 0,7 | 0,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 398 | 475 | 11,1 | 13,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105d | I | 1,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 29 | 26 | IA | 31,87 | 0,84 | 0,9 | 22 | 327 | 625 | 9,4 | 17,9 | TP | 1,91 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | 1 | 65 | 29 | 26 | I | 29,28 | | KĘP | | 55 | 105 | 1,1 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB.S | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | PJD | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 730 | 10,5 | 20,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105f | I | 0,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 18 | 7 | 9 | IA | 32,32 | 0,70 | 0,9 | 22 | 15 | 10 | 4,8 | 3,5 | TW | 0,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 3 | 20 | | 7 | II | 28,26 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 14 | | 6 | IA | 30,37 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 15 | 10 | 4,8 | 3,5 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 110 | 33 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 105g | I | 1,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 30 | 27 | IA | 32,87 | 0,49 | 0,2 | 3 | 229 | 320 | 7,2 | 10,0 | IIIA (20%) | 1,39 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,56 |
| | | | TD: ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 229 | 320 | 7,2 | 10,0 | ODN-ZŁOŻ | 0,56 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KRU | | | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | ODBUD | |
| | | | POROL | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105h | I | 3,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 36 | 17 | 18 | IA | 32,82 | 0,99 | 1,0 | 12 | 229 | 830 | 11,8 | 42,9 | TP | 3,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 36 | 18 | 19 | II | 26,33 | | KĘP | | 33 | 120 | 0,9 | 3,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 950 | 12,7 | 46,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105i | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 28 | 13 | 14 | IA | 32,21 | 0,69 | 1,0 | 21 | 97 | 155 | 6,9 | 11,1 | TW | 1,61 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 28 | 12 | 13 | I | 30,91 | | WKĘP | | 16 | 25 | 1,5 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 28 | 7 | 11 | I | 38,09 | | | | 5 | 10 | 0,8 | 1,3 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JW | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 118 | 190 | 9,2 | 14,8 | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 110 | 36 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | | 85 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JW | | 65 | 30 | 19 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 6 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 105j | I | 1,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,39 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 4 | | 1 | I | 33,42 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 95 | 33 | 28 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | | 95 | 38 | 32 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JW | | 65 | 28 | 24 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | | 34 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105k | IV | 1,21 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | SO | | 30 | 14 | 13 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 50 | 32 | 17 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 6 | | | | |
| | Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105l | I | 4,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 32 | 26 | IA | 30,80 | 0,91 | 0,9 | 22 | 403 | 1 840 | 10,5 | 48,1 | TP | 4,57 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | MD | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 1 840 | 10,5 | 48,1 | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 105m | I | 3,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 7 | 17 | | 5 | II | 27,00 | 0,30 | 0,9 | 11 | | | | | ODN-ZŁOŻ | 2,78 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | BK | 2 | 17 | | 6 | I | 40,41 | | WKĘP | | | | | | CP | 1,05 |
| | | | TD: ZG | | BK | 1 | 25 | | 8 | I | 33,98 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | OL | | 58 | 24 | 22 | | | | | 4 | | 90 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 90 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: OL 58 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105n | I | 1,34 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 51 | 24 | 23 | IA | 32,53 | 0,90 | 0,9 | 22 | 353 | 475 | 11,8 | 15,8 | TP | 1,34 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 51 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 475 | 11,8 | 15,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105o | I | 2,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 85 | 34 | 27 | I | 29,12 | 1,12 | 0,8 | 3 | 423 | 920 | 8,7 | 19,1 | IIIA (40%) | 2,18 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | OL | 2 | 55 | 25 | 23 | II | 28,29 | | WKĘP | 4 | 70 | 155 | 2,7 | 5,9 | AGROT | 0,88 |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 0,88 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 493 | 1 075 | 11,5 | 25,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105~b | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105~c | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 105** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,73** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 856** | | | | |
| | **I** | **27,15** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,37** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 700** | | | | |
| | **IV** | **1,21** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **150** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 850** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **6** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,72** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 376** | | | | |
| | **I** | **15,29** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,22** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 310** | | | | |
| | **IV** | **1,21** | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **60** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 370** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **6** | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **12,01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **3 480** | | | | |
| | **I** | **11,86** | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,15** | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **3 390** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **90** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **3 480** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106a | I | 3,15 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 160 | 39 | 25 | III | 19,33 | 0,75 | 0,8 | 3 | 202 | 635 | 3,2 | 10,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 90 | 29 | 25 | I | 26,37 | | WKĘP | 3 | 20 | 65 | 0,7 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 90 | 32 | 24 | II | 24,64 | | | 4 | 20 | 65 | 0,3 | 1,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | WZ | PJD | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY | | DB.S | PJD | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL S OBN | | JW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | Razem: | | 242 | 765 | 4,3 | 13,5 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l. | PODSZ | AK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106b | I | 3,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 7 | 85 | 33 | 23 | II | 23,98 | 0,92 | 0,9 | 3 | 200 | 610 | 2,9 | 8,7 | IIIA (40%) | 3,04 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: | | SO | 1 | 85 | 30 | 25 | I | 27,13 | | WKĘP | 3 | 29 | 90 | 0,9 | 2,8 | AGROT | 1,22 |
| | | | NIEZG | | KL | 1 | 85 | 34 | 24 | II | 25,74 | | | 3 | 23 | 70 | 1,3 | 4,0 | ODN-ZŁOŻ | 1,22 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | 1 | 40 | 18 | 19 | I | 41,20 | | | 4 | 23 | 70 | 1,4 | 4,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OS | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | INTENS | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | WZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | MD | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: N STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 275 | 840 | 6,4 | 19,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | AK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, glistnik jaskółcze ziele | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 106c | I | 2,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 27 | 24 | I | 28,81 | 0,95 | 0,9 | 22 | 316 | 885 | 8,3 | 23,3 | TP | 2,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 70 | 24 | 23 | II | 26,09 | | WKĘP | | 27 | 75 | 0,6 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 57 | 23 | 20 | I | 27,71 | | | | 27 | 75 | 1,1 | 3,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | KL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | JW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 370 | 1 035 | 9,9 | 27,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106d | I | 1,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 10 | 100 | 35 | 26 | II | 26,00 | 0,89 | 1,0 | 12 | 404 | 410 | 10,1 | 10,3 | TP | 1,02 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 100 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 404 | 410 | 10,1 | 10,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: konwalia majowa, trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 106f | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 4 | 100 | 33 | 24 | III | 24,00 | 0,95 | 0,9 | 22 | 168 | 330 | 4,0 | 7,7 | TP | 1,95 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 100 | 33 | 24 | II | 24,00 | | GRP | | 101 | 195 | 2,4 | 4,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 3 | 70 | 23 | 19 | III | 23,78 | | | | 67 | 130 | 2,9 | 5,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LP | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 336 | 655 | 9,2 | 18,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KL | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, niecierpek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106g | I | 4,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 21 | 20 | I | 28,24 | 1,10 | 0,9 | 12 | 364 | 1 465 | 12,1 | 48,6 | TP | 4,03 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | PJD | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | KL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 1 465 | 12,1 | 48,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 106h | I | 2,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 80 | 30 | 24 | I | 26,95 | 0,92 | 0,8 | 3 | 329 | 890 | 8,3 | 22,5 | TP | 2,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 80 | 25 | 24 | II | 25,82 | | GRP | 4 | 28 | 75 | 0,5 | 1,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 357 | 965 | 8,8 | 23,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODR | JW | 5 | 30 | 13 | 12 | I | 38,02 | 0,30 | | 12 | 11 | 30 | 2,6 | 6,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | KL | 5 | 30 | 12 | 14 | II | 28,02 | | | | 11 | 30 | 1,7 | 4,5 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | KL | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JW | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 22 | 60 | 4,2 | 11,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, śmiałek pogięty, rokiet | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106i | I | 5,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 40 | 18 | 18 | IA | 31,06 | 1,03 | 0,9 | 12 | 240 | 1 305 | 10,3 | 55,9 | TP | 5,44 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 50 | 24 | 22 | IA | 31,80 | | WKĘP | | 71 | 385 | 2,6 | 13,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | Razem: | | 311 | 1 690 | 12,8 | 69,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106j | I | 2,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 68 | 26 | 23 | I | 28,21 | 1,01 | 0,9 | 22 | 316 | 920 | 8,6 | 25,1 | TP | 2,91 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 56 | 25 | 23 | IA | 31,08 | | WKĘP | | 76 | 220 | 2,4 | 7,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | AK | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 140 | 11,1 | 32,2 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 106k | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 43 | 21 | 20 | IA | 32,09 | 1,06 | 0,9 | 13 | 350 | 685 | 13,4 | 26,2 | TP | 1,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 43 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 685 | 13,4 | 26,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 120 | 34 | 21 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | | 120 | 33 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | WZ | | 90 | 32 | 17 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.B | | 70 | 25 | 15 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | KL | | 70 | 22 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: KL 70 l., DB.B 70 l., WZ 90 l., BRZ 120 l., SO 120 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 36 | | | | |
| 106l | I | 3,18 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 25 | 23 | I | 27,80 | 1,04 | 0,9 | 22 | 403 | 1 280 | 10,8 | 34,4 | TP | 3,18 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 1 280 | 10,8 | 34,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 28% równe 15.64 st, wystawa W | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 106m | I | 2,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 9 | 17 | | 6 | II | 29,01 | 0,30 | 0,9 | 12 | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 1 | 17 | | 6 | I | 40,41 | | GRP | | | | | | CP | 1,04 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | AK | | 85 | 33 | 21 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | | 85 | 35 | 20 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | | 85 | 30 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 85 l., DB.S 85 l., AK 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106n | I | 0,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 43 | 22 | 19 | IA | 31,00 | 1,00 | 0,9 | 13 | 263 | 170 | 10,0 | 6,5 | TP | 0,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 38 | 14 | 15 | II | 28,44 | | KĘP | | 22 | 15 | 2,0 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL.S | MJS | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 285 | 185 | 12,0 | 7,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106o | IV | 0,44 | Rodzaj powierzchni: S-R | ZADRZEW | MD | | 100 | 30 | 21 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | OL | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106p | III | 0,42 | Rodzaj powierzchni: L-CTWO | ZADRZEW | DB.S | | 160 | 90 | 24 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Informacje: Siedziba leśnictwa Pszczew | | AK | | 150 | 50 | 21 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | LP | | 150 | 44 | 17 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | MD | | 110 | 25 | 19 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | KL | | 110 | 37 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | KSZ | | 110 | 40 | 21 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 55 | | | | |
| 106r | III | 0,02 | Rodzaj powierzchni: BUD INNE | ZADRZEW | OS | | 60 | 52 | 25 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 106s | III | 0,16 | Rodzaj powierzchni: BUD INNE | ZADRZEW | AK | | 100 | 52 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| 106t | IV | 0,03 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106~a | III | 0,05 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 106** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **36,85** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 304** | | | | |
| | **I** | **35,73** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,65** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 175** | | | | |
| | **IV** | **0,47** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **66** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 241** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **62** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **1** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Pszczew (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107a | I | 3,35 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 31 | 26 | I | 28,94 | 0,94 | 0,9 | 2 | 408 | 1 365 | 9,8 | 33,0 | TP | 3,35 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 1 365 | 9,8 | 33,0 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 107b | I | 3,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 23 | 21 | I | 26,61 | 1,12 | 0,9 | 12 | 392 | 1 525 | 11,3 | 43,8 | TP | 3,89 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 66 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OS | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 525 | 11,3 | 43,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107c | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 43 | 22 | 19 | IA | 31,00 | 1,10 | 0,9 | 13 | 284 | 220 | 10,7 | 8,3 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 40 | 14 | 15 | II | 27,70 | | DKĘP | | 27 | 20 | 2,1 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OS | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 311 | 240 | 12,8 | 9,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, malina właściwa, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107d | II | 0,91 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //// POROL | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | PRZES | BRZ | | 100 | 26 | 21 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, skrzyp | | OS | | 100 | 17 | 16 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | Informacje: REF | | DB.S | | 100 | 18 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | SO | | 100 | 14 | 14 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | WB | | 50 | 42 | 15 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | KL | | 50 | 18 | 15 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 26 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 107f | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 10 | 10 | I | 29,72 | 1,15 | 1,0 | 12 | 119 | 75 | 11,7 | 7,5 | TW | 0,64 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 11 | 12 | I | 29,69 | | DKĘP | | 16 | 10 | 1,1 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | KL | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 135 | 85 | 12,8 | 8,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | OS | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 135 | 30 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107g | IV | 0,33 | Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG | ZADRZEW | SO | | 80 | 25 | 23 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| 107h | I | 6,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 77 | 29 | 26 | I | 29,46 | 0,98 | 0,9 | 3 | 385 | 2 560 | 9,4 | 62,4 | TP | 6,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 52 | 21 | 20 | I | 29,09 | | WKĘP | 4 | 34 | 225 | 1,1 | 7,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | DB.B | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 2 785 | 10,5 | 70,0 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODR | BK | 10 | 32 | | 6 | III | 21,71 | 0,30 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,32 ha: BRZ 29 l., SO 29 l., | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 107i | I | 6,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 68 | 24 | 23 | I | 28,21 | 1,02 | 0,9 | 22 | 360 | 2 370 | 9,8 | 64,4 | TP | 6,58 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 68 | 23 | 23 | II | 25,50 | | WKĘP | | 27 | 180 | 0,6 | 4,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa W | | BK | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | SO | MJS | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | 387 | 2 550 | 10,4 | 68,3 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,26 ha: DB.B 35 l., SO 35 l., | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,27 ha: DB.B 140 l., OS 68 l., | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107j | I | 2,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 5 | 20 | 10 | 11 | III | 21,17 | 0,90 | 0,9 | 13 | 50 | 115 | 2,8 | 6,4 | TW | 2,31 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 2 | 20 | 9 | 9 | IA | 30,42 | | WKĘP | | 20 | 45 | 2,2 | 5,0 | | |
| | | | | | DB.S | 1 | 20 | 8 | 8 | I | 29,83 | | | | 5 | 10 | 0,7 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | KL | 1 | 20 | 10 | 10 | II | 27,96 | | | | 5 | 10 | 0,4 | 0,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | WZ | 1 | 20 | 11 | 11 | I | 33,95 | | | | 5 | 10 | 0,9 | 2,0 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 32% równe 17.74 st, wystawa W | | BK | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JW | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny żwirowy //// | | MD | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | MJS | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 85 | 190 | 6,9 | 15,8 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: jeżyna, trawy, pokrzywa zwyczajna | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRZES | DB.S | | 110 | 45 | 20 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | SO | | 110 | 38 | 21 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| 107~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107~b | III | 0,01 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 107** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **25,59** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 828** | | | | | |
| | **I** | **24,19** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **II** | **0,91** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 740** | | | | | |
| | **III** | **0,16** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **22** | | | | | |
| | **IV** | **0,33** | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **26** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 788** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **40** | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108a | I | 4,58 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 100 | 34 | 24 | II | 24,00 | 0,97 | 0,9 | 3 | 236 | 1 080 | 4,8 | 22,1 | TP | 4,58 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 70 | 24 | 22 | I | 26,79 | | WKĘP | 3 | 67 | 305 | 2,0 | 9,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 55 | 19 | 19 | I | 27,18 | | | 4 | 50 | 230 | 2,1 | 9,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 1 615 | 9,0 | 41,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108b | I | 7,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 22 | 20 | II | 24,75 | 1,00 | 0,9 | 11 | 327 | 2 365 | 9,7 | 70,1 | TP | 7,23 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 327 | 2 365 | 9,7 | 70,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 108c | II | 1,58 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 100 | 33 | 26 | | | | | 2 | | 30 | | | AGROT | 1,58 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | ODN-ZRB | 1,58 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | PIEL | 1,58 |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: naga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108d | I | 1,95 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 28 | 26 | IA | 31,22 | 0,88 | 0,9 | 12 | 392 | 765 | 10,5 | 20,4 | TP | 1,95 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | LP | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 392 | 765 | 10,5 | 20,4 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, śmiałek pogięty, rokiet | | LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108f | I | 1,09 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | 0,86 | 0,9 | 3 | 363 | 395 | 9,4 | 10,3 | TP | 1,09 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | | 363 | 395 | 9,4 | 10,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 108g | I | 0,92 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 66 | 23 | 22 | I | 27,63 | 1,02 | 0,9 | 11 | 349 | 320 | 9,7 | 9,0 | TP | 0,92 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 55 | 19 | 19 | I | 27,18 | | KĘP | | 22 | 20 | 1,1 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 371 | 340 | 10,8 | 10,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108h | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 28 | 23 | II | 24,37 | 0,99 | 0,9 | 3 | 364 | 405 | 8,7 | 9,6 | IB (95%) | 1,11 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,11 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 405 | 8,7 | 9,6 | ODN-ZRB | 1,11 |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108i | IV | 0,12 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108~a | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: L ENERG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 108** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **18,95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 915** | | | | |
| | **I** | **16,88** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,58** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 885** | | | | |
| | **III** | **0,37** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **30** | | | | |
| | **IV** | **0,12** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 915** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109a | I | 4,76 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 29 | 26 | I | 29,83 | 1,03 | 0,9 | 2 | 419 | 1 995 | 9,9 | 47,2 | TP | 4,76 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | AK | 1 | 75 | 30 | 24 | II | 25,85 | | KĘP | 2 | 23 | 110 | 0,5 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | MJS | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 2 105 | 10,4 | 49,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109b | I | 4,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 28 | 25 | I | 26,37 | 1,14 | 0,9 | 3 | 411 | 1 885 | 9,1 | 41,8 | IB (90%)/1 | 2,33 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 125 | 40 | 26 | II | 23,24 | | KĘP | 2 | 47 | 215 | 0,8 | 3,5 | AGROT/1 | 2,33 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 2,33 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | IB (95%)/2 | 2,26 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 2,26 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 2 100 | 9,9 | 45,3 | ODN-ZRB/2 | 2,26 |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: 1dz. RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109c | I | 1,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,12 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 6 | | 3 | I | 36,88 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | SO | | 104 | 32 | 25 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 109d | I | 0,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 14 | | 6 | IA | 30,37 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,59 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 14 | | 7 | I | 30,60 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 14 | | 5 | I | 43,19 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PRZES | SO | | 68 | 24 | 22 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 68 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109f | I | 0,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 81 | 29 | 24 | I | 26,78 | 1,01 | 0,9 | 2 | 399 | 370 | 9,8 | 9,1 | IB (90%)/1 | 0,44 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 0,44 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 399 | 370 | 9,8 | 9,1 | ODN-ZRB/1 | 0,44 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | IB (95%)/2 | 0,49 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 0,49 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 0,49 |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: 1dz. RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109g | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 41 | 16 | 16 | I | 28,35 | 1,07 | 0,9 | 11 | 263 | 265 | 12,2 | 12,3 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 41 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 263 | 265 | 12,2 | 12,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 109h | I | 0,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 22 | 20 | II | 24,75 | 0,89 | 0,9 | 11 | 294 | 160 | 8,9 | 4,9 | TP | 0,55 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 160 | 8,9 | 4,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109i | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 29 | 12 | 12 | I | 28,85 | 1,10 | 1,0 | 11 | 141 | 190 | 11,2 | 15,3 | TW | 1,36 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 29 | 14 | 14 | I | 28,24 | | DKĘP | | 32 | 45 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 173 | 235 | 12,3 | 16,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 125 | 47 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 124 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109j | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109k | IV | 0,01 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109~a | III | 0,09 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 109** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **15,02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **5 310** | | | | |
| | **I** | **14,91** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,09** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **5 235** | | | | |
| | **IV** | **0,02** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **75** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **5 310** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110a | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 8 | 75 | 29 | 25 | I | 26,89 | 1,28 | 0,9 | 3 | 374 | 200 | 5,2 | 2,8 | TP | 0,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 60 | 24 | 22 | I | 29,02 | | WKĘP | 4 | 57 | 30 | 2,7 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 230 | 7,9 | 4,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | AK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: glistnik jaskółcze ziele, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110b | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 48 | 21 | 18 | I | 28,16 | 0,83 | 0,9 | 12 | 186 | 160 | 7,0 | 5,9 | TP | 0,85 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 48 | 21 | 20 | I | 27,45 | | DKĘP | | 22 | 20 | 0,7 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 48 | 21 | 19 | II | 23,82 | | | | 11 | 10 | 0,7 | 0,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | 1 | 24 | 11 | 10 | I | 28,99 | | | | 5 | 5 | 1,0 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 224 | 195 | 9,4 | 7,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// | PODSZ | AK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚNG.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PRZES | SO | | 120 | 39 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | AK | | 90 | 35 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, glistnik jaskółcze ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 110c | I | 0,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 23 | 10 | 10 | I | 29,72 | 1,33 | 1,0 | 11 | 87 | 75 | 11,5 | 9,8 | TW | 0,85 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 23 | 8 | 8 | II | 27,69 | | WKĘP | | 5 | 5 | 0,8 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | 1 | 23 | 9 | 9 | IV | 16,85 | | | | 11 | 10 | 0,6 | 0,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy //// | | AK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 103 | 90 | 12,9 | 11,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | SO | | 140 | 77 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB.B | | 140 | 48 | 22 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110d | I | 1,70 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 32 | 24 | II | 25,37 | 0,79 | 0,9 | 3 | 305 | 520 | 7,6 | 12,8 | IB (95%) | 1,70 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,70 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 520 | 7,6 | 12,8 | ODN-ZRB | 1,70 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110f | I | 2,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 14 | | 6 | IA | 30,37 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 2,72 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 14 | | 8 | I | 32,96 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | PJD | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PRZES | SO | | 110 | 34 | 25 | | | | | 3 | | 50 | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 50 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 110g | I | 2,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 22 | 20 | II | 24,75 | 0,96 | 0,9 | 11 | 316 | 685 | 9,4 | 20,4 | TP | 2,17 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 685 | 9,4 | 20,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110h | I | 9,26 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 90 | 25 | 23 | II | 24,37 | 1,06 | 0,9 | 3 | 352 | 3 260 | 8,2 | 76,1 | IB (95%)/1 | 2,38 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 70 | 22 | 20 | II | 24,75 | | KĘP | 3 | 35 | 325 | 1,0 | 9,4 | AGROT/1 | 2,38 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/1 | 2,38 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 387 | 3 585 | 9,2 | 85,4 | IB (95%)/2 | 3,95 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | AGROT/2 | 3,95 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | AK | | | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB/2 | 3,95 |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110i | I | 1,42 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 65 | 22 | 20 | II | 25,79 | 1,00 | 0,9 | 11 | 251 | 355 | 8,1 | 11,6 | TP | 1,42 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 57 | 18 | 17 | II | 24,50 | | WKĘP | | 65 | 90 | 2,0 | 2,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 445 | 10,2 | 14,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 110j | I | 1,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 29 | 13 | 12 | I | 28,85 | 1,11 | 1,0 | 11 | 152 | 250 | 11,3 | 18,8 | TW | 1,66 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 29 | 14 | 14 | I | 28,24 | | DKĘP | | 22 | 35 | 1,0 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 174 | 285 | 12,4 | 20,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PRZES | SO | | 125 | 37 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110~a | III | 0,15 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110~b | III | 0,27 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 110** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **21,59** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **6 145** | | | | |
| | **I** | **21,17** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,42** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **6 035** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **110** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **6 145** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111a | I | 1,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 42 | 20 | 19 | IA | 31,38 | 1,17 | 0,9 | 12 | 284 | 370 | 11,3 | 14,7 | TP | 1,30 |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | OL | 2 | 31 | 19 | 19 | I | 30,31 | | WKĘP | | 66 | 85 | 3,2 | 4,1 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | SO | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 350 | 455 | 14,5 | 18,9 | | |
| | | | Pokrywa: zielna | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW luka o pow. 0,18 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111b | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 62 | 24 | 23 | I | 29,55 | 0,85 | 0,9 | 13 | 294 | 340 | 9,1 | 10,5 | TP | 1,16 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 130 | 39 | 25 | III | 21,76 | | WKĘP | | 33 | 40 | 0,6 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 327 | 380 | 9,7 | 11,2 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111c | IV | 0,21 | Rodzaj powierzchni: R | ZADRZEW | SO | | 30 | 15 | 11 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 111d | II | 1,17 | Rodzaj powierzchni: SUKCESJA | PRZES | OL | | 42 | 18 | 18 | | | | | 4 | | 80 | | | | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL | | BRZ | | 50 | 21 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | | 50 | 19 | 18 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | | 93 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, turzyca, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111f | IV | 0,36 | Rodzaj powierzchni: ZADRZEW | ZADRZEW | BRZ | | 42 | 23 | 19 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 2 | | | | |
| | | | | SAMOS | OL | | 10 | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| 111g | I | 0,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 42 | 20 | 20 | IA | 32,48 | 1,00 | 0,8 | 22 | 175 | 135 | 7,8 | 6,0 | TP | 0,77 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z | | BRZ | 1 | 42 | 19 | 19 | I | 28,25 | | KĘP | | 22 | 15 | 0,9 | 0,7 | AGROT | 0,77 |
| | | | TD: CZ ZG | | ŚW | 1 | 31 | 16 | 16 | I | 36,59 | | | | 33 | 25 | 1,4 | 1,0 | ODN-IIP | 0,77 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | 2 | 31 | 16 | 16 | IA | 33,00 | | | | 49 | 40 | 2,7 | 2,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | PRZEB.: | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | OL | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | CZĘŚĆ | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 279 | 215 | 12,7 | 9,8 | | |
| | | | POROL | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 111h | I | 1,53 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 20 | 13 | 13 | I | 30,10 | 0,80 | 0,9 | 12 | 70 | 105 | 6,4 | 9,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z | | BRZ | 1 | 20 | 12 | 11 | I | 30,91 | | KĘP | | 10 | 15 | 0,9 | 1,3 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | OL | 2 | 30 | 17 | 16 | II | 28,60 | | | | 50 | 75 | 2,0 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | 1 | 30 | 17 | 18 | I | 32,74 | | | | 20 | 30 | 0,9 | 1,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, zagłębienie | | MD | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | LP | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | SO | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 150 | 225 | 10,2 | 15,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | WB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111i | I | 1,31 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 62 | 25 | 23 | I | 29,55 | 0,85 | 0,9 | 13 | 240 | 315 | 7,1 | 9,3 | TP | 1,31 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: | | SO | 2 | 73 | 29 | 26 | IA | 30,21 | | WKĘP | | 65 | 85 | 2,0 | 2,6 | | |
| | | | ZG | | DB.S | 1 | 100 | 39 | 26 | II | 26,00 | | | | 38 | 50 | 1,0 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 343 | 450 | 10,0 | 13,1 | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, nerecznica, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 111j | I | 7,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 73 | 26 | 25 | I | 29,21 | 0,93 | 0,9 | 3 | 363 | 2 735 | 9,2 | 69,0 | TP | 7,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 100 | 39 | 24 | III | 24,00 | | GRP | 3 | 28 | 210 | 1,0 | 7,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | BRZ | MJS | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 391 | 2 945 | 10,1 | 76,4 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111k | I | 6,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 25 | 24 | I | 28,81 | 0,91 | 0,9 | 12 | 294 | 1 785 | 8,1 | 48,9 | TP | 6,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 110 | 34 | 25 | II | 23,80 | | WKĘP | | 38 | 230 | 0,7 | 4,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | 1 | 110 | 36 | 24 | III | 22,83 | | | | 33 | 200 | 0,9 | 5,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | LP | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 365 | 2 215 | 9,7 | 58,7 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111l | I | 2,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 24 | 22 | I | 29,02 | 0,92 | 0,9 | 12 | 342 | 810 | 10,6 | 25,2 | TP | 2,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 810 | 10,6 | 25,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | WB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C bagno o pow. 0,21 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 111m | I | 2,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 23 | 22 | I | 29,02 | 0,92 | 0,9 | 12 | 342 | 805 | 10,6 | 25,1 | TP | 2,36 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 342 | 805 | 10,6 | 25,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111n | IV | 0,05 | Rodzaj powierzchni: LINIA EN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111~a | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 111** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 596** | | | | |
| | **I** | **24,41** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **II** | **1,17** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 500** | | | | |
| | **III** | **0,26** | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **93** | | | | |
| | **IV** | **0,62** | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 593** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **3** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 112a | I | 2,63 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 32 | 26 | I | 28,94 | 0,99 | 0,8 | 2 | 431 | 1 135 | 10,2 | 26,9 | TP | 2,63 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.S | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 135 | 10,2 | 26,9 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODR | BK | 10 | 35 | | 10 | II | 28,93 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112b | I | 3,24 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 45 | 20 | 19 | IA | 30,27 | 1,04 | 0,9 | 13 | 197 | 640 | 7,5 | 24,4 | TP | 3,24 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 42 | 18 | 18 | I | 27,14 | | KĘP | | 44 | 145 | 1,8 | 5,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | SO | 2 | 32 | 16 | 15 | IA | 31,20 | | | | 44 | 145 | 2,6 | 8,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 285 | 930 | 11,9 | 38,6 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | PRZES | DB.B | | 100 | 37 | 23 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | 100 | 55 | 25 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | Razem: | | | 18 | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | płaty roślinności: goździk siny 1 szt.; widłak jałowcowaty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112c | I | 1,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 29 | 25 | I | 29,81 | 0,90 | 0,9 | 12 | 327 | 345 | 8,2 | 8,6 | TP | 1,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 120 | 41 | 24 | III | 21,76 | | GRP | | 55 | 60 | 1,7 | 1,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 405 | 9,9 | 10,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 112d | I | 3,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 62 | 22 | 23 | I | 29,55 | 0,90 | 0,9 | 12 | 349 | 1 360 | 10,5 | 41,0 | TP | 3,90 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 349 | 1 360 | 10,5 | 41,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: OS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112f | I | 4,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 29 | 25 | I | 29,81 | 0,94 | 0,9 | 12 | 327 | 1 425 | 8,4 | 36,8 | TP | 4,36 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 70 | 26 | 23 | II | 27,49 | | DKĘP | | 33 | 145 | 1,1 | 4,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 100 | 38 | 26 | II | 26,00 | | | | 33 | 145 | 1,1 | 4,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 1 715 | 10,6 | 46,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112g | I | 3,05 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 42 | 19 | 19 | IA | 31,38 | 1,04 | 0,9 | 12 | 284 | 865 | 11,7 | 35,7 | TP | 3,05 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 42 | 17 | 17 | II | 28,93 | | KĘP | | 22 | 65 | 1,1 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 306 | 930 | 12,8 | 39,0 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,23 ha: SO 85 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 112h | I | 6,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 64 | 25 | 24 | IA | 30,10 | 1,05 | 0,9 | 12 | 392 | 2 440 | 10,6 | 66,3 | TP | 6,23 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 64 | 23 | 21 | II | 26,83 | | GRP | | 27 | 170 | 1,2 | 7,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OS | MJS | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | DB.B | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 419 | 2 610 | 11,8 | 73,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112i | I | 3,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 44 | 19 | 19 | IA | 30,63 | 1,09 | 0,9 | 22 | 164 | 610 | 6,6 | 24,4 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 44 | 16 | 16 | II | 27,32 | | DKĘP | | 49 | 180 | 2,1 | 7,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 65 | 24 | 24 | I | 29,87 | | | | 66 | 245 | 2,4 | 8,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | 1 | 65 | 23 | 22 | II | 27,54 | | | | 33 | 120 | 1,2 | 4,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OS | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | BK | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | OL | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | DB.S | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | SO | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | OL | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | SO | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty | | DB.S | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 85 l., OL 85 l., | | | | | | | | | | Razem: | | 312 | 1 155 | 12,3 | 45,8 | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | płaty roślinności: goździk siny 1 szt. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112~a | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112~b | III | 0,40 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 112** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **28,65** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **28,17** | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **10 258** | | | | |
| | **III** | **0,48** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **10 240** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **18** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **10 258** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113a | I | 0,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 6 | 90 | 31 | 25 | III | 25,90 | 0,58 | 0,8 | 3 | 247 | 235 | 3,9 | 3,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 90 | 35 | 27 | I | 28,36 | | WKĘP | 3 | 23 | 20 | 2,6 | 2,5 | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 270 | 255 | 6,5 | 6,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | OL | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 0,96 ha | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W bagno o pow. 0,27 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113b | IV | 1,20 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 60 | 23 | 20 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 1,2 ha | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 113c | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 7 | 85 | 28 | 21 | IV | 22,71 | 1,13 | 0,9 | 3 | 270 | 290 | 6,4 | 6,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 70 | 25 | 22 | II | 26,58 | | WKĘP | 4 | 65 | 70 | 2,5 | 2,6 | | |
| | | | | | BRZ | 1 | 70 | 20 | 20 | III | 23,05 | | | 4 | 18 | 20 | 0,6 | 0,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | PJD | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | PJD | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | SO | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.B | PJD | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | SO | MJS | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 353 | 380 | 9,4 | 10,1 | | |
| | | | Gosp.: S | PODSZ | OL | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części E bagno o pow. 0,1 ha | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113d | I | 8,60 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 61 | 24 | 23 | I | 29,79 | 1,00 | 0,9 | 12 | 360 | 3 095 | 10,3 | 88,8 | TP | 8,60 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 61 | 22 | 21 | II | 27,46 | | GRP | | 22 | 190 | 1,1 | 9,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | PJD | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | PJD | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.B | PJD | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 382 | 3 285 | 11,5 | 98,6 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W bagno o pow. 0,14 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 113f | I | 1,79 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 65 | 25 | 24 | I | 29,87 | 0,98 | 0,9 | 22 | 207 | 370 | 7,8 | 14,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 65 | 24 | 20 | III | 25,70 | | WKĘP | | 76 | 135 | 1,1 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 90 | 35 | 25 | I | 26,37 | | | | 44 | 80 | 0,9 | 1,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | 1 | 90 | 36 | 25 | II | 26,26 | | | | 33 | 60 | 1,1 | 2,0 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB.B | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 645 | 10,9 | 19,4 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113g | I | 2,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 3 | | | | | 1,00 | 0,0 | 11 | | | | | CW | 2,38 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB | 2 | 4 | | | | | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KL | MJS | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | SO | | 100 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 40 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113~a | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113~b | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 113** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **16,21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **4 615** | | | | |
| | **I** | **14,80** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,21** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **4 565** | | | | |
| | **IV** | **1,20** | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **4 605** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **10** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114a | I | 0,91 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | BRZ | 5 | 30 | 14 | 14 | I | 27,65 | 0,93 | 0,9 | 22 | 70 | 65 | 4,5 | 4,1 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z | | SO | 2 | 30 | 12 | 12 | I | 28,29 | | WKĘP | | 32 | 30 | 2,2 | 2,0 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | 2 | 50 | 21 | 18 | II | 24,76 | | | | 43 | 40 | 1,4 | 1,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 90 | 28 | 24 | III | 24,96 | | | | 32 | 30 | 0,9 | 0,8 | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | OL | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | DB.S | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | SO | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | MJS | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | 177 | 165 | 9,0 | 8,2 | | |
| | | | Gosp.: S | PODSZ | OL | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114b | I | 2,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 55 | 24 | 23 | IA | 31,35 | 1,00 | 0,9 | 12 | 199 | 475 | 6,1 | 14,5 | TP | 2,38 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 55 | 21 | 21 | II | 28,84 | | WKĘP | | 50 | 120 | 2,4 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 44 | 18 | 18 | I | 29,52 | | | | 61 | 145 | 2,4 | 5,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | 1 | 44 | 17 | 16 | II | 27,32 | | | | 17 | 40 | 1,0 | 2,4 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | ŚW | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | MD | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | OL | MJS | 108 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet | | BK | MJS | 108 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.B | MJS | 108 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 327 | 780 | 11,8 | 28,2 | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 114c | I | 1,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 44 | 19 | 19 | IA | 30,63 | 1,06 | 0,9 | 12 | 273 | 525 | 10,3 | 19,9 | TP | 1,93 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 44 | 20 | 19 | I | 27,57 | | KĘP | | 22 | 40 | 0,9 | 1,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | 1 | 44 | 16 | 17 | II | 28,27 | | | | 16 | 30 | 1,1 | 2,1 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | MD | PJD | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 311 | 595 | 12,3 | 23,7 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | PRZES | BK | | 140 | 56 | 23 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| 114d | I | 8,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 54 | 24 | 22 | IA | 30,60 | 1,04 | 0,9 | 12 | 386 | 3 395 | 12,4 | 108,7 | TP | 8,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 54 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 3 395 | 12,4 | 108,7 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114f | I | 6,68 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 44 | 18 | 18 | I | 29,52 | 1,13 | 0,9 | 12 | 328 | 2 190 | 13,1 | 87,4 | TP | 6,68 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 44 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | PJD | 84 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 328 | 2 190 | 13,1 | 87,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 114g | I | 1,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 30 | 26 | I | 28,12 | 1,01 | 0,9 | 3 | 434 | 780 | 9,9 | 17,8 | IB (95%) | 1,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 85 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,80 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,80 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | MJS | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 780 | 9,9 | 17,8 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114~a | III | 0,36 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114~b | III | 0,28 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 114** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **23,14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **7 915** | | | | |
| | **I** | **22,50** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,64** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 905** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **10** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **7 915** | | | | |
| | Województwo: LUBUSKIE (08) | | Gmina: Pszczew (042) | | | | | | | | | | | | Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | |
| | Powiat: Międzyrzecki (03) | | Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115a | I | 6,17 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 24 | 24 | IA | 31,05 | 1,00 | 0,9 | 12 | 408 | 2 515 | 11,9 | 73,2 | TP | 6,17 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | MD | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.B | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 2 515 | 11,9 | 73,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 115b | I | 2,30 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 51 | 22 | 22 | IA | 31,49 | 0,93 | 0,9 | 12 | 210 | 485 | 7,1 | 16,2 | TP | 2,30 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 51 | 19 | 20 | II | 26,65 | | WKĘP | | 66 | 150 | 2,2 | 5,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 32 | 16 | 15 | IA | 31,20 | | | | 22 | 50 | 1,2 | 2,8 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | DB.B | PJD | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BK | PJD | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | PJD | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 298 | 685 | 10,4 | 24,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115c | I | 2,67 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 31 | 27 | IA | 30,82 | 0,97 | 0,8 | 2 | 442 | 1 180 | 10,8 | 28,8 | TP | 2,67 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 1 180 | 10,8 | 28,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODR | BK | 10 | 30 | | 10 | I | 33,44 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115d | I | 16,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 32 | 27 | I | 27,66 | 1,03 | 0,8 | 3 | 449 | 7 295 | 9,4 | 152,8 | IIIA (40%)/1 | 5,90 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BK | PJD | 95 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 2,36 |
| | | | | | BRZ | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/1 | 2,36 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | IIIA (40%)/2 | 5,93 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 2,38 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/2 | 2,38 |
| | | | | | DB.S | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | | | | | | | | | Razem: | | 449 | 7 295 | 9,4 | 152,8 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 30 l., ŚW 30 l., SO 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 115~a | III | 0,39 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115~b | III | 0,26 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 115** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **11 675** | | | | |
| | **I** | **27,39** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,65** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **11 675** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **11 675** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116a | I | 2,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 28 | 12 | 12 | I | 29,44 | 1,20 | 1,0 | 12 | 162 | 465 | 10,8 | 31,0 | TW | 2,86 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 1 | 28 | 8 | 9 | II | 26,15 | | WKĘP | | 5 | 15 | 0,8 | 2,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 1 | 28 | 8 | 9 | II | 26,15 | | | | 5 | 15 | 0,8 | 2,2 | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | MD | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | MJS | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 172 | 495 | 12,4 | 35,3 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 135 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 40 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | BK | | 100 | 37 | 20 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: BK 100 l., SO 135 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 65 | | | | |
| | | | w części NE kępa o pow. 0,14 ha: BK 100 l., SO 135 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l., BK 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | zapas na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 116b | I | 2,28 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 21 | 10 | 10 | IA | 31,31 | 0,75 | 1,0 | 12 | 76 | 175 | 6,9 | 15,8 | TW | 2,28 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 21 | 8 | 8 | II | 29,07 | | WKĘP | | 5 | 10 | 1,7 | 3,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | MD | MJS | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | Razem: | | 81 | 185 | 8,6 | 19,6 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | SO | | 135 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | 100 | 32 | 28 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna | | BK | | 100 | 34 | 24 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: BK 100 l., SO 135 l., | | BK | | 135 | 85 | 27 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | w części N kępa o pow. 0,11 ha: BK 100 l., DB.S 100 l., SO 135 l., | | DB.S | | 100 | 38 | 23 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 57 | | | | |
| 116c | I | 2,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 59 | 24 | 24 | IA | 31,30 | 1,13 | 0,9 | 12 | 375 | 775 | 10,5 | 21,7 | TP | 2,07 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 59 | 20 | 21 | II | 27,90 | | DKĘP | | 61 | 125 | 2,5 | 5,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | ŚW | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 436 | 900 | 13,0 | 26,9 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116d | I | 14,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 91 | 32 | 26 | I | 27,22 | 1,04 | 0,9 | 3 | 438 | 6 200 | 9,6 | 135,8 | IIIA (40%)/1 | 3,96 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | DB.B | PJD | 91 | | | | | | --- | | | | | | AGROT/1 | 1,59 |
| | | | ZG | | ŚW | MJS | 91 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/1 | 1,59 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | PJD | 91 | | | | | | | | | | | | IIIA (40%)/2 | 5,14 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BK | PJD | 70 | | | | | | | | | | | | AGROT/2 | 2,06 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowy /piasek | | BK | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ/2 | 2,06 |
| | | | luźny //// | | DB.B | MJS | 40 | | | | | | | | | | | | BRAK WSK/3 | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 6 200 | 9,6 | 135,8 | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | PODSZ | DB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 116f | I | 4,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 59 | 25 | 23 | IA | 30,29 | 1,10 | 0,9 | 12 | 265 | 1 065 | 7,5 | 30,2 | TP | 4,01 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 4 | 59 | 20 | 20 | II | 27,00 | | DKĘP | | 110 | 440 | 4,7 | 19,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | PJD | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 1 505 | 12,3 | 49,2 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | PRZES | BK | | 120 | 73 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 30 l., SO 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116~a | III | 0,34 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116~b | III | 0,44 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 116** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **9 412** | | | | |
| | **I** | **25,38** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,78** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **9 285** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **127** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **9 412** | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117a | I | 19,97 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 59 | 25 | 24 | IA | 31,30 | 0,93 | 0,9 | 12 | 155 | 3 095 | 4,6 | 90,8 | TP | 19,97 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 59 | 22 | 21 | II | 27,90 | | WKĘP | | 55 | 1 100 | 2,2 | 43,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 59 | 22 | 22 | I | 33,57 | | | | 28 | 560 | 1,4 | 27,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | 2 | 45 | 19 | 19 | IA | 30,27 | | | | 55 | 1 100 | 2,3 | 46,2 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.B | 1 | 75 | 29 | 24 | II | 27,54 | | | | 33 | 660 | 1,1 | 22,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | MD | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | MJS | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BK | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita | | SO | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l., BRZ 135 l., | | BK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 33 l., BRZ 33 l., | | | | | | | | | | Razem: | | 326 | 6 515 | 11,6 | 230,8 | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117b | I | 1,72 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 39 | 19 | 19 | IA | 32,60 | 0,83 | 0,9 | 12 | 196 | 335 | 9,2 | 15,8 | TP | 1,72 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 39 | 20 | 20 | I | 30,51 | | DKĘP | | 22 | 40 | 0,8 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 32 | 15 | 15 | IA | 31,20 | | | | 22 | 40 | 1,1 | 1,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 240 | 415 | 11,1 | 19,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 117c | I | 2,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 4 | | 1 | I | 27,56 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 2,00 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 4 | | 1 | I | 33,42 | | WKĘP | | | | | | CP | 0,87 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 2 | 15 | | 5 | II | 28,93 | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | 1 | 15 | | 6 | I | 45,45 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | BRZ | MJS | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 110 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | 80 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | 80 | 26 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej | | ŚW | | 80 | 32 | 20 | | | | | 3 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 42 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 80 l., ŚW 80 l., BK 80 l., SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117d | I | 1,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 27 | 24 | IA | 31,56 | 1,00 | 0,9 | 12 | 408 | 735 | 12,1 | 21,8 | TP | 1,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 735 | 12,1 | 21,8 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117f | I | 1,39 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 31 | 15 | 15 | IA | 31,74 | 0,92 | 0,9 | 12 | 153 | 215 | 8,5 | 11,8 | TW | 1,39 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 31 | 15 | 17 | I | 30,89 | | DKĘP | | 22 | 30 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 31 | 12 | 12 | I | 36,91 | | | | 5 | 5 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | 1 | 50 | 18 | 19 | II | 28,33 | | | | 16 | 20 | 1,1 | 1,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 196 | 270 | 11,5 | 15,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | BK | | 110 | 54 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | 80 | 29 | 19 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 117g | I | 0,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 4 | 19 | 9 | 9 | IA | 31,34 | 1,00 | 1,0 | 12 | 30 | 20 | 4,8 | 2,9 | TW | 0,61 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z | | BRZ | 3 | 19 | 9 | 11 | I | 32,00 | | KĘP | | 30 | 20 | 3,2 | 2,0 | | |
| | | | TD: ZG | | BK | 2 | 19 | | 4 | II | 27,69 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 19 | 10 | 10 | I | 38,37 | | | | 5 | 5 | 1,0 | 0,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 65 | 45 | 9,0 | 5,5 | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | //// | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PRZES | DB.S | | 155 | 97 | 26 | | | | | 3 | | 25 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117~a | III | 0,08 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117~b | III | 0,46 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 117** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 067** | | | | |
| | **I** | **28,36** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,54** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 980** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **87** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 067** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 118a | I | 1,03 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 58 | 27 | 23 | IA | 30,55 | 1,05 | 0,9 | 12 | 408 | 420 | 12,3 | 12,6 | TP | 1,03 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BK | MJS | 58 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 408 | 420 | 12,3 | 12,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118b | I | 13,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 4 | 90 | 36 | 27 | II | 28,19 | 0,86 | 0,9 | 22 | 153 | 2 055 | 4,3 | 57,5 | TP | 13,44 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | SO | 4 | 90 | 35 | 28 | I | 29,35 | | GRP | | 153 | 2 055 | 3,5 | 47,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 2 | 110 | 61 | 27 | III | 25,23 | | | | 88 | 1 185 | 2,3 | 31,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | GB | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | ŚW | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.B | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB.B | PJD | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | GB | MJS | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | Razem: | | 394 | 5 295 | 10,1 | 136,1 | | |
| | | | | PODSZ | BK | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 118c | I | 4,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 65 | 28 | 25 | IA | 30,87 | 0,90 | 0,9 | 22 | 218 | 875 | 5,4 | 21,5 | TP | 4,02 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 75 | 31 | 25 | I | 28,84 | | WKĘP | | 65 | 260 | 2,0 | 7,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 2 | 90 | 35 | 28 | I | 29,35 | | | | 76 | 305 | 1,8 | 7,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.S | 1 | 120 | 55 | 28 | II | 26,04 | | | | 33 | 135 | 0,9 | 3,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL | | BK | PJD | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OS | PJD | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OL | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA | | | | | | | | | | Razem: | | 392 | 1 575 | 10,1 | 40,5 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,41 ha: BRZ 33 l., DB.S 33 l., SO 33 l., w części SW bagno o pow. 0,07 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118d | I | 2,47 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 42 | 19 | 20 | II | 28,41 | 0,88 | 0,9 | 12 | 273 | 675 | 11,2 | 27,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | MJS | 120 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 273 | 675 | 11,2 | 27,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BK | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,47 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 118f | I | 1,38 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 62 | 25 | 24 | IA | 30,56 | 0,94 | 0,8 | 12 | 273 | 375 | 7,8 | 10,7 | TP | 1,38 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | BK | 3 | 62 | 20 | 21 | I | 31,02 | | GRP | | 82 | 115 | 4,1 | 5,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | ŚW | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// | | DB.B | MJS | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 355 | 490 | 11,8 | 16,3 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118g | IV | 1,62 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | SO | | 65 | 34 | 22 | | | | | 3 | | 35 | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie | | | | | | | | | | Razem: | | | 35 | | | | |
| | | | (Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 1,62 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118h | I | 0,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.B | 7 | 85 | 31 | 27 | II | 28,85 | 0,83 | 0,9 | 12 | 247 | 200 | 7,5 | 6,0 | TP | 0,80 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | BK | 2 | 85 | 37 | 26 | II | 29,30 | | GRP | | 82 | 65 | 2,6 | 2,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 120 | 56 | 27 | III | 23,73 | | | | 41 | 35 | 1,1 | 0,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | SO | PJD | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | GB | MJS | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | | ŚW | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: ścioła | | | | | | | | | | Razem: | | 370 | 300 | 11,1 | 8,9 | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,8 | PODSZ | BK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | ha | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118i | I | 1,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 75 | 32 | 28 | IA | 31,81 | 0,80 | 0,9 | 3 | 215 | 250 | 5,7 | 6,7 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.B | 3 | 120 | 51 | 28 | II | 26,04 | | DKĘP | 3 | 136 | 160 | 2,6 | 3,0 | | |
| | | | TD: ZG | | OL | 1 | 100 | 42 | 26 | III | 26,00 | | | 3 | 40 | 45 | 0,8 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | GB | PJD | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | PJD | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 391 | 455 | 9,2 | 10,6 | | |
| | | | Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///pył | PODSZ | LSZ | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | piaszczysty //// POROL | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, borówka czarna, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S bagno o pow. 0,15 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118~a | III | 0,44 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118~b | III | 0,51 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 118** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **26,87** | | | | | | | | | | | | | | **9 245** | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **24,30** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **III** | **0,95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **IV** | **1,62** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Policko (0008) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119a | IV | 2,62 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 80 | 31 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 80 | 26 | 23 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | SO | | 60 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 27 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 119b | I | 4,93 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 32 | 28 | IA | 30,92 | 1,09 | 0,8 | 2 | 363 | 1 790 | 8,0 | 39,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG | | DB.S | 3 | 80 | 30 | 26 | II | 28,61 | | WKĘP | 2 | 136 | 670 | 3,9 | 19,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | PJD | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | | | | | | | | | Razem: | | 499 | 2 460 | 11,9 | 58,7 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 4,93 ha | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, kuklik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119c | IV | 0,89 | Rodzaj powierzchni: Ł | ZADRZEW | BRZ | | 45 | 18 | 18 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 45 | 18 | 17 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | DB.S | | 45 | 17 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 6 | | | | |
| 119d | I | 3,85 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 53 | 24 | 23 | IA | 31,92 | 1,09 | 0,9 | 12 | 243 | 935 | 8,0 | 30,6 | TP | 3,85 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 53 | 19 | 19 | II | 27,53 | | WKĘP | | 83 | 320 | 3,5 | 13,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 1 | 53 | 21 | 22 | I | 28,26 | | | | 33 | 125 | 0,8 | 3,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | MD | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | BK | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OS | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.C | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | MJS | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 1 380 | 12,3 | 47,2 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | AK | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KL | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 119f | I | 4,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 49 | 22 | 22 | IA | 32,12 | 1,01 | 0,9 | 12 | 284 | 1 240 | 10,2 | 44,6 | TP | 4,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 49 | 20 | 19 | II | 28,61 | | KĘP | | 55 | 240 | 2,3 | 9,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, płaski | | OS | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | MJS | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 1 480 | 12,5 | 54,5 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica | | OS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119g | I | 5,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 39 | 19 | 20 | IA | 33,72 | 0,90 | 1,0 | 12 | 294 | 1 650 | 12,5 | 70,3 | TP | 5,62 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 39 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 294 | 1 650 | 12,5 | 70,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119h | I | 0,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | 0,63 | 0,6 | 3 | 204 | 165 | 6,0 | 4,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 130 | 37 | 25 | III | 21,76 | | WKĘP | 3 | 51 | 40 | 0,9 | 0,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 255 | 205 | 6,9 | 5,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | GŁG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, jeżyna, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 119i | I | 0,13 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | DB.S | 9 | 120 | 40 | 26 | III | 23,89 | 0,85 | 0,9 | 3 | 344 | 45 | 7,7 | 1,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z | | OL | 1 | 100 | 33 | 25 | III | 25,00 | | JDN | 3 | 51 | 5 | 0,8 | 0,1 | | |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | KSZ | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 36% równe 19.80 st, wystawa | | LP | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | W | | JS | PJD | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// | | | | | | | | | | Razem: | | 395 | 50 | 8,6 | 1,1 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: REF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119j | I | 1,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 38 | 18 | 19 | IA | 33,04 | 0,96 | 1,0 | 22 | 251 | 415 | 11,6 | 19,2 | TP | 1,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 38 | 19 | 18 | I | 31,30 | | GRP | | 27 | 45 | 1,1 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | PJD | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OS | PJD | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | LP | PJD | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 278 | 460 | 12,7 | 21,0 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | OS | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | DB.S | | 120 | 49 | 25 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek darniowy, malina właściwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 119k | I | 0,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 2 | I | 29,73 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 0,78 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 6 | | 1 | II | 26,80 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PRZES | DB.S | | 65 | 30 | 16 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119l | I | 1,44 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 56 | 26 | 24 | IA | 32,10 | 1,05 | 0,9 | 23 | 320 | 460 | 9,0 | 12,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 85 | 31 | 25 | I | 27,13 | | WKĘP | | 110 | 160 | 3,0 | 4,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 430 | 620 | 12,0 | 17,2 | | |
| | | | POROL | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119m | I | 1,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 65 | 29 | 24 | I | 29,87 | 1,00 | 0,9 | 13 | 349 | 460 | 10,2 | 13,4 | TP | 1,32 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 65 | 26 | 22 | II | 27,54 | | GRP | | 44 | 60 | 1,2 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny pagórkowaty, grzbiet | | | | | | | | | | Razem: | | 393 | 520 | 11,3 | 15,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119~a | III | 0,04 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 119** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Policko (0008)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **28,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 874** | | | | | | |
| | **I** | **24,90** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | | |
| | **III** | **0,04** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 825** | | | | | | |
| | **IV** | **3,51** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **16** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 841** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **33** | | | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120a | I | 2,59 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 1,00 | 0,8 | 3 | 419 | 1 085 | 9,9 | 25,7 | TP | 2,59 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | OL | 1 | 75 | 30 | 26 | II | 28,23 | | WKĘP | 3 | 45 | 115 | 1,2 | 3,1 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | 464 | 1 200 | 11,1 | 28,8 | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 33 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 120b | I | 1,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 27 | 12 | 13 | IA | 31,47 | 0,64 | 1,0 | 22 | 70 | 80 | 4,6 | 5,1 | TW | 1,12 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 4 | 27 | 10 | 12 | I | 30,36 | | GRP | | 16 | 20 | 2,6 | 3,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | 1 | 27 | 13 | 16 | I | 29,52 | | | | 16 | 20 | 0,9 | 1,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | BK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | ŚW | MJS | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 102 | 120 | 8,1 | 9,1 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | LSZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, trawy, nereczница | PRZES | SO | | 130 | 44 | 29 | | | | | 3 | | 45 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 70 l., DB.S 100 l., SO 130 l., | | DB.S | | 100 | 38 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 100 l., SO 130 l., | | DB.S | | 70 | 29 | 22 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 70 | | | | |
| 120c | I | 0,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 57 | 25 | 23 | IA | 30,81 | 1,01 | 0,9 | 22 | 331 | 165 | 10,8 | 5,4 | TP | 0,50 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ | | AK | 1 | 57 | 18 | 19 | III | 22,50 | | KĘP | | 33 | 15 | 0,7 | 0,3 | | |
| | | | ZG | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 180 | 11,5 | 5,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 120d | I | 4,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 70 | 29 | 27 | IA | 31,79 | 0,92 | 0,9 | 12 | 382 | 1 610 | 9,8 | 41,2 | TP | 4,22 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 100 | 40 | 29 | I | 29,00 | | WKĘP | | 44 | 185 | 0,9 | 3,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | BRZ | PJD | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BK | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | MJS | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | Razem: | | 426 | 1 795 | 10,6 | 44,9 | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120f | I | 1,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 6 | | 1 | III | 21,03 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CW | 1,64 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 3 | 8 | | 1 | III | 22,45 | | WKĘP | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | 1 | 7 | | 1 | I | 32,29 | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 7 | | 1 | I | 30,63 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | PJD | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | KL | MJS | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | AK | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PRZES | OL | | 95 | 31 | 25 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | | | SO | | 95 | 35 | 26 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | | 65 | 20 | 19 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BRZ | | 65 | 22 | 21 | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | Razem: | | | 13 | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto na 1 ha | Grubizna m³ brutto zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 120g | I | 8,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 0,87 | 0,8 | 3 | 397 | 3 435 | 10,0 | 86,0 | TP | 8,65 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | OL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 3 435 | 10,0 | 86,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODR | BK | 10 | 31 | 7 | 10 | I | 32,43 | 0,10 | | 12 | 6 | 50 | 2,2 | 19,1 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | Razem: | | 6 | 50 | 2,2 | 19,1 | | |
| | | | Gosp.: Z | PODSZ | ŚW | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120h | I | 2,10 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | AK | 6 | 75 | 33 | 27 | I | 28,96 | 0,66 | 0,7 | 3 | 151 | 315 | 2,4 | 5,1 | IIIAU (90%) | 2,10 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | SO | 4 | 75 | 36 | 29 | IA | 32,80 | | KĘP | 3 | 127 | 265 | 3,4 | 7,1 | AGROT | 1,26 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,26 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | CP | 0,84 |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// | | AK | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 278 | 580 | 5,8 | 12,2 | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | PODR | DB.S | 10 | 8 | | 2 | II | 29,18 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,84 ha: DB.S 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120i | I | 2,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 32 | 26 | I | 27,36 | 1,03 | 0,8 | 3 | 434 | 915 | 9,6 | 20,3 | IB (95%) | 2,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,11 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,11 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | PJD | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 915 | 9,6 | 20,3 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 120j | I | 1,04 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 29 | 25 | II | 27,92 | 0,75 | 0,9 | 3 | 360 | 375 | 9,5 | 9,8 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | SO | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 360 | 375 | 9,5 | 9,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /pył zwykły ///piasek | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zachwaszczona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABIL OBN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, jeżyna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW bagno o pow. 0,26 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120~a | III | 0,18 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120~b | III | 0,34 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 120** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **24,49** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 733** | | | | |
| | **I** | **23,97** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,52** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 650** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **83** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 733** | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 121a | I | 1,01 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 30 | 27 | IA | 31,79 | 0,97 | 0,8 | 12 | 447 | 450 | 11,3 | 11,4 | TP | 1,01 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | ŚW | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | 447 | 450 | 11,3 | 11,4 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121b | I | 1,02 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 100 | 38 | 28 | I | 28,00 | 0,77 | 0,7 | 3 | 347 | 355 | 7,4 | 7,6 | PIEL | 0,31 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 50 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | DB.S | MJS | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 347 | 355 | 7,4 | 7,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODS | DB.S | 10 | 5 | | | | | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB.S 5 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121c | I | 0,88 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 9 | 14 | | 10 | I | 31,02 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CP | 0,88 |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 14 | | 6 | I | 28,09 | | PAS | | | | | | | |
| | | | | | JS | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PRZES | OL | | 100 | 29 | 24 | | | | | 3 | | 10 | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | | | | | | | | | Razem: | | | 10 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia organiczna //pył piaszczysty //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: OL 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 121d | I | 1,78 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 95 | 36 | 28 | I | 28,65 | 0,69 | 0,7 | 3 | 278 | 495 | 6,5 | 11,5 | IIIAU (85%) | 1,78 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | DB.S | 1 | 95 | 35 | 26 | II | 26,60 | | KĘP | 3 | 35 | 60 | 0,9 | 1,5 | AGROT | 1,01 |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | PJD | 95 | | | | | | | | | | | | ODN-ZŁOŻ | 1,01 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | CP | 0,77 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | OL | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: klasa odnowienia | | | | | | | | | | Razem: | | 313 | 555 | 7,3 | 13,0 | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | PODR | DB.S | 10 | 8 | | 2 | II | 29,18 | 0,30 | | 11 | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,77 ha: DB.S 8 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121f | I | 1,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 3 | 16 | 7 | 11 | I | 30,61 | 0,90 | 1,0 | 12 | 15 | 30 | 3,5 | 6,8 | TW | 1,96 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | 2 | 16 | | 5 | I | 34,15 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | 2 | 16 | | 4 | III | 25,56 | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | 3 | 25 | 9 | 11 | I | 30,38 | | | | 20 | 40 | 2,4 | 4,7 | | |
| | | | Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// | | BRZ | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | AK | MJS | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | 35 | 70 | 5,9 | 11,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | PRZES | OL | | 100 | 33 | 25 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | JS | | 100 | 40 | 26 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | DB.S | | 100 | 42 | 24 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | Runo: trawy | | DB.S | | 65 | 25 | 22 | | | | | 4 | | 3 | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: OL 100 l., | | | | | | | | | | Razem: | | | 31 | | | | |
| | | | w części C kępa o pow. 0,1 ha: OL 100 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121g | I | 3,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 25 | 24 | IA | 31,05 | 0,97 | 0,9 | 11 | 397 | 1 475 | 11,6 | 43,1 | TP | 3,71 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | ŚW | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// | | AK | MJS | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 397 | 1 475 | 11,6 | 43,1 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 121h | I | 1,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 55 | 26 | 25 | I | 29,76 | 0,81 | 0,9 | 3 | 386 | 385 | 11,5 | 11,5 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG | | JS | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | KL | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia wapienna ///piasek luźny //// POROL | | AK | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | Razem: | | 386 | 385 | 11,5 | 11,5 | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121i | I | 14,41 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 71 | 31 | 27 | IA | 31,59 | 0,99 | 0,9 | 3 | 453 | 6 530 | 11,3 | 163,4 | TP | 14,41 |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 71 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.S | MJS | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | AK | MJS | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | SO | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JS | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB.S | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | ŚW | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 6 530 | 11,3 | 163,4 | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | PODSZ | DB | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N remiza o pow. 0,06 ha: KAL.K 25 l., DER.B 25 l., KRU 25 l., | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części S bagno o pow. 0,07 ha | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121j | I | 2,73 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 30 | 25 | I | 26,37 | 1,10 | 0,9 | 3 | 446 | 1 220 | 9,9 | 26,9 | IB (90%) | 2,73 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 2,73 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | PJD | 50 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 2,73 |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB.S | MJS | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | Razem: | | | 446 | 1 220 | 9,9 | 26,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | CZM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121k | I | 1,00 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 25 | 10 | 11 | I | 29,88 | 0,94 | 1,0 | 11 | 108 | 110 | 9,1 | 9,1 | TW | 1,00 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 1 | 25 | 7 | 9 | II | 27,84 | | KĘP | | 5 | 5 | 0,7 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BK | 1 | 25 | 7 | 10 | I | 39,58 | | | | 5 | 5 | 0,9 | 0,9 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | PJD | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | Razem: | | | 118 | 120 | 10,7 | 10,7 | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | PRZES | SO | | 120 | 39 | 28 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | Razem: | | | | 20 | | | | |
| | | | Runo: rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121l | IV | 0,64 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 60 | 24 | 22 | | | | | 4 | | 10 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 60 | 27 | 22 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 75 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | SO | | 75 | 32 | 24 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Razem: | | | | 22 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 121m | I | 1,36 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 34 | 28 | IA | 31,81 | 0,91 | 0,8 | 3 | 431 | 585 | 10,5 | 14,3 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z | | AK | MJS | 75 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | BRZ | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | OL | MJS | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 585 | 10,5 | 14,3 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| | | | POROL | | JW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, nerecznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121n | I | 0,57 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | OL | 10 | 70 | 29 | 25 | II | 27,92 | 0,84 | 0,9 | 3 | 403 | 230 | 10,4 | 5,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z | | SO | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | TD: CZ ZG | | AK | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: wodochronne | | KL | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | AK | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /pył zwykły ///piasek | | | | | | | | | | Razem: | | 403 | 230 | 10,4 | 5,9 | | |
| | | | luźny //// POROL | PODSZ | BEZ.C | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: silnie zadarniona | | DER.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121o | IV | 0,60 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 70 | 31 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121p | IV | 1,24 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | SO | | 70 | 31 | 26 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 70 | 29 | 24 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | ŚW | | 50 | 17 | 18 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 25 | | | | |
| | | | | ZAKRZEW | WB | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | | | CZM.P | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 121r | I | 0,55 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 31 | 14 | 16 | IA | 33,00 | 0,92 | 1,0 | 22 | 142 | 80 | 8,8 | 4,8 | TW | 0,55 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 3 | 31 | 14 | 17 | I | 30,89 | | KĘP | | 65 | 35 | 2,9 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 207 | 115 | 11,7 | 6,4 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek darniowy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121s | I | 1,71 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 55 | 27 | 25 | IA | 33,39 | 0,88 | 0,9 | 22 | 375 | 640 | 11,6 | 19,9 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | MJS | 55 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | TP | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | DB.S | MJS | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | | | | | | | | | Razem: | | 375 | 640 | 11,6 | 19,9 | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | KRU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: trawy, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 30 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121t | IV | 0,13 | Rodzaj powierzchni: BAGNO | ZADRZEW | OL | | 55 | 19 | 17 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | BRZ | | 30 | 12 | 14 | | | | | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 7 | | | | |
| 121~a | III | 0,12 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121~b | III | 0,13 | Rodzaj powierzchni: LINIE | ZADRZEW | OL | | 70 | 30 | 23 | | | | | 4 | | 10 | | | DRZEW (100%) | |
| | | | Informacje: L. proj. | | SO | | 70 | 31 | 25 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | OL | | 55 | 21 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| 121~c | III | 0,41 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121~d | III | 0,11 | Rodzaj powierzchni: ROWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| **Podsumowanie dla oddziału: 121** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | **37,07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **I** | **33,69** | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **12 885** | | | |
| | **III** | **0,77** | | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | |
| | **IV** | **2,61** | | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **12 730** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **61** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **12 791** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **III - zadrzewienia:** | **20** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **IV - zadrzewienia:** | **74** | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122a | I | 1,61 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 95 | 30 | 25 | II | 25,66 | 1,10 | 0,9 | 2 | 438 | 705 | 9,4 | 15,2 | IB (90%) | 1,61 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | MJS | 35 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,61 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,61 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | AK | MJS | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 438 | 705 | 9,4 | 15,2 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// | PODSZ | SO | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacje: RET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122b | I | 2,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 23 | 9 | 9 | I | 28,02 | 1,09 | 1,0 | 11 | 81 | 180 | 9,4 | 20,8 | TW | 2,22 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 23 | 11 | 11 | I | 28,14 | | DKĘP | | 27 | 60 | 2,0 | 4,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 108 | 240 | 11,4 | 25,3 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 122c | I | 2,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 80 | 27 | 24 | I | 26,95 | 1,08 | 0,9 | 2 | 329 | 930 | 7,3 | 20,6 | TP | 2,83 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 95 | 33 | 26 | I | 26,66 | | WKĘP | 2 | 91 | 260 | 1,9 | 5,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | 1 | 63 | 20 | 20 | I | 26,24 | | | 4 | 11 | 30 | 1,1 | 3,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 220 | 10,3 | 29,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122d | I | 1,19 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 55 | 20 | 19 | I | 27,18 | 1,14 | 0,9 | 11 | 276 | 330 | 8,4 | 10,0 | TP | 1,19 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 65 | 22 | 22 | I | 27,85 | | KĘP | | 94 | 110 | 3,6 | 4,2 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 370 | 440 | 12,0 | 14,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122f | I | 5,47 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 75 | 26 | 25 | I | 28,84 | 1,08 | 0,9 | 2 | 374 | 2 045 | 8,9 | 48,7 | TP | 5,47 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 2 | 90 | 34 | 26 | I | 27,36 | | WKĘP | 2 | 79 | 430 | 2,0 | 10,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | SO | MJS | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 453 | 2 475 | 10,9 | 59,6 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | SO | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 56 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 122g | I | 1,56 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 21 | 8 | 8 | I | 27,73 | 1,24 | 1,0 | 11 | 87 | 135 | 10,0 | 15,6 | TW | 1,56 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 21 | 10 | 10 | I | 28,24 | | DKĘP | | 11 | 15 | 2,2 | 3,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 98 | 150 | 12,2 | 19,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PRZES | SO | | 120 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122h | I | 0,84 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 22 | 21 | IA | 32,43 | 0,97 | 0,9 | 11 | 339 | 285 | 12,6 | 10,6 | TP | 0,84 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | PJD | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 339 | 285 | 12,6 | 10,6 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //// POROL | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| 122i | I | 2,96 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 23 | 21 | I | 27,99 | 1,04 | 0,9 | 11 | 364 | 1 075 | 11,3 | 33,5 | TP | 2,96 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB | MJS | 60 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 364 | 1 075 | 11,3 | 33,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODR | BK | 10 | 22 | | 2 | V | 14,45 | 0,10 | | 11 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// POROL | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122j | I | 0,80 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 9 | 9 | I | 28,02 | 1,07 | 1,0 | 11 | 92 | 75 | 10,4 | 8,3 | TW | 0,80 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 10 | 10 | II | 26,55 | | DKĘP | | 11 | 10 | 0,9 | 0,7 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 103 | 85 | 11,3 | 9,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, trzcinnik, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122k | I | 1,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 75 | 32 | 27 | IA | 30,82 | 1,10 | 0,9 | 2 | 340 | 465 | 7,1 | 9,7 | TP | 1,37 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 4 | 100 | 44 | 23 | III | 23,00 | | JDN | 2 | 136 | 185 | 4,3 | 5,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 476 | 650 | 11,3 | 15,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 122l | I | 1,50 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 90 | 33 | 26 | I | 27,36 | 1,10 | 0,9 | 3 | 411 | 615 | 8,1 | 12,1 | IB (95%) | 1,50 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | 2 | 90 | 35 | 23 | III | 24,32 | | GRP | 3 | 47 | 70 | 2,3 | 3,4 | AGROT | 1,50 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 90 | | | | | | | | | | | | ODN-ZRB | 1,50 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 685 | 10,3 | 15,5 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, konwalia majowa, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122~a | III | 0,10 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 122** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **22,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 030** | | | | |
| | **I** | **22,35** | | | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | |
| | **III** | **0,10** | | | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 010** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **20** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 030** | | | | |
| Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123a | I | 4,89 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 57 | 18 | 19 | I | 26,65 | 0,85 | 0,9 | 11 | 265 | 1 295 | 9,5 | 46,5 | TP | 4,89 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 265 | 1 295 | 9,5 | 46,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 123b | I | 8,77 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 38 | 16 | 15 | I | 28,37 | 1,12 | 0,9 | 11 | 218 | 1 910 | 11,4 | 99,6 | TP | 8,77 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 58 | 19 | 18 | II | 25,33 | | KĘP | | 44 | 385 | 1,1 | 9,8 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 262 | 2 295 | 12,5 | 109,4 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123c | I | 0,45 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 5 | 60 | 20 | 18 | II | 24,84 | 1,15 | 0,9 | 11 | 166 | 75 | 5,6 | 2,5 | TP | 0,45 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 5 | 45 | 15 | 14 | II | 24,54 | | WKĘP | | 121 | 55 | 5,7 | 2,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 287 | 130 | 11,3 | 5,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123d | I | 1,22 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 28 | 23 | II | 25,13 | 1,10 | 0,9 | 3 | 411 | 500 | 9,8 | 12,0 | IB (95%) | 1,22 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,22 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 411 | 500 | 9,8 | 12,0 | ODN-ZRB | 1,22 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | SO | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 123f | I | 2,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 29 | 25 | I | 28,84 | 1,11 | 0,9 | 2 | 465 | 965 | 11,4 | 23,5 | TP | 2,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 465 | 965 | 11,4 | 23,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | SO | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W remiza o pow. 0,14 ha: BRZ 20 l., CZR.P 33 l., KRU 33 l., CZM 33 l., LP 33 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123g | I | 1,23 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 6 | | 2 | I | 29,73 | 1,00 | 1,0 | 11 | | | | | CW | 1,23 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 6 | | 4 | I | 42,74 | | KĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | PODSZ | CZM | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 104 | 30 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 104 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123h | I | 1,08 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 66 | 22 | 20 | II | 25,58 | 0,96 | 0,9 | 11 | 218 | 235 | 6,9 | 7,4 | TP | 1,08 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 3 | 56 | 19 | 18 | II | 25,84 | | WKĘP | | 87 | 95 | 3,1 | 3,3 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 330 | 9,9 | 10,7 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 123i | I | 0,65 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 68 | 22 | 21 | I | 26,18 | 0,87 | 0,9 | 11 | 305 | 200 | 9,2 | 6,0 | TP | 0,65 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 200 | 9,2 | 6,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123j | I | 0,64 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 60 | 18 | 18 | II | 24,84 | 1,02 | 0,9 | 11 | 298 | 190 | 10,2 | 6,5 | TP | 0,64 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 298 | 190 | 10,2 | 6,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123k | I | 1,37 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 19 | 8 | 8 | I | 29,43 | 1,00 | 1,0 | 11 | 55 | 75 | 10,1 | 13,8 | TW | 1,37 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 19 | 10 | 11 | I | 32,00 | | DKĘP | | 10 | 15 | 1,1 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 65 | 90 | 11,2 | 15,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | CZM.P | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | PRZES | SO | | 75 | 27 | 22 | | | | | 3 | | 15 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | Razem: | | | 15 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 75 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 123l | I | 1,29 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 75 | 28 | 25 | I | 28,84 | 1,05 | 0,9 | 2 | 442 | 570 | 10,9 | 14,1 | TP | 1,29 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 442 | 570 | 10,9 | 14,1 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | JRZ | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123m | I | 0,54 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 29 | 24 | II | 25,37 | 1,18 | 0,9 | 3 | 458 | 245 | 10,1 | 5,5 | IB (95%) | 0,54 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.B | MJS | 90 | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 0,54 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 458 | 245 | 10,1 | 5,5 | ODN-ZRB | 0,54 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinIasty /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123n | I | 1,81 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 85 | 24 | 22 | II | 24,13 | 1,22 | 0,9 | 4 | 434 | 785 | 10,3 | 18,7 | IB (95%) | 1,81 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | AGROT | 1,81 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 434 | 785 | 10,3 | 18,7 | ODN-ZRB | 1,81 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 123o | I | 0,83 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 70 | 21 | 20 | II | 24,75 | 0,96 | 0,9 | 11 | 316 | 260 | 9,4 | 7,8 | TP | 0,83 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 316 | 260 | 9,4 | 7,8 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123p | I | 1,98 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 19 | 7 | 7 | I | 27,40 | 1,00 | 1,0 | 11 | 40 | 80 | 8,3 | 16,4 | TW | 1,98 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 19 | 9 | 9 | I | 28,42 | | DKĘP | | 5 | 10 | 1,8 | 3,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 45 | 90 | 10,1 | 20,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 105 | 30 | 22 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123r | I | 2,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 33 | 12 | 12 | I | 26,75 | 1,05 | 0,9 | 11 | 142 | 305 | 10,2 | 22,1 | TW | 2,16 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 33 | 13 | 13 | II | 24,81 | | RZĘD | | 22 | 50 | 0,9 | 1,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 164 | 355 | 11,1 | 24,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | DB.B | | 80 | 30 | 14 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123~a | III | 0,56 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123~b | III | 0,23 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podsumowanie dla oddziału: 123** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **31,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 376** | | | | | |
| | **I** | **30,98** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **III** | **0,79** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **8 300** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **76** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 376** | | | | | |

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124a | I | 2,16 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 6 | 49 | 16 | 16 | II | 25,61 | 0,89 | 0,9 | 11 | 164 | 355 | 5,8 | 12,6 | TP | 2,16 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 49 | 22 | 19 | II | 26,10 | | WKĘP | | 22 | 50 | 0,7 | 1,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | 3 | 37 | 14 | 14 | II | 24,34 | | | | 22 | 50 | 2,3 | 4,9 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | DB.B | MJS | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 208 | 455 | 8,8 | 19,0 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PRZES | SO | | 110 | 39 | 21 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124b | I | 2,25 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 68 | 21 | 20 | II | 25,16 | 0,96 | 0,9 | 11 | 283 | 635 | 8,6 | 19,4 | TP | 2,25 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | SO | 1 | 38 | 15 | 15 | I | 28,37 | | WKĘP | | 22 | 50 | 1,1 | 2,5 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 685 | 9,8 | 22,0 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | na 1 ha | na całej pow. | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | | | | |
| 124c | I | 1,11 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 7 | 57 | 25 | 23 | IA | 30,81 | 0,96 | 0,9 | 11 | 320 | 355 | 8,1 | 9,0 | TP | 1,11 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 57 | 25 | 24 | I | 29,41 | | GRP | | 33 | 35 | 1,4 | 1,6 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | 1 | 35 | 14 | 13 | I | 32,12 | | | | 6 | 5 | 1,3 | 1,4 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | ŚW | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | OL | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | OS | MJS | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | Razem: | | 359 | 395 | 10,8 | 12,0 | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | BK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | PRZES | SO | | 110 | 33 | 24 | | | | | 3 | | 30 | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, trzcinnik | | | | | | | | | | Razem: | | | 30 | | | | |
| | | | PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124d | I | 1,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 70 | 26 | 25 | I | 29,81 | 1,13 | 0,9 | 11 | 392 | 420 | 9,7 | 10,3 | TP | 1,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | DB.S | 2 | 95 | 39 | 23 | III | 23,64 | | GRP | | 76 | 80 | 2,2 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | BRZ | MJS | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | BK | MJS | 95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | 468 | 500 | 11,9 | 12,7 | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124f | I | 2,40 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 48 | 16 | 15 | II | 24,77 | 0,96 | 0,9 | 11 | 219 | 525 | 10,0 | 24,0 | TP | 2,40 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 48 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 219 | 525 | 10,0 | 24,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124g | I | 3,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 80 | 33 | 27 | I | 29,93 | 0,95 | 0,9 | 2 | 431 | 1 325 | 10,1 | 31,1 | TP | 3,07 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | OL | MJS | 80 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | ŚW | MJS | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 431 | 1 325 | 10,1 | 31,1 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | KRU | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// | | SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POROL | | BEZ.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | BRZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | OL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124h | I | 1,62 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 67 | 22 | 21 | I | 26,39 | 0,87 | 0,9 | 11 | 305 | 495 | 9,3 | 15,0 | TP | 1,62 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 67 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 305 | 495 | 9,3 | 15,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, wrzos pospolity, chrobotki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124i | I | 0,90 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 45 | 16 | 15 | II | 25,73 | 0,72 | 0,9 | 11 | 164 | 150 | 8,4 | 7,6 | TP | 0,90 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | MJS | 45 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | DB.B | MJS | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 164 | 150 | 8,4 | 7,6 | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124j | I | 9,12 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 45 | 16 | 15 | II | 25,73 | 0,83 | 0,9 | 11 | 175 | 1 595 | 8,4 | 76,4 | TP | 9,12 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 36 | 15 | 15 | II | 25,96 | | WKĘP | | 11 | 100 | 0,8 | 6,9 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 186 | 1 695 | 9,1 | 83,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | PRZES | DB.S | | 110 | 37 | 16 | | | | | 3 | | 5 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | Razem: | | | 5 | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, wrzos pospolity, chrobotki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124k | I | 1,21 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 23 | 9 | 9 | I | 28,02 | 0,84 | 1,0 | 11 | 76 | 90 | 8,7 | 10,5 | TW | 1,21 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 23 | 11 | 11 | I | 28,14 | | DKĘP | | 5 | 5 | 0,8 | 1,0 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 81 | 95 | 9,5 | 11,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 125 | 32 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124l | I | 1,32 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 19 | 7 | 7 | I | 27,40 | 1,00 | 1,0 | 11 | 30 | 40 | 8,3 | 10,9 | TW | 1,32 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 19 | 9 | 9 | I | 28,42 | | DKĘP | | 5 | 5 | 1,8 | 2,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 35 | 45 | 10,1 | 13,3 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PRZES | SO | | 125 | 33 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | Razem: | | | 20 | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: wrzos pospolity, rokiet, trzcinnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124m | I | 1,66 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 65 | 24 | 23 | I | 28,86 | 1,09 | 0,9 | 11 | 425 | 705 | 11,7 | 19,5 | TP | 1,66 |
| | | | TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG | | ŚW | MJS | 65 | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | | | BRZ | MJS | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | Razem: | | | | | | | | | | 425 | 705 | 11,7 | 19,5 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODR | BK | 10 | 22 | | 3 | IV | 19,45 | 0,20 | | 12 | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | PODSZ | BK | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// | | DB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | ŚW | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: P-Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124n | II | 1,12 | Rodzaj powierzchni: ZRĄB | PRZES | SO | | 95 | 24 | 23 | | | | | 3 | | 20 | | | AGROT | 1,12 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO | | Razem: | | | | | | | | | | | 20 | | | ODN-ZRB | 1,12 |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | | | | | | | PIEL | 1,12 |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l., | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124o | I | 0,86 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 66 | 20 | 20 | II | 25,58 | 0,92 | 0,9 | 11 | 305 | 260 | 9,5 | 8,2 | TP | 0,86 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | Razem: | | | | | | | | | | 305 | 260 | 9,5 | 8,2 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-kobierce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | | | | | | | | | | | | | PBR w m³ | | Wskazania gospodarcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | | Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto | | | | Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Pow. (ha) |
| | | | | | | | | | | | | | | | na 1 ha | zapas na całej pow. | na 1 ha | na całej pow. | | |
| 124p | I | 2,07 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 8 | 14 | | 5 | I | 27,68 | 1,00 | 0,9 | 11 | | | | | CP | 2,07 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 2 | 14 | | 7 | I | 30,60 | | DKĘP | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | JW | MJS | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PRZES | DB.B | | 100 | 35 | 20 | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | Razem: | | | 1 | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: zadarniona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka brusznica, wrzos pospolity, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124r | I | 0,87 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 10 | 90 | 22 | 21 | II | 22,36 | 0,96 | 0,9 | 4 | 317 | 275 | 8,1 | 7,0 | BRAK WSK | |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | | | | | | | | | --- | | | | | | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | | | | | | | | | Razem: | | 317 | 275 | 8,1 | 7,0 | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | PODSZ | DB | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| | | | Teren: nizinny równy, płaski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124s | I | 1,43 | Rodzaj powierzchni: D-STAN | DRZEW | SO | 9 | 38 | 16 | 15 | I | 28,37 | 1,14 | 0,9 | 11 | 229 | 325 | 11,5 | 16,5 | TP | 1,43 |
| | | | TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG | | BRZ | 1 | 38 | 16 | 16 | II | 26,33 | | GRP | | 22 | 30 | 1,0 | 1,4 | | |
| | | | Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze | | MD | MJS | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody | | | | | | | | | | Razem: | | 251 | 355 | 12,5 | 17,8 | | |
| | | | Teren: nizinny falisty, płaski | PODSZ | BRZ | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| | | | Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// | | JAŁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pokrywa: mszysta-czernicowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa pionowa: drzewostan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stabilność: STABILNY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gosp.: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: brodaczka zwyczajna 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124~a | III | 0,62 | Rodzaj powierzchni: DROGI L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124~b | III | 0,31 | Rodzaj powierzchni: LINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne: Warstwa | Gatunek | Udział | Wiek | Pierśnica (cm) | Wysokość (m) | Klasa bonitacji | Wskaźnik bonitacji | Zadrzewienie | Zwarcie Zmieszanie | Jakość | Grubizna m³ brutto: na 1 ha | Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow. | PBR w m³: na 1 ha | PBR w m³: na całej pow. | Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) | Wskazania gospodarcze: Pow. (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podsumowanie dla oddziału: 124** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | **35,17** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | **Grubizna ogółem:** | **8 061** | | | | | |
| | **I** | **33,12** | | | | | | | | | | | **w tym:** | | | | | | |
| | **II** | **1,12** | | | | | | | | | | | **I - drzewostany:** | **7 960** | | | | | |
| | **III** | **0,93** | | | | | | | | | | | **I - przestoje:** | **81** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **II - przestoje:** | **20** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **razem:** | **8 061** | | | | | |

**Rodzaj powierzchni**

| | |
|---|---|
| ARBOR | arboretum |
| ARBOR-BZ | arboretum |
| BAGNO | bagno |
| BIND | binduga |
| BIWAK | miejsce biwakowania |
| B-Ł | budynki na łące |
| B-PS | budynki na pastwisku |
| B-R | budynki na roli |
| BUD INNE | inne tereny zabudowane |
| CAMP | camping |
| CMENT | cmentarz |
| CMENT NCZ | cmentarz nieczynny |
| DROGI I | inne drogi (bez dróg leśnych) |
| DROGI L | drogi leśne |
| DROGI P | drogi publiczne |
| D-STAN | drzewostan |
| E-LS | użytki ekologiczne na lasach |
| E-LZ | użytek ekol. zadrzewieniu |
| E-Ł | użytek ekol. łące |
| E-N | użytek ekol. na nieużytkach |
| E-PS | użytek ekol. pastwisku |
| E-R | użytek ekol. roli |
| E-WP | użytek ekol. na wodach płynących |
| E-WS | użytek ekol. na wodach stojących |
| GR DO REK | grunty przeznaczone do rekultywacji |
| GR POZA LP | grunty nie stanowiące zasobów LP |
| GRODZISKO | grodzisko |
| HAL | halizna |
| HAŁDA N | hałda nieczynna |
| H-PS | pastwisko - hala |
| INNE BUD | tereny zabudowane inne |
| INNE WYL | inne wylesienie |
| JEZIORO | jezioro |
| JEZIORO P | jezioro przepływowe |
| KANAŁ | kanał |
| KOLEJ L | kolejka leśna |
| KOLEJ-TK | kolejka leśna |
| KOP GLIN | kopalnia gliny |
| KOP IN | kopalnia inna |
| KOP KAM | kopalnia kamienia |
| KOP PIAS | kopalnia piasku |
| KOP TORF | kopalnia torfu |
| KOP ŻW | kopalnia żwiru |
| L ENERG | linia energetyczna |
| L TELEK | linia telekomunikacyjna |
| L-CTWO | leśnictwo |
| LCTWO-B | siedziba leśnictwa |
| LINIA EN | linia energetyczna |
| LINIA TEL | linia telekomunikacyjna |
| LINIE | linie podziału powierzchniowego |
| LOTNISKO | lotnisko |
| LZ-Ł | zadrzewienie na łące |
| LZ-PS | zadrzewienie na pastwisku |
| LZ-R | zadrzewienie na roli |
| Ł | łąka |
| N KOP | nieużytek pokopalniany |
| NARTOST | nartostrada |
| N-CTWO | nadleśnictwo |
| NCTWO-BI | nadleśnictwo |
| OWP | ośrodek wypoczynkowy |
| PARK | park miejski |
| PARKING | parking |
| PARKING L | parking |
| PAS GR | pas  graniczny |
| PAS GRAN | pas graniczny |
| PAS PPOŻ | pas przeciwpożarowy |
| PIASKI | piaski |
| PL CH-Ł | plantacja choinek |
| PL CH-PS | plantacja choinek |
| PL CH-R | plantacja choinek |
| PL KRZ-Ł | plantacja krzewów przemysł. |
| PL KRZ-PS | plantacja krzewów przemysł. |
| PL KRZ-R | plantacja krzewów przemysł. |
| PL ŁOW-Ł | poletko łowieckie |
| PL ŁOW-PS | poletko łowieckie |
| PL ŁOW-R | poletko łowieckie |
| PLAC | plac pod budowę |
| PLANT CH | plantacja choinek |
| PLANT KRZ | plantacja krzewów przemysłow. |
| PLANT NAS | plantacje nasienne |
| PLANT SZ | plantacja drzew szybkorosnąc. |
| PLAŻA | plaża |
| PŁAZ | płazowina |
| POL ŁOW | poletko łowieckie |
| POTOK | potok |
| PRZYST | przystań wodna |
| PS | pastwisko trwałe |
| R | rola |
| REMIZA | remiza |
| RETENCJA | retencja |
| ROWY | rowy |
| ROWY W | rowy |
| ROWY-R | rowy w użytkach rolnych |
| RUINY | ruiny |
| RUROCIĄG | rurociąg |
| RZEKA | rzeka |
| S | sad |
| SKŁAD | skład drewna |
| SKŁAD DR | składnica drewna |
| SKŁAD KOL | składnica przykolejowa |
| SKŁAD-Ł | skład drewna |
| SKŁAD-PS | skład drewna |
| SKŁAD-R | skład drewna |
| SKOCZNIA | skocznia |
| S-Ł | sad na łące |
| S-PS | sad na pastwisku |
| S-R | sady na roli |
| STADION | stadion |
| STAW RYB | staw rybny |
| STRZEL | strzelnica |
| SUKCESJA | sukcesja |
| SZ ZAD-Ł | szkółka zadrzewieniowa |
| SZ ZAD-PS | szkółka zadrzewieniowa |
| SZ ZAD-R | szkółka zadrzewieniowa |
| SZCZ CHR | objęte szczególną ochroną |
| SZK LEŚNA | szkółka leśna |
| ŚLUZA | śluza |
| T PRZEM | tereny przemysłowe |
| TER ZDEW | tereny zdewastowane |
| TOR SAN | tor saneczkowy |
| TORFOW | torfowisko |
| TURYST | miejsce turystyczne |
| U FIZJOGR | utwory fizjograficzne |
| U SKALNY | utwory skalne |
| UGORY-R | ugory, odłogi |
| URZ KOL | urządzenia kolejowe |
| URZ WOD | inne urządzenia melioracji wod |
| WAŁ OCHR | wał ochronny |
| WAŁ-DROGA | wał z drogą |
| WIKL | wiklina dziko rosnąca |
| WODY MOR | wody morskie wewnętrzne |
| WRZOS | wrzosowisko |
| WYDMA | wydma |
| WYŁ INNE | grunty wyłączone z produkcji |
| ZAB INNE | inne tereny zabudowane |
| ZADRZEW | zadrzewienie, parki wiejskie |
| ZBIORNIK | zbiornik wody |
| ZBIORNIK P | zbiornik przepływowy |
| ZIELEŃ | zieleniec |
| ZRĄB | zrąb |
| ZWIERZ | zwierzyniec |
| ZWIERZ-BZ | zwierzyniec |

### Przyczyny zagrożeń

| | |
|---|---|
| ANTROP | inne antropogeniczne |
| EROZJA | erozja |
| GRZYBY | grzyby |
| IMISJE | imisje przemysłowe |
| INNE | inne bez określenia |
| KLIMAT | czynniki klimatyczne |
| OWADY | owady |
| POŻAR | pożary |
| WODNE | zakłócenia stosunków wodnych |
| ZWIERZ | zwierzyna |

### Typy siedliskowe lasu

| | |
|---|---|
| BB | Bór bagienny |
| BGB | Bór górski bagienny |
| BGŚW | Bór górski świeży |
| BGW | Bór górski wilgotny |
| BMB | Bór mieszany bagienny |
| BMGB | Bór mieszany górski bagienny |
| BMGŚW | Bór mieszany górski świeży |
| BMGW | Bór mieszany górski wilgotny |
| BMŚW | Bór mieszany świeży |
| BMW | Bór mieszany wilgotny |
| BMWYŻŚW | Bór mieszany wyżynny świeży |
| BMWYŻW | Bór mieszany wyżynny wilgotny |
| BS | Bór suchy |
| BŚW | Bór świeży |
| BW | Bór wilgotny |
| BWG | Bór wysokogórski |
| LGŚW | Las górski świeży |
| LGW | Las górski wilgotny |
| LŁ | Las łęgowy |
| LŁG | Las łęgowy górski |
| LŁWYŻ | Las łęgowy wyżynny |
| LMB | Las mieszany bagienny |
| LMGŚW | Las mieszany górski świeży |
| LMGW | Las mieszany górski wilgotny |
| LMŚW | Las mieszany świeży |
| LMW | Las mieszany wilgotny |
| LMWYŻŚW | Las mieszany wyżynny świeży |
| LMWYŻW | Las mieszany wyżynny wilgotny |
| LŚW | Las świeży |
| LW | Las wilgotny |
| LWYŻŚW | Las wyżynny świeży |
| LWYŻW | Las wyżynny wilgotny |
| OL | Ols |
| OLJ | Ols jesionowy |
| OLJG | Ols jesionowy górski |
| OLJWYŻ | Ols jesionowy wyżynny |

### Budowa pionowa

| | |
|---|---|
| DRZEW | drzewostan |
| 2 PIĘTR | drzewostan dwupiętrowy |
| W PIĘTR | drzewostan wielopiętrowy |
| KO | klasa odnowienia |
| KDO | klasa do odnowienia |
| SP | d-stan o strukt przerębowej |

### Położenie

| | |
|---|---|
| C | część centralna |
| E | część wschodnia |
| N | część północna |
| NE | część północno-wschodnia |
| NW | część północno-zachodnia |
| S | część południowa |
| SE | część południowo-wschodnia |
| SW | południowo-zachodnia |
| W | zachodnia |

### Warstwa

| | |
|---|---|
| DRZEW | warstwa drzew |
| IIP | piętro drugie |
| IP | piętro pierwsze |
| NAL | nalot |
| PLANT | plantacja choinkowa |
| PODR | podrost |
| PODRII | podrost o charakterze II piętr |
| PODS | podsadzenia pod osłoną |
| PODSZ | podszyt |
| PRZES | przestoje, nasienniki i przedr |
| SAMOS | samosiew |
| ZADRZEW | zadrzewienie |
| ZAKRZEW | zakrzewienie |

### Skróty nazw drzew i krzewów

| | |
|---|---|
| AK | robinia akacjowa |
| BER | berberys pospolity |
| BEZ.C | bez czarny |
| BEZ.K | bez koralowy |
| BK | buk pospolity |
| BRZ | brzoza brodawkowata |
| BRZ.O | brzoza omszona |
| BST | wiąz górski |
| CIS | cis pospolity |
| CYP.G | cyprysik groszkowy |
| CYP.L | cyprysik Lawsona |
| CZM | czeremcha pospolita |
| CZM.P | czeremcha późna |
| CZR | czereśnia pospolita |
| CZR.P | czereśnia ptasia |
| DB | dąb nieokreślony |
| DB.B | dąb bezszypułkowy |
| DB.C | dąb czerwony |
| DB.S | dąb szypułkowy |
| DER.B | dereń biały |
| DER.Ś | dereń świdwa |
| DG | daglezja zielona |
| DG.S | daglezja szara |
| GB | grab pospolity |
| GŁG | głóg jednoszyjkowy |
| GR | grusza pospolita |
| IWA | wierzba iwa |
| JAŁ | jałowiec pospolity |
| JB | jabłoń dzika |
| JD | jodła pospolita |
| JKL | klon jesionolistny |
| JRZ | jarząb pospolity |
| JRZ.B | jarząb brekinia |
| JS | jesion wyniosły |
| JS.A | jesion amerykański |
| JW | klon jawor |
| KAL.K | kalina koralowa |
| KL | klon pospolity |
| KL.P | klon polny |
| KRU | kruszyna pospolita |
| KSZ | kasztanowiec biały |
| KT | kasztan jadalny |
| LIG | ligustr pospolity |
| LP | lipa drobnolistna |
| LP.S | lipa szerokolistna |
| LSZ | leszczyna pospolita |
| MD | modrzew europejski |
| MW | morwa biała |
| OL | olsza czarna |
| OL.S | olsza szara |
| OL.Z | olsza zielona |
| ORZ.C | orzech czarny |
| OS | topola osika |
| OSZ.G | orzesznik gorzki |
| OSZ.P | orzesznik pięciolistkowy |
| PLA.K | platan klonolistny |
| PRZ.C | porzeczka czarna |

## Skróty nazw drzew i krzewów

| | |
|---|---|
| PRZ.CW | porzeczka czerwona |
| SCH | suchodrzew pospolity |
| SO | sosna zwyczajna |
| SO.B | sosna Banksa |
| SO.BL | sosna błotna |
| SO.C | sosna czarna |
| SO.K | kosodrzewina |
| SO.L | sosna limba |
| SO.S | sosna smołowa |
| SO.WE | sosna wejmutka |
| SZK | szakłak pospolity |
| ŚL | śliwa domowa |
| ŚL.A | śliwa ałycza |
| ŚL.T | śliwa tarnina |
| ŚNG.B | śnieguliczka biała |
| ŚW | świerk pospolity |
| TP | topola biała |
| TP.C | topola czarna |
| TRZ | trzmielina pospolita |
| TRZ.B | trzmielina brodawkowata |
| TS.K | choina kanadyjska |
| WB | wierzba biała |
| WIK | wiklina (wba purpurowa) |
| WIŚ | wiśnia pospolita |
| WZ | wiąz pospolity |
| ŻYW.O | żywotnik olbrzymi |
| ŻYW.W | żywotnik wschodni |
| ŻYW.Z | żywotnik zachodni |

## Udział

| | |
|---|---|
| 1 | udział 10 % |
| 2 | udział 20 % |
| 3 | udział 30 % |
| 4 | udział 40 % |
| 5 | udział 50 % |
| 6 | udział 60 % |
| 7 | udział 70 % |
| 8 | udział 80 % |
| 9 | udział 90 % |
| 10 | udział 100 % |
| PJD | poniżej 5 % - pojedynczo |
| MJS | poniżej 5 % - miejscami |

## Zgodność

| | |
|---|---|
| CZ ZG | częściowo zgodne z siedliskiem |
| NIEZG | niezgodne z siedliskiem |
| ZG | zgodne z siedliskiem |

## Zmieszanie warstwy

| | |
|---|---|
| DKĘP | drobnokępowe |
| GRP | grupowe |
| JDN | jednostkowe |
| KĘP | kępowe |
| PAS | pasowe |
| RZĘD | rzędowe |
| SMUG | smugowe |
| WKĘP | wielkokępowe |

## Zwarcie

| | |
|---|---|
| LUŹ | luźne |
| PEŁ | pełne |
| PRZ | przerywane |
| UM | umiarkowane |

## Zagęszczenie

| | |
|---|---|
| B DUŻE | zagęszczenie bardzo duże |
| DUŻE | zagęszczenie duże |
| NADM | zagęszczenie nadmierne |
| PRZ LUŹ | przerywane luźne |
| PRZ UM | przerywane umiarkowane |
| UM DUŻE | umiarkowane duże |
| UM PRZ | umiarkowane przerywane |

## Gospodarstwo

| | |
|---|---|
| GP | przerębowe -lasy gospodarcze |
| GPZ | zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze |
| GZ | zrębowe -lasy gospodarcze |
| O | lasy ochronne |
| S | specjalne |

## Wskazania gospodarcze

| | |
|---|---|
| AGROT | specjalne zabiegi agrotechniczne |
| BRAK WSK | Brak wskazówki |
| CP | czyszczenia późne |
| CP-P | pozyskanie w CP |
| CW | czyszczenia wczesne |
| DRZEW | uprząt.drzew na pow.nieleśnej |
| IA | rębnia zupełna wielkopowierzchniowa |
| IB | rębnia zupełna pasowa |
| IC | rębnia zupełna smugowa |
| IIA | rębnia częściowa wielkopowierzchniowa |
| IIAU | rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające |
| IIB | rębnia częściowa pasowa |
| IIBU | rębnia częściowa pasowa -uprzątające |
| IIC | rębnia częściowa smugowa |
| IICU | rębnia częściowa smugowa -uprzątające |
| IID | rębnia częściowa gniazdowa |
| IIDU | rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające |
| IIIA | rębnia gniazdowa zupełna |
| IIIAU | rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające |
| IIIB | rębnia gniazdowa częściowa |
| IIIBU | rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające |
| IVA | rębnia stopniowa gniazdowa |
| IVAU | rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające |
| IVB | rębnia stopniowa brzegowo-smugowa |
| IVBU | rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające |
| IVC | rębnia stopniowa brzegowo-smugowa |
| IVCU | rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające |
| IVD | rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona |
| IVDU | rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające |
| MA-FIT | fitomelioracje |
| MA-MIN | nawożenie mineralne |
| MA-REG | lokalna reg.stosunków wodnych |
| ODN-HAL | odnowienie halizn |
| ODN-IIP | wprowadzenie II piętra |
| ODN-LUK | odnowienia luk |
| ODN-PLAN | odnow.plant.szybkorosnących |
| ODN-POR | zalesienia pow.porolnych |
| ODN-ZŁOŻ | odnow.w rębniach złożonych |
| ODN-ZRB | odnowienie zrębów |
| PIEL | pielęgnowanie gleby |
| PŁAZ | uprzątanie płazowin |
| PODSZ | wprowadzanie podszytów |
| POPR | poprawki i uzupełnienia |
| PRZEST | uprząt.nasienników,przestojów |
| TP | trzebież późna |
| TW | trzebież wczesna |
| V | rębnia przerębowa |
| ZAL-NIEU | zalesienia nieużytków |
| Z-PIELD | pielęgn.drzew w zadrzewieniach |
| Z-PIELK | pielęgn.krzewów w zadrzew. |
| Z-SADZD | sadzenie drzew do zadrzewień |
| Z-SADZK | sadzenie krzewów do zadrzewień |

## Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

| | |
|---|---|
| RP | rezerwat przyrody |
| ORP | otulina rezerwatu przyrody |
| WDN | wyłączony drzewostan nasienny |
| GDN | gospodarczy drzewostan nasienny |
| DZ | drzewostan zachowawczy |
| UP | uprawa pochodna |
| ZN | źródło nasion |
| REF | d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego |

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
*Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi*