

Pobieranie moczu

- mocz do badania powinien być oddany bezpośrednio po spoczynku nocnym, trwającym nie mniej niż 4 godziny
- umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
- dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej, spłukać wodą: u mężczyzn po odciągnięciu napletka
- po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym
- oddać pierwszą porcję moczu do toalety
- drugą porcję, około 10 ml moczu (środkowy strumień moczu), oddać bezpośrednio do przygotowanego jałowego pojemnika, nie dotykając jego brzegu i powierzchni wewnętrznej
- pozostałą część moczu oddać do toalety
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą, godziną pobrania i dostarczyć do laboratorium
- próbkę do 4 godzin od momentu pobrania przechowywać i transportować w temperaturze od +2°C do +8°C

Pobieranie moczu u niemowląt i małych dzieci

- u niemowląt i małych dzieci stosuje się jałowe woreczki do pobierania moczu (specjalne dla dziewczynek i chłopców)
- po umyciu i osuszeniu cewki moczowej przykleić woreczek
- mocz pobrać wcześniej rano, po spoczynku nocnym
- woreczek odkleić, zamknąć i w całości umieścić w jednorazowym, plastikowym pojemniku
- nie przelewać moczu z woreczka do pojemnika
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą, godziną pobrania i dostarczyć do laboratorium
- próbkę do 4 godzin od momentu pobrania przechowywać i transportować w temperaturze od +2°C do +8°C

Pobieranie moczu u chorych cewnikowanych

- po odpowiednim ułożeniu chorego starannie umyć okolice krocza i narządy moczowo-płciowe
- wprowadzić nowy cewnik
- pacjent musi oddać mocz do worka
- odłączyć cewnik od worka, odkazić jego koniec
- odrzucić pierwszą porcję moczu
- pobrać próbkę - około 5-10 ml moczu do jałowego pojemnika
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą, godziną pobrania i dostarczyć do laboratorium
- próbkę do 4 godzin od momentu pobrania przechowywać i transportować w temperaturze od +2°C do +8°C

Pobieranie moczu na gotowe podłoża transportowo-wzrostwe (Uromedium, Uriline, Uricult).

- mocz powinien być oddany bezpośrednio po spoczynku nocnym, trwającym nie mniej niż 4 godziny
- umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem

- dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej, spłukać wodą: u mężczyzn po odciągnięciu napletka
- po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym
- oddać pierwszą porcję moczu do toalety
- drugą porcję, około 10 ml moczu (środkowy strumień moczu), oddać bezpośrednio do jałowego pojemnika (nie dotykając jego brzegu oraz powierzchni wewnętrznej) i zanurzyć płytkę z podłożem w oddanym moczu lub zwilżyć powierzchnię płytki bezpośrednio podczas oddawania moczu
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą, godziną pobrania i dostarczyć do laboratorium
- transportować i przechowywać w temperaturze pokojowej