

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY.
DZIAŁ LABORATORYJNY.
ODDZIAŁ BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH.

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LM wydanie 2 załącznika z dnia 2021-03-01

3.3. Pobieranie i transport próbek płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku izolacji enterowirusów (materiał pobiera lekarz)

Przy wykonywaniu nakłucia lędźwiowego w celu uzyskania płynu mózgowo-rdzeniowego należy przestrzegać następujących zasad:

- umyć i zdezynfekować ręce przed zabiegiem, stosować jałowe rękawiczki bardzo dokładnie zdezynfekować okolicę nakłucia. W warunkach aseptycznych pobierać płyn mózgowo-rdzeniowy do jałowych probówek,
- po pobieraniu zamknąć szczelnie probówki.

W kierunku badań wirusologicznych płyn mózgowo-rdzeniowy po pobieraniu należy jak najszybciej dostarczyć do PPPiWW w termotorbie z lodem (do momentu dostarczenia przechować w temp. $2-8^{\circ}\text{C}\pm 1$).