



Projekt kampanii społecznej Zanim ruszysz w świat – zadbaj o zdrowie.

Bezpieczne wakacje z Sanepidem

Bezpieczni razem - jak chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (STI)


Prof. Justyna Kowalska

Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Warszawski
Uniwersytet Medyczny

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Epidemia chorób przenoszonych drogą płciową – chlamydia


Figure 4b. Rate of confirmed chlamydia cases per 100 000 population, by gender for cases with available data, in EU/EEA countries reporting consistently, 2014–2023



Source: Country reports from countries with comprehensive surveillance that reported consistently and with at least 85% completeness of gender variable: Bulgaria, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.

Epidemia chorób przenoszonych drogą płciową – rzeżączka


Figure 4b. Rates of confirmed gonorrhoea cases per 100 000 population by gender and year in EU/EEA countries reporting consistently, 2014–2023



Source: Country reports from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Sweden.

Epidemia chorób przenoszonych drogą płciową – kiła

Figure 4b. Rate of confirmed syphilis cases per 100 000 population, by gender for cases with available data, in EU/EEA countries reporting consistently, 2014–2023




Source: Country reports from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden. Data from Spain are not included because data on gender were not reported consistently by Spain over the past 10 years.

Statystyki - Polska

- W Polsce w ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost STI.
- Według raportu NIZ PZH-PIB „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” liczba nowych przypadków tych chorób wzrosła **od 2020 roku o ponad 300%**.
- Tylko między 2021 a 2022 r. liczba zgłoszonych przypadków **rzeżączki wzrosła o 48%, kiły o 34%, a chlamydii o 18%**.
- W kwietniu 2024 roku Krajowe Centrum ds. AIDS, we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zainicjowało nową strategię przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą płciową.
- Strategia zakłada poprawę działań edukacyjnych, zwiększenie nakładów na profilaktykę oraz zapewnienie lepszej dostępności świadczeń medycznych

Jak zapobiegać STI?





Objawy STI



Nietypowa wydzielina z dróg rodnych/cewki moczowej.



Ból przy oddawaniu moczu.



Ból przy kontakcie seksualnym.



Owrzodzenia, pęcherze lub brodawki w okolicach intymnych.



Swędzenie, pieczenie lub dyskomfort w miejscach intymnych.



Wysypka lub inne niepokojące zmiany skórne.

STI bardzo często mają przebieg bezobjawowy

Objawy są podobne dla wszystkich STI

Większość STI można skutecznie i szybko wyleczyć

W wielu przypadkach jedynym dowodem zakażenia jest zbadanie się

Chłamydię i rzeżączkę wykrywa jeden test (z moczu lub z wymazu)



U kobiet konieczna jest wizyta u ginekologa

Kiłę, HIV, wzw A, B i C można rozpoznać na podstawie badania krwi


Testowanie i leczenie STI – poradnia dermatologiczna bez skierowania, ginekolog ze skierowaniem od POZ




Liczba zachorowań na WZW typu A w latach 2010-2019



Jak wiele zachorowań na WZW typu B występuje w Polsce?




**Zabezpieczona
szczepieniami
według kalendarza
szczepień jest
populacja < 28 r.ż.**



SZCZEPIENIA pomagają w **ochronie** przed **nowotworami**

HPV

chroni przed rakiem
szyjki macicy
oraz innymi **nowotworami**
narządów płciowych
i odbytu




WZW B

chroni przed
rakiem wątrobowokomórkowym

Tabela 3. Grupy docelowe, w których testowanie w kierunku HCV zaleca Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Rekomendacja z 13.11.2017 r. (testowanie w ramach POZ) [18]	Rekomendacja z 30.11.2020 r. (testowanie w ramach programów polityki zdrowotnej) [19]
• osoby, które otrzymały przetoczenia krwi przed 1992 r. • osoby, które używają lub używały w przeszłości dożylnych środków odurzających • osoby, które były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu • osoby, które przebywały w placówkach karnych • osoby, które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV • osoby, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym podwyższoną aktywność aminotransferaz • osoby, u których występuje podejrzenie jakiegokolwiek choroby wątroby	• osoby przyjmujące dożylnie narkotyki aktualnie lub w przeszłości • osoby, które przebywały w placówkach karnych • osoby posiadające tatuaż lub <i>piercing</i> • osoby, które zostały poddane zabiegom transfuzji krwi lub przeszczepienia organów przed 1990 r. • partnerzy seksualni osób z przebyłym lub obecnym zakażeniem HCV • osoby z potwierdzoną infekcją HIV lub HAV, HBV • osoby zgłaszające się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia wirusem HIV • osoby z objawami chorób wątroby • osoby, które doznały zakłucia igłą, która mogła być użyta przez inną osobę • migranci z krajów o wysokiej częstości występowania zakażeń • dzieci matek zakażonych HCV • osoby wielokrotnie hospitalizowane • osoby z przypadkowo wykrytą podwyższoną aktywnością ALT (powyżej 35 IU/l)



Dziękuję