

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 4/2022m z dnia 10.02.2022 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 50/2017wu z dnia 27.12.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG), Włochy, tel: +035-335313,
fax 035-335334. e-mail: sfranceschini@cbceurope.it

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

I.R.C.A. Service S.p.A. – S.S. Cremasca 591 n. 10 – 20040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31–215 Kraków, e–mail: biocont@biocont.pl,
tel.: +48 12 416 25 81

NATURALIS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)*

* zawiera nie mniej niż $2,3 \times 10^7$ żywotnych spor/ml

**Zezwolenie MRiRW nr R – 50/2017 wu z dnia 27.12.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 4/2022m z dnia 10.02.2022 r.**

EUH208	Zawiera <i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261	Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu na bazie oleju (OD) do sporządzania zawiesiny. Działa głównie kontaktowo. Konidia *Beauveria bassiana* szczepu ATCC 74040 przylegają do naskórki owadów i roztoczy, kielkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Śmierć następuje w wyniku mechanicznej penetracji grzybni jako następstwo utraty wody i składników odżywczych w połączeniu z wydzielaniem enzymów hydrolitycznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

W przypadku zastosowania w uprawie polowej należy zwrócić szczególną uwagę na warunki stosowania środka:

- nie stosować preparatu w temperaturze poniżej 15°C,
- stosować w warunkach wysokiej wilgotności,
- zastosowanie dogłębne, w celu zwalczania drutowców powinno odbyć się z użyciem odpowiednio dużej ilości cieczy użytkowej w zależności od rodzaju i warunków uprawy.

Pomidor, papryka, bakłażan - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Salata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa - uprawa pod osłonami

Mszyca salatowo-porzeczkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Fasola, fasola szparagowa - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Truskawka - uprawa pod osłonami

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

Kwiaty i rośliny ozdobne - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, mączlik warzywny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 5.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor, papryka, bakłażan - uprawa pod osłonami

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 5.

Pomidor, papryka, bakłażan – uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon – uprawa pod osłonami

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 5.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon – uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Salata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa – uprawa pod osłonami

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 5.

Roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek – uprawa pod osłonami

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Salata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonek warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek – uprawa w polu

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Fasola wielokwiatowa, fasola szparagowa – uprawa pod osłonami

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości: strąki dojrzałe (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości: strąki dojrzałe (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 5.

Bób, ciecierzycyca pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony luskowy, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny (peluszką), soczewica jadalna – uprawa w polu

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości: wszystkie strąki suche o typowym zabarwieniu, nasiona suche, twarde (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości: wszystkie strąki suche o typowym zabarwieniu, nasiona suche, twarde (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Burak ćwikłowy, burak pastewny, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, topinambur - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Jarmuż, gorczyca, kalarepa – uprawa w polu i pod osłonami

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: BBCH 11-89

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Soja, bobik, lubin, seradela zwyczajna, lucerna, esparceta, facelia błękitna, len zwyczajny, konopie siewne, mak lekarski, słonecznik, rzepak jary, rzepik ozimy, Inianka siewna, gorczyca, proso zwyczajne, gryka, pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica twarda, pszenica samopsza, sorgo zwisłe, wyka, żyto jare

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Tytoń, chmiel

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Truskawka - uprawa pod osłonami

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
Termin stosowania: BBCH 11-89 środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka wcześniejszej części etykiety: 5.

Truskawka - uprawa w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Grusza, grusza azjatycka, pigwa

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Śliwa, czereśnia, wiśnia, morela, brzoskwinia, nektaryna

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Nasionnice – ograniczanie liczebności postaci dorosłych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Winorośl

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Borówka wysoka, borówka brusznica (borówka czerwona), malina, jeżyna, żurawina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, róża jadalna, morwa, bez czarna, aronia, jarzębina, rokitnik, głóg, jagoda kamczacka – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod osłonami

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Liczba zabiegów: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka wcześniejszej części etykiety: 5.

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa w polu

Mączliki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Drutowce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego całkowicie rozwiniętego liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Metoda aplikacji: nawadnianie podłoża, na którym uprawiane są rośliny uprawne polegające na wykonaniu opryskiwania średniokroplistego/opryskiwania grubokroplistego lub stosowania systemu nawadniającego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka do zwalczania wszystkich wymienionych szkodników: 5.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
środka nie stosować w dniu zbioru.

1. Zaleca się by środek stosować wieczorem lub wcześniej rano, poza okresem lotu owadów zapylających.
2. Należy stosować już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki (na początku ich pojawiania się) oraz przed widocznymi objawami żerowania.
3. Środek wykazuje najwyższą efektywność jeśli bezpośrednio po zabiegu przez kilka godzin utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza i temperatura w okolicach 23°C.
4. W zależności od stopnia porażenia i warunków klimatycznych może być konieczne wykonanie 3 – 5 aplikacji w odstępach 5 – 7 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Opakowanie z produktem wstrząsnąć przed użyciem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy cieczą użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

W przypadku, gdy zabieg wykonywany jest opryskiwaczem polowym:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 20 - 25°C, zalecana temperatura przechowywania wynosi 2 - 6°C,
- w suchym pomieszczeniu, gdzie środek nie będzie ulegać zamarznięciu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 1 rok

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –