



Znak sprawy: DHRrs2.(HOR.rs.)8207.125.2019.Prestop WP.2025(rs.09)

DECYZJA nr R- 339/2025d

Na podstawie art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 czerwca 2019 r. złożonego przez spółkę Danstar Ferment AG, Poststrasse 30, CH-6300 Zug, Konfederacja Szwajcarska,

USTALAM

następujące warunki wprowadzania do obrotu środka ochrony roślin **Prestop WP** dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-28/2015wu z dnia 6 listopada 2015 r.

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	Danstar Ferment AG Poststrasse 30, CH-6300 Zug Konfederacja Szwajcarska
Producent środka ochrony roślin:	Danstar Ferment AG Poststrasse 30, CH-6300 Zug

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

	Konfederacja Szwajcarska
Rodzaj środka ochrony roślin:	fungicyd
Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	- użytkownik profesjonalny - użytkownik nieprofesjonalny
Substancja czynna:	grzyb <i>Clonostachys rosea</i> (<i>Gliocladium catenulatum</i>) szczep J1446 (zarodniki i grzybnia) 1 x 10 ⁸ - 1 x 10 ⁹ jtk/g, 230 g/kg
Okres ważności środka ochrony roślin:	2 tygodnie w temperaturze pokojowej (poniżej 23 °C) lub 12 miesięcy w temperaturze +4°C.

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

- użytkownik profesjonalny:

Pojemność opakowania:	Materiał:
50 g - 1 kg	PET/ALU/PE
1 kg - 10 kg	PET/PET/PE

- użytkownik nieprofesjonalny:

Pojemność opakowania:	Materiał:
50 g - 1 kg	PET/ALU/PE
1 kg	PET/PET/PE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 31 marca 2035 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykiety przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego oraz dla użytkownika nieprofesjonalnego zawierają informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴ (dalej jako: rozporządzenie CLP).

Etykiety środka ochrony roślin, przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego oraz dla użytkownika nieprofesjonalnego, zawierają numer i datę wydania zezwolenia oraz numer i datę niniejszej decyzji zmieniającej zezwolenie.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z aktualnymi warunkami zezwolenia.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.

OBOWIAZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania zezwolenia na wprowadzanie niniejszego środka do obrotu.

ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJI

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin (użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny).

Załącznik nr 2a - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin (użytkownik profesjonalny)

Załącznik nr 2b - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin (użytkownik nieprofesjonalny)

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania (użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny).

Załącznik nr 4a - Okresy karencji (użytkownik profesjonalny).

Załącznik nr 4b - Okresy karencji-(użytkownik nieprofesjonalny).

Załącznik nr 5a – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych (użytkownik profesjonalny).

Załącznik nr 5b – Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych (użytkownik nieprofesjonalny).

Załącznik nr 6a - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego (użytkownik profesjonalny).

Załącznik nr 6b - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego (użytkownik nieprofesjonalny).

Załącznik nr 7 – Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc (użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny).

Załącznik nr 8 – Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin (użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny).

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
(użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny)

Klasyfikacja środka ochrony roślin:

Środek ochrony roślin nie został zaklasyfikowany do żadnej z klas i kategorii zagrożenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: brak

Hasło ostrzegawcze: brak

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

brak

Zawiera *Clonostachys rosea* szczep J1446. Mikroorganizmy mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Załącznik nr 2a – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN (użytkownik profesjonalny)

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD – środek biologiczny w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

Działanie środka ma na celu powstrzymanie rozwoju następujących chorób:

- czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (*Didymella bryoniae*) na ogórku,
- szarej pleśni (*Botrytis cinerea*) na truskawce, pomidorze i roślinach ozdobnych,
- chorób odglebowych wywołanych przez organizmy grzybopodobne rodzaju *Pythium* na ogórku; sałacie i ziołach; organizmy grzybopodobne rodzaju *Pythium* i *Phytophthora* na roślinach ozdobnych; grzyby rodzaju *Rhizoctonia* na kalafiorze i sałacie oraz grzyby rodzaju *Fusarium* i *Rhizoctonia* na roślinach zielarskich.

Substancją czynną środka jest grzyb *Clonostachys rosea* szczep J1446, która zgodnie z klasyfikacją FRAC należy do grupy BM02.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do podlewania oraz do opryskiwania roślin przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych, a także do stosowania poprzez system nawadniania kropelkowego.

Ogórek (w uprawie wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
czarna zgnilizna zawiązków i pędów roślin dyniowatych

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (100 g środka w 20 l wody; ilość środka na 1 m²: 0,1-1 g)

Termin stosowania:

środek stosować zapobiegawczo. Pierwszy zabieg wykonać niedługo po przesadzeniu lub najpóźniej podczas usuwania z roślin liści. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 3-4 tygodnie. Środek stosować od fazy rozwiniętych pięciu liści do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15-89).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość zawiesiny środka (cieczy użytkowej): 10 l na 500 roślin

Zalecana ilość wody: 200-2000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 4

Uwaga:

W trakcie zabiegu szczególną uwagę zwrócić, aby dokładnie zostały opryskane podstawy łodyg i uszkodzone miejsca na roślinach ogórka.

Pomidor (w uprawie wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
szara pleśń

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (100 g środka w 20 l wody; ilość środka na 1 m²: 0,1-1 g)

Termin stosowania:

środek stosować zapobiegawczo. Pierwszy zabieg wykonać niedługo po przesadzeniu lub najpóźniej podczas usuwania liści z roślin. Kolejne zabiegi wykonać w odstępie co 21 dni. Środek stosować od fazy pięciu liści do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15-89).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 3

Zalecana ilość zawiesiny środka (cieczy użytkowej): 10 l na 500 roślin

Zalecana ilość wody: 200-2000 l/ha

Uwaga:

W trakcie zabiegu szczególną uwagę zwrócić, aby dokładnie zostały opryskane uszkodzone miejsca na roślinach pomidora.

Rośliny ozdobne (zielne, niekwitnące) (w uprawie wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
szara pleśń

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (100 g środka w 20 l wody; ilość środka na 1 m²: 0,1-1 g)

Termin stosowania: zabieg wykonać na sadzonkach w trakcie ich sadzenia/przesadzania, a na siewkach, po ich wzejściu. Środek stosować od fazy rozwiniętych pięciu liści do fazy pełnej dojrzałości owoców i nasion (BBCH 15-89).

Liczba zabiegów: 1-8

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 8

Zalecana ilość wody: 200-2000 l/ha

Uwagi:

Rośliny opryskać zawiesiną środka (cieczą użytkową) w taki sposób, aby były one mokre.

Sadzonki mogą również zostać zanurzone w zawieszynie środka.

Rośliny warzywne (np. ogórek, pomidor, sałata, kalafior), rośliny ozdobne (np. aksamitka, poinsecja, fiołek afrykański, petunia, pelargonia), rośliny zielarskie

(w uprawie wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

ochrona przed chorobami odglebowymi

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (100 g środka w 20 l wody)

Termin stosowania: zabiegi wykonać podczas siewu, pikowania, przesadzania oraz/lub w późniejszych fazach uprawy. Zabiegi wykonywać w odstępie co 3-4 tygodnie. Pierwszy (i ewentualnie drugi) zabieg można również wykonać przed siewem czy sadzeniem poprzez wymieszanie zawiesiny środka z podłożem uprawnym.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 3

Uwagi

Środek w postaci zawiesiny wodnej o stężeniu 0,5% (100 g środka w 20 l wody)

można stosować poprzez opryskiwanie, zanurzanie, wymieszanie z podłożem uprawnym lub poprzez system nawadniania kropelkowego.

Zalecane dawki środka Prestop WP (w ochronie przed chorobami odglebowymi):

W przypadku mieszania środka z podłożem uprawnym, stosować 200 - 500 g środka na 1 m³ podłoża. Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie środka w podłożu najpierw należy go wymieszać z wodą celem uzyskania zawiesiny o stężeniu 0,5%. Stosować 20-50 tys. l wody na 1 ha uprawy (do 5 cm głębokości podłoża).

Do ochrony siewek (po wschodach, do fazy trzech liści właściwych, BBCH 09-13) użyć 5 – 10 g środka na 1 m² uprawy w formie zawiesiny o stężeniu 0,5% (zalecana ilość wody uzależniona jest od wilgotności podłoża i wynosi 10-20 tys. l wody na 1 ha).

Do ochrony sadzonek (po przesadzeniu itp., od do fazy pięciu liści właściwych, BBCH 15) użyć 200-250 g środka na 1 000 roślin w formie zawiesiny o stężeniu 0,5% (zalecana ilość wody uzależniona jest od wilgotności podłoża i wynosi 1600- 2000 l na 1 ha).

Do stosowania na podłoże w ochronie roślin ozdobnych (po przesadzeniu, od BBCH 13) użyć 200-250 g środka na 1 000 roślin/1 l objętości bryły korzeniowej w formie zawiesiny o stężeniu 0,5%, stosując 20-50 tys. l wody na 1 ha uprawy.

W przypadku pojedynczych brył korzeniowych oraz roślin uprawianych w doniczkach opryskać lub zanurzyć podłoże uprawne w zawieszynie wodnej środka o stężeniu 0,5%, dostosowując jej ilość w zależności od rozmiaru bryły korzeniowej lub doniczki, według poniższej tabeli:

Objętość doniczki lub bryły korzeniowej (średnica doniczki):	Ilość zawiesiny środka o stężeniu 0,5% na 1000 roślin (w litrach)	Ilość środka potrzebnej dla 1000 roślin (w gramach):
100 ml (6 cm)	4-10	20-50
250 ml (9 cm)	10-25	50-125
500 ml (11 cm)	20-50	100-250
1 litr (14 cm)	40-100	200-500

Truskawka (w uprawie w polu)

szara pleśń

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5%

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, wykonując trzy zabiegi w następujących terminach: na początku kwitnienia, w fazie pełni kwitnienia oraz pod koniec fazy kwitnienia lub na początku fazy rozwoju owoców (BBCH 61-71).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość zawiesiny środka (cieczy użytkowej): 1200 l/ha na 1 zabieg (6 kg środka w 1200 l na 1 ha)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Załącznik nr 2b – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN (użytkownik nieprofesjonalny)

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD – środek biologiczny w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP) do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki przed szarą pleśnią w uprawie polowej.

Substancją czynną środka jest grzyb *Clonostachys rosea* szczep J1446, która zgodnie z klasyfikacją FRAC należy do grupy BM02.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do opryskiwania roślin przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Truskawka (w uprawie polu)

szara pleśń

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5%

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, wykonując trzy zabiegi w następujących terminach: na początku kwitnienia, w fazie pełni kwitnienia oraz pod koniec fazy kwitnienia lub na początku fazy rozwoju owoców (BBCH 61-71).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość zawiesiny środka (cieczy użytkowej): 12 l/100 m² na 1 zabieg (60 g środka w 12 wody na 100 m²)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
(użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny)**

Nie stosować środka na nieukorzenionych sadzonkach.

Środek jest produktem biologicznym, zawierającym jako substancję czynną grzyb *Clonostachys rosea*. Z tego względu nie we wszystkich przypadkach, zwłaszcza w warunkach bardzo silnej presji infekcyjnej ze strony sprawców chorób, można oczekiwać wystarczającej skuteczności.

Załącznik nr 4a – OKRESY KARENCJI (użytkownik profesjonalny)

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

Załącznik nr 4b - OKRESY KARENCJI I ~~NASTĘPSTWO ROŚLIN~~ (użytkownik nieprofesjonalny)

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

truskawka – 1 dzień

**Załącznik nr 5a - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK,
PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH (użytkownik profesjonalny)**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) i czepek w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Przygotowując roztwór roboczy używać maski do ochrony dróg oddechowych z filtrem przeciwpyłowym P2, np. półmaski ochronne FFP2.

Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin lub na powierzchni gleby/podłoża.

**Załącznik nr 5b - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK,
PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH (użytkownik nieprofesjonalny)**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) i okulary ochronne.

Stosować ubranie robocze (długie spodnie, koszula z długim rękawem).

Zdjąć ubranie robocze i wyprać po użyciu.

Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu.

Unikać wdychania pyłu/ rozpylonej cieczy

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić w dniu zabiegu na obszar poddany zabiegowi.

Załącznik nr 6a – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO (użytkownik profesjonalny)

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Uprawy szklarniowe:

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

Uprawa truskawki w polu:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub,
- 20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Załącznik nr 6b – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO (użytkownik nieprofesjonalny)

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Załącznik nr 7 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC (użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- 2 tygodnie w temperaturze pokojowej (poniżej 23°C) lub
- 12 miesięcy w temperaturze +4°C.

Produkt przechowywać tylko w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu opakowania produkt natychmiast zużyć.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku mimowolnego kontaktu lub spożycia: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

**Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
(użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny)**

Dane kontaktowe (takie jak: e-mail, telefon, fax, adres www lub adres do korespondencji) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

Uzasadnienie

Środek ochrony roślin Prestop WP został dopuszczony do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 28/2015wu z dnia 06 listopada 2015 r. wydanym na rzecz spółki Danstar Ferment AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, Konfederacja Szwajcarska.

Wniosek o odnowienie zezwolenia dla środka Prestop WP został przedłożony przez spółkę Danstar Ferment AG w dniu 25 czerwca 2019 r.

W skład przedmiotowego środka ochrony roślin wchodzi substancja czynna - grzyb *Clonostachys rosea* (*Gliocladium catenulatum*) szczep J1446 (zarodniki i grzybnia); dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i spełniające warunki związane z ich użyciem określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁵ (dalej jako: rozporządzenie nr 540/2011).

W związku z wejściem w życie wykonawczego Komisji (UE) 2019/151⁶ państwa członkowskie zostały zobowiązane do dokonania odnowienia środków ochrony roślin zawierających substancję czynną *Clonostachys rosea* (*Gliocladium catenulatum*) szczep J1446. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie zostały zobligowane do określenia, czy środek ochrony roślin spełnia warunki ustanowione w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.

W związku z powyższym, podmioty posiadające zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin, zawierających w swym składzie substancję czynną grzyb *Clonostachys rosea* (*Gliocladium catenulatum*) szczep J1446 zobowiązane były do przedstawienia stosownych wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin.

Wymagana dokumentacja została przedłożona przez spółkę Danstar Ferment AG wraz z wnioskiem z dnia 25 czerwca 2019 r. o odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Prestop WP.

⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

⁶ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/151 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej *Clonostachys rosea* szczep J1446 jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 27/26 z dnia 31.1.2019)

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia nr 1107/2009 wniosek o ponowną ocenę zezwolenia został złożony w państwach członkowskich, w których przedmiotowy środek jest wprowadzany do obrotu. Zgodnie z art. 35 wyżej wskazanego rozporządzenia wniosek był rozpatrywany przez zaproponowane przez wnioskodawcę państwa członkowskie – Królestwo Danii i Węgry.

Właściwy urząd Królestwa Danii dokonał oceny przedłożonej dokumentacji środka ochrony roślin dot. stosowania środka w szklarni i pod osłonami i sporządził raport rejestracyjny, który następnie został udostępniony wszystkim państwom członkowskim, zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia nr 1107/2009. Urząd do spraw rejestracji środków ochrony roślin w Królestwie Danii w dniu 19 maja 2022 r. wydał decyzję odnawiającą zezwolenie na wprowadzanie przedmiotowego środka ochrony roślin do obrotu oraz udostępnił wszystkim państwom członkowskim ostateczną wersję raportu rejestracyjnego z lipca 2021 r.

Ponadto na podstawie informacji uzyskanej z właściwego urzędu Królestwa Danii w dniu 18 marca 2025 r. potwierdzono, że w skład środka nie wchodzi składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Właściwy urząd Węgier dokonał oceny przedłożonej dokumentacji środka ochrony roślin dot. stosowania środka w polu i sporządził raport rejestracyjny, który następnie został udostępniony wszystkim państwom członkowskim należącym do Strefy B – Centrum, zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia nr 1107/2009. Urząd do spraw rejestracji środków ochrony roślin na Węgrzech w dniu 28 września 2023 r. wydał decyzję na wprowadzanie przedmiotowego środka ochrony roślin do obrotu i udostępnił wszystkim państwom członkowskim ostateczną wersję raportu rejestracyjnego z lipca 2023 r.

Po uwzględnieniu ocen i raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy urząd Królestwa Danii oraz ocen i raportu rejestracyjnego sporządzonego przez właściwy urząd Węgier, a także komentarzy do wykonanej oceny sporządzonych przez podmiot upoważniony – Eko-Futura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi potwierdzono wypełnienie kryteriów, determinujących odnowienie zezwolenia na wprowadzanie środka do obrotu, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Biorąc pod uwagę powyższe, zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Prestop WP zostało zmienione w zakresie wypełnienia wymagań określonych w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w rozporządzeniu nr 540/2011, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 31 marca 2035 r.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki Danstar Ferment AG w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)⁷, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 23 kwietnia 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagi, które zostały zaakceptowane.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin.. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁸.

⁷ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.);

⁸ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.)

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁹ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony
Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje -

(za zwrotnym dowodem doręczenia - EZD)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:

⁹ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)