

BORELIOZA

Choroba z Lyme



Wywoływana przez krętka bakterii
Borrelia burgdorferi



Do zakażenia dochodzi podczas ukąszenia kleszcza,
który jest nosicielem krętka bakterii *Borrelia burgdorferi*



PROFILAKTYKA

- ✓ **ŚRODKI ODSTRASZAJĄCE KLESZCZE**
(tzw. repelenty)
- ✓ **JASNE UBRANIE ZASŁANIAJĄCE CIAŁO**
- ✓ **UNIKANIE OBSZARÓW O WYSOKIEJ
POPULACJI KLESZCZY**
(w szczególności wiosną i latem)
- ✓ **SPRAWDZANIE CIAŁA**
po powrocie ze spacerów w lesie, łące
- ✓ **JAK NAJSZYBSZE USUNIĘCIE KLESZCZA**

**Bardzo ważna jest technika
usuwania kleszcza**

Jedyną metodą profilaktyki Boreliozy
jest zapobieganie ukąszeniom przez
kleszcze.

**Obecnie nie istnieje
szczepionka przeciwko Borelioze**
Leczenie polega na antybiotykoterapii

OBJAWY

- ✓ **STADIUM WCZESNE**
Rumień wędrujący
Lymphocytoma
- ✓ **STADIUM WCZESNE ROZSIANE**
Zapalenie stawów z obrzękiem
(najczęściej dużych stawów, np.
kolanowego, skokowego)
Bóle głowy
Sztywność karku
Zaburzenia rytmu serca
Porażenie nerwu twarzowego
Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych

Borelioza może ujawnić się
wiele miesięcy lub nawet lat
po pierwotnym zakażeniu.

- ✓ **STADIUM PÓŹNE**
Przewlekłe stany chorobowe różnych
narządów i układów

Źródło: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/>