



Znak sprawy: DHR.rs.8207.1.38.2021(2024)

### POSTANOWIENIE nr 33/2025

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.) (dalej: k.p.a.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.), **postanawiam** na żądanie strony sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-218/2025d z dnia 14 marca 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **ProSto 300 SL** produkcji Innvigo Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa:

- 1) **Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** do ww. decyzji,
- 2) **Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA** do ww. decyzji,
- 3) **Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN** do ww. decyzji

otrzymują brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

## **Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

### **OPIS DZIAŁANIA**

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlopypirald zaliczana jest do grupy 4 (dawnej grupy O).

### **DZIAŁANIE NA CHWASTY**

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

#### **Rzepak ozimy**

Termin zastosowania:

– Jesienią

a) Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,2 l/ha

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe:        | chaber bławatek.                                                             |
| Chwasty średniowrażliwe: | maruna bezwonna.                                                             |
| Chwasty odporne.         | fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna. |

b) Środek stosowany w mieszaninie:

ProSto 300 SL 0,2 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe:        | chaber bławatek.                                                             |
| Chwasty średniowrażliwe: | maruna bezwonna.                                                             |
| Chwasty odporne.         | fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna. |

c) Środek stosowany w mieszaninie:

ProSto 300 SL 0,2 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe: | chaber bławatek, maruna bezwonna, przytulia czepna. |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Chwasty odporne: | fiólek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski. |
|------------------|------------------------------------------------------------|

– Wiosną

a) Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe: | chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity.                                                                 |
| Chwasty odporne:  | fiólek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczkowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity. |

b) Środek stosowany w mieszaninie:

ProSto 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe:       | chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity. |
| Chwasty średniodoporne: | gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny.                                                   |
| Chwasty odporne:        | fiólek polny, przetacznik bluszczkowy, przetacznik perski, tasznik pospolity.                         |

### **Pszenica ozima**

Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe:        | maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa. |
| Chwasty średniowrażliwe: | ostrożeń polny.                                                                             |
| Chwasty odporne:         | dymnica pospolita, fiólek polny.                                                            |

### **Burak cukrowy**

Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chwasty wrażliwe: | chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa. |
| Chwasty odporne:  | komosa biała, mak polny, rdest kolankowy.                                                                                                             |

## **STOSOWANIE ŚRODKA**

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

### **Rzepak ozimy**

Termin stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:

#### **A. Jesienią - od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 20-21).**

Zastosowanie środka pojedynczo:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zastosowanie środka w mieszaninie

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka zaleca się zastosowanie środka ProSto 300 SL łącznie z adiuwantem Asystent + w dawkach:

ProSto 300 SL 0,2 l/ha + Asystent + 0,1 l/ha.

lub

W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka ProSto 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:

ProSto 300 SL 0,2 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha.

#### **B. Wiosną - po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).**

Zastosowanie środka pojedynczo:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha

Zastosowanie środka w mieszaninie:

W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka ProSto 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:

ProSto 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jeden jesienią lub jeden wiosną, w zastosowaniu co trzy lata).

### **UWAGA:**

Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji w rzepaku mogą skutkować wystąpieniem przemijających objawów fitotoksyczności, które nie mają wpływu na plonowanie.

Dla uzyskania właściwej skuteczności zabiegu wykonywanego na rośliny wyrosnięte zwłaszcza w fazie BBCH 20-21 rzepaku należy zapewnić dobrą penetrację cieczy użytkowej oraz dobre pokrycie chwastów cieczą użytkową.

### **Pszemica ozima**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 w zastosowaniu co dwa lata.

### **Burak cukrowy**

#### Zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 w zastosowaniu co dwa lata.

#### Zabieg w dawkach dzielonych

Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:

Maksymalna / zalecana dawka dla trzykrotnego zastosowania:

- pierwszy zabieg 0,2 l/ha,
- drugi zabieg 0,2 l/ha,
- trzeci zabieg 0,2 l/ha.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14), a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (w zastosowaniu co trzy lata).

Odstęp między zabiegami: 6 - 10 dni.



### **Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

1. Po zastosowaniu tego środka w uprawie rzepaku ozimego, środki zawierające substancję chlopypirald można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 3 lata.
2. Po zastosowaniu tego środka w uprawie buraka cukrowego trzykrotnie w dawce 0,2 l/ha, w fazie BBCH 12-14, środki zawierające substancję chlopypirald można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 3 lata.
3. Po zastosowaniu tego środka w uprawie buraka cukrowego, w dawkach innych niż wymieniona powyżej, środki zawierające substancję chlopypirald można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 2 lata.
4. Po zastosowaniu tego środka w uprawie pszenicy ozimej, środki zawierające substancję chlopypirald można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 2 lata.
5. Materiału roślinnego, który opryskano środkiem ProSto 300 SL nie wolno używać do kompostowania ani ściółkowania.
6. Przy ustalaniu wielkości kropel cieczy użytkowej należy uwzględnić ograniczenia wymienione w akapitach dotyczących środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego.
7. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 10°C – 12°C.
8. Strategia zarządzania odpornością  
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  - postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  - dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  - stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  - stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  - stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  - dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  - używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  - używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  - czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  - informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

- w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

9. Środka nie stosować:

- na rośliny mokre oraz uszkodzone przez choroby i szkodniki,
- w mieszaninach z nawozami,
- w temperaturze powyżej 25 °C.

10. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.



#### **Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Niewymagany.

#### **NASTĘPSTWO ROŚLIN**

Po upływie 125 dni od ostatniego zastosowania środka, można siać lub sadzić dowolne uprawy.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, dowolną uprawę można siać lub sadzić po 30 do 125 dniach od zastosowania środka, z zastrzeżeniem, aby nie stosować produktów zawierających chlopyralid na rośliny następcze na tym samym obszarze wcześniej niż to określono w etykiecie (w zależności od zastosowania - 2 lub 3 lata)

Podczas stosowania środka ProSto 300 SL w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 marca 2025 r. pełnomocnik spółki Innvigo Sp. z o.o. 02-486 Warszawa zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o sprostowanie zapisu nazwy handlowej w całej decyzji na nazwę „ProSto 300 SL”. W decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-218/2025d z dnia 14 marca 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **ProSto 300 SL** popełniono omyłkę w zapisie nazwy środka ochrony roślin. Zamiast prawidłowego zapisu „**ProSto 300 SL**” wpisano w decyzji nazwę środka zapisaną w następujący sposób „Prosto 300 SL”.

Ponadto w załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4 do ww. decyzji popełniono omyłkę w zapisie nazwy środka ochrony roślin, zamiast prawidłowego zapisu „**ProSto 300 SL**” wpisano ww. załącznikach do decyzji nazwę środka zapisaną w następujący sposób „Prosto 300 SL”.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłek.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki pisarskie w wydanych przez ten organ decyzjach. W związku z powyższym, postanowiono o sprostowaniu powyższej omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3, w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Krzysztof Smaczyński  
zastępca dyrektora  
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

([zezwozenia.sor@piorin.gov.pl](mailto:zezwozenia.sor@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB

([decyzje.sor@iorpib.poznan.pl](mailto:decyzje.sor@iorpib.poznan.pl))

Instytut Ogrodnictwa

([ochrona.roslin@inhort.pl](mailto:ochrona.roslin@inhort.pl))

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

[www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych](http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych)