Załącznik Nr 1

Gotowe podłoża w probówkach

Podłoża winny być umieszczone w probówkach: wysokość probówki 96- 110 mm, szerokość probówki wewnętrzna przy wlewie nie mniej niż 14 mm i nie więcej niż 16 mm z wciskanym korkiem, nie dopuszcza się probówek zakręcanych. Probówki plastikowe lub szklane, oznaczoną trwałym nadrukiem informacyjnym umieszczonym wzdłuż probówki (nie etykietą) zawierającym nazwę skróconą podłoża, nr kat., nr serii, datę ważności, nazwę producenta, w której konfekcjonowane będzie podłoże przez cały okres obowiązywania umowy. Ilość podłoża w probówkach zgodnie z poniższą tabelą. Podłoże klarowne, przezroczyste bez wytrącania składników, bez zmiany zabarwienia, konsystencji. Próbka nie podlega zwrotowi. Podłoża powinny być dostarczane z terminem przydatności dłuższym niż 2/3 terminu przydatności, licząc od daty dostarczenia oraz sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014 Certyfikaty potwierdzające sprawdzenie podłóż wg w/w normy prosimy dołączyć na etapie składania ofert.

L.p.	Nazwa podłoża	Nazwa handlowa / zastosowanie	Ilość podłoża w probówce	Szacowane potrzeby roczne szt.
1	Podłoże Kligler Agar-skos	**Kligler Iron Agar**. Podłoże do różnicowania Gram(–) pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz produkcji H2S	3 ml	400
2	Podłoże do wykrywania indolu (tryptonowo-tryptofanowe)	**Indol Medium (tryptone-tryptophane).** Podłoże do wykrywania zdolności wytwarzania indolu Odczynnik: Ehrlich's reagent, Kovac's reagent	3 ml	400
3	Podłoże Christensen bulion z mocznikiem HM	**Christensen Broth** . Podłoże do biochemicznego różnicowania pałeczek na podstawie zdolności do wytwarzania ureazy	3ml	400
4	Podłoże z 10% laktozą pod parafiną	**Bromocresol Purple Broth + 10% Lactose .** Podłoże do wykrywania zdolności mikroorganizmów do fermentacji laktozy	3ml	400
5	Podłoże Falkowa kontrolne	**Falkow Decarboxylase Broth control .** Podłoże kontrolne do podłoży wykrywających zdolność dekarboksylacji aminokwasów	3 ml	200
6	Podłoże Falkowa z lizyną	**Falkow Decarboxylase Broth + Lysine**. Podłoże do wykrywania zdolności drobnoustrojów do dekarboksylacji lizyny	3 ml	200
7	Podłoże Falkowa z ornityną	**Falkow Decarboxylase Broth + Ornithine**. Podłoże do wykrywania zdolności drobnoustrojów do dekarboksylacji ornityny	3 ml	60
8	Agar do oznaczania ruchu	**PP Red Agar.** Podłoże z reakcją barwną do określania zdolności ruchu pałeczek	3 ml	40
9	Podłoże selektywne SF	**Selenite F Broth.** Podłoże wybiórcze do namnażania Salmonella spp Skład: hydrolizat kazeiny 5g, laktoza 4g, fosforan sodu 10g, selenin sodu 4g	5 ml	10 000