



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.9.2025

DECYZJA nr R-707/2025d

Na podstawie art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o *środkach ochrony roślin*² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z 17 lutego 2025 r. spółki Synthos Agro sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32 - 600 Oświęcim

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 80/2024 z dnia 13 maja 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Pirox 05 SC w następujący sposób:

- 1) W sentencji zezwolenia w części **ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA** dodaje się akapit:
„Załącznik nr 9 - **ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**”
- 2) Poniżej wskazane załączniki do przedmiotowej decyzji:
 - **Załącznik nr 4 - OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN**
 - **Załącznik nr 5 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**
 - **Załącznik nr 6 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**
 - **Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.).

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń, grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna – 21 dni,

Truskawka, ogórek – 7 dni,

Śliwa, malina – 14 dni,

Winorośl – 28 dni,

Rośliny ozdobne, szkółki leśne – nie dotyczy.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną (kombinezon) zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (długie spodnie, koszula z długim rękawem) podczas wkraczania na obszar po zabiegu.

Po wykonanym zabiegu umieścić w widocznych miejscach wokół pola tablice ostrzegawcze o brzmieniu „Zakaz wstępu osobom postronnym na teren poddany zabiegom środkami ochrony roślin”. Tablice powinny pozostać do czasu zbioru roślin/końca sezonu wegetacyjnego.

W czasie oprysku należy zastosować co najmniej 5 m strefę ochronną od zabudowań mieszkalnych/siedlisk oraz osób postronnych.

W czasie oprysku należy zastosować techniki zmniejszające znoszenie preparatu (dysze antyznoszeniowe, mała prędkość pojazdu, stabilna pogoda i inne).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W uprawie jabłoni, gruszy, pigwy pospolitej, nieszpunki zwyczajnej, śliwy, maliny, szkótek leśnych, ogórka (w fazie BBCH 11-19):

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

- strefy ochronnej o szerokości 95 m, zadarnionej na szerokości 1 m, od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%

lub

- strefy ochronnej o szerokości 70 m, zadarnionej na szerokości 1 m, od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo

W uprawie winorośli, truskawka, ogórka (BBCH 21-71), roślin ozdobnych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 25 m, zadarnionej na szerokości 1 m, od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

Grusza, pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Zalecana ilość wody: 750- 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ogórek uprawiany w polu

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,8 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy całkowitego rozwinięcia pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy rozwiniętych 9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 11-19); lub

od fazy widocznego pierwszego, pierwszorzędowego pędu bocznego do fazy osiągnięcia typowego kształtu i wielkości zbiorczej pierwszego owocu na pędzie głównym (BBCH 21-71), z wyłączeniem okresu kwitnienia.

Środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka

Roztocz truskawkowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy rozwoju liści do fazy rozwiniętych 9 lub więcej liści (BBCH 11- 19) lub od fazy początku tworzenia pędu rozłogowego (długość ok. 2 cm) do fazy kiedy większość kwiatów z płatkami tworzą wklęsłą kulę (BBCH 41-59) lub po zakończeniu kwitnienia od rozrostu dnia kwiatowego (od BBCH 71) do zbioru rośliny z zachowaniem okresu karencji.

Środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny (BBCH 60-67).

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa

Przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy rozwiniętego pierwszego liścia, widocznej osi rozwoju pędu do fazy kwitnienia (BBCH 11-59) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71) do zbioru rośliny z zachowaniem okresu karencji.

Środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,8 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy dziewięciu i więcej liści rozwiniętych do fazy gdy kwiatostany powiększone, a kwiaty oddzielone od siebie (BBCH 19-57) lub po zakończeniu kwitnienia (od BBCH 71) do fazy mięknięcia jagód (BBCH 85).

Środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina

Przędziorek chmielowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy pierwszych liści całkowicie rozwiniętych (BBCH 19) do fazy grona, gdy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone (BBCH 59) lub po zakończeniu kwitnienia od fazy początku wzrostu owocu; widocznych pierwszych owoców na gronie (BBCH 71) do fazy zaawansowanego dojrzewania, pierwszych jagód u podstawy grona osiągających charakterystyczną dla gatunku barwę (od BBCH 85).

Środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane w polu

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,8 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

W przypadku roślin ozdobnych miododajnych, środka nie stosować w fazie kwitnienia rośliny.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m².

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki leśne drzew liściastych

Przędziorek lipowiec

Maksymalna / zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

Ilość wody dopasować do wielkości roślin.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki leśne drzew iglastych

Przędziorek sosnowiec

Maksymalna / zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

Ilość wody dopasować do wielkości roślin.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 17 lutego 2025 r. spółka Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu wystąpiła w trybie art. 51 rozporządzenia 1107/2009 o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Pirox 05 SC dotyczącego zwalczania przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie gruszy, pigwy pospolitej, nieszpułki zwyczajnej, nieśplika, winorośli, ogórka i roślin ozdobnych uprawianych w polu, roztocza truskawkowca i przędziorka chmielowca w uprawie truskawki, przędziorka owocowca i pordzewiacza śliwowego w uprawie śliwy, przędziorka chmielowca w uprawie maliny, przędziorka owocowca, przędziorka chmielowca i przędziorka szklarniowca w roślinach ozdobnych uprawianych pod osłonami, przędziorka lipowca w szkółkach leśnych drzew liściastych oraz przędziorka sosnowca w szkółkach leśnych drzew iglastych

Zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenie nr 1107/2009 państwa członkowskie rozszerzają zakres zezwolenia, pod warunkiem że zamierzone zastosowanie ma charakter małoobszarowy. W Polsce uprawy i zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2023 r.³. W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia nieśplik nie jest wskazany jako roślina małoobszarowa. Tym samym rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Pirox 05 SC w celu zwalczania przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie nieśplika nie może zostać uznane w trybie art. 51 rozporządzenia 1107/2009.

Wnioskowane rozszerzenie zakresu stosowania środka Xapiro 05 SC zostało ocenione i pozytywnie zaakceptowane w zakresie wpływu na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego ze stosowania i pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, losu i zachowanie środka w środowisku oraz oddziaływania na gatunki niebędące celem działania przedmiotowego środka ochrony roślin – raporty rejestracyjne sporządzone przez Instytut Ochrony Środowiska - PIB z siedzibą w Warszawie z czerwca 2025 r. z korektą z lipca 2025 r. i sierpnia 2025 r.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że środek ochrony roślin Pirox 05 SC spełnia wymagania określone w art. 29 i w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1107/2009.

Środek Pirox 05 SC może być stosowany w rozszerzonym na uprawy małoobszarowe zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

³ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2023 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin* (Dz. U. poz. 2008, z 2023 r.)

Pismem z dnia 5 września 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.⁴ (dalej jako: k.p.a.), został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 9 września 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie wniósł uwagi, które zostały zaakceptowane.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁵.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a..

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 § 1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁶ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

⁴ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

⁵ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2022 r. poz.2142 z późn. zm)

⁶ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych