



WSZAWICA

Wszawica występuje na całym świecie i we wszystkich warunkach klimatycznych.

Na zarażenie się wszawicą narażony jest każdy, kto przebywa w zbiorowiskach ludzkich (tj. publiczne środki transportu, placówki oświatowe, internaty, kolonie, obozy).

Wszawica głowowa jest najczęściej spotykaną postacią wszawicy i dotyczy owłosionej części głowy. Żywicielem wszy głowowej jest człowiek. Wesz przenosi się z człowieka na człowieka w wyniku bezpośredniego kontaktu oraz poprzez przedmioty bezpośrednio użyte przez osoby zarażone (odzież, pościel, inne przedmioty osobistego użytku).

Poza gospodarzem wesz lub jaja wszy mogą przetrwać ok. 10 dni.

Cykl życiowy wszy składa się z 3 stadiów: jajo(gnida), larwa, postać dorosła. Około 7 dni wynosi okres wylęgania się jaja, **dlatego po stwierdzeniu wszawicy czyszczenie głowy powinno odbywać się co najmniej 2-3 razy w 7-10-dniowych odstępach.**

Jajeczka wszy przyklejone są do włosów, a larwy i postacie dorosłe znajdują się na skórze głowy, najczęściej usadowione są u nasady włosów, w okolicach potylicy lub za uszami.

Jaja wszy (gnidy) przypominają łupież i z tego powodu nie zawsze są rozpoznawane przez rodziców. Jednak -w przeciwieństwie do łupieżu- gnidy bardzo mocno przytwierdzone są do włosów wydzieliną produkowaną przez samicę i to w istotny sposób odróżnia je od łupieżu.

W przypadku stwierdzenia wszawicy należy :

- **dokonać przeglądu wszystkich osób z bezpośredniej styczności, zwłaszcza członków rodziny i innych współmieszkańców**
- **zastosować jeden z preparatów przeciwko wszawicy dostępnych w aptece. Należy go stosować wg instrukcji podanej na etykiecie**
- **systematycznie kontrolować czystość głowy po użyciu preparatu, jeśli będzie to konieczne, powtórzyć kurację po około 7-12 dniach**
- **gnidy należy usunąć przy użyciu specjalnego grzebienia lub ręcznie**
- **wyprać bieliznę osobistą i pościel w wodzie o temperaturze przynajmniej 55 C przez 20 minut**
- **odzież wyprasować, szczególnie w okolicy szwów.**

Nie zaleca się stosowania preparatów chemicznych u dzieci poniżej 2 roku życia, wówczas wszawicę należy likwidować przy użyciu specjalnego grzebienia lub poprzez ręczne usunięcie wszystkich gnid i wszy.

JEŚLI RODZIC DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOŁA STWIERDZI U DZIECKA WSZAWICĘ, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE DYREKTORA PLACÓWKI, PONIEWAŻ TYLKO WTEDY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA SYTUACJI I SKUTECZNEJ WALKI Z WSZAWICĄ!

Opracowano na podstawie :

W.Magdzik, D.Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński „Choroby zakaźne i pasożytnicze”, wyd. á-medica Press, 2006r.