

Posiadacz zezwolenia:

Westland Sp. z o.o., ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 17/5, 84-230 Rumia, tel.: 58 3339033

Nawóz do trawników. Zwalcza chwasty

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 2,86 g/kg (0,286 %)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 0,57 g/kg (0,057 %)

mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) - 2,86 g/kg (0,286 %)

siarczan żelaza (w postaci heptahydratu) - 217,3 g/kg (21,73 %)

Dodatkowo środek zawiera mieszkankę nawozową (10-2-2):

całkowitego azotu (N) 10,0%, pięciotlenek fosforu (P₂O₅) 2,0% (0,9% P), pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie 1,9% (0,8% P), tlenek potasu (K₂O) 2,0% (1,7% K)

Zezwolenie MRiRW nr R- 52/2020wu z dnia 30.12.2020 r.

	
Uwaga	
H319 H412	Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 208 EUH401	Zawiera 2,4-D. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264 P280 P305+P351+P338	Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD z nawozem w formie granul (GR) do posypywania, stosowany nalistnie, przeznaczony do powszechnego zwalczania chwastów w amatorskiej uprawie trawników w ogrodach przydomowych i działkowych.

Dodatek długotrwale działających składników pokarmowych zaspokaja wszystkie ważne potrzeby pokarmowe traw wchodzących w skład trawnika.

Substancje czynne dikamba oraz 2,4-D zgodnie z klasyfikacją HRAC zaliczane są do grupy 4 (dawnej grupy O).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych.

Chwasty wrażliwe:	babka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyna, drobnogłówkowa, przetacznik macierzankowy.
Chwasty średniowrażliwe:	koniczyna biała, rogownica źródłana.
Chwasty średnioodporne:	babka lancetowata, głowienka pospolita, jaskier rozłogowy, mniszek lekarski, pięciornik rozłogowy, stokrotka polna.

Trawniki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 32 g/m².

Termin stosowania: Środek stosować na dobrze zakorzenionych trawnikach (mających powyżej 6 miesięcy) od maja do sierpnia gdy trawa i chwasty aktywnie rosną, przy temperaturze powietrza powyżej 14°C.

Środek stosować minimum 3 dni po wykonaniu koszenia trawnika, aby umożliwić dobre wchłonięcie środka chwastobójczego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować na obszarze do 500 m².

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Skoszonoj trawy nie przeznaczać na paszę dla zwierząt.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie lub inne rośliny :

Nie wysiewać nasion ani nie sadzić darni przez co najmniej 6 tygodni po zastosowaniu środka.

1. Środek stosować równomiernie na wyznaczonym obszarze ręcznie lub rozsiewaczem kołowym.
2. W przypadku rozsiewacza kołowego: Dostosować ustawienie lub skalibrować w celu stosowania środka w ilości 32 g/m².
3. Środek stosować, gdy gleba jest wilgotna, a trawa sucha.
4. W przypadku gdy po upływie 48 godzin od zastosowania środka nie spadnie deszcz trawnik należy dokładnie podlać.
5. Po zastosowaniu środka chwasty mogą odznaczać się silnym wzrostem, a następnie ulegać zniekształceniu lub skręceniu oraz więdnieniu.
6. Po upływie 7–14 dni należy zgrabić zaschnięte chwasty.
7. Po upływie 7 dni od zastosowania środka trawa na trawnikach stanie się bardziej zielona.
8. Środek natychmiast usunąć szczotką z chodników, desek, odzieży i obuwia, aby uniknąć przebarwień/odbarwień. Nie splukiwać, gdyż może to spowodować przebarwienia.
9. Po zastosowaniu środka mogą pojawić się przemijające odbarwienia trawnika.
10. Unikać ponownego rozsiewania środka na powierzchnię uprzednio potraktowaną oraz zawyżania dawki.
11. Unikać chodzenia lub wpuszczania zwierząt domowych na obszary, w których zastosowano środek, aż do opadów deszczu lub podlania trawnika i całkowitego wyschnięcia na nim trawy.
12. Nie używać ściętej trawy z pierwszych 4 koszeń do mulczowania, przed upływem okresu 6 miesięcy od jej kompostowania.
13. Nie siać ponownie nasion ani sadzić darni przez co najmniej 6 tygodni od zastosowania środka.

14. Środek nie powinien przedostać się na rośliny wrażliwe, takie jak rośliny ozdobne, w tym kwiaty, warzywa itp.

15. Środka nie stosować:

- na nowo założonych trawnikach w pierwszym roku po założeniu,
- więcej niż dwa razy w sezonie,
- w mieszaninie z innymi środkami ochrony roślin,
- na powierzchniach brukowane, z uwagi na możliwość trwałego zabrudzenia,
- w czasie wietrznej pogody,
- w czasie przymrozków,
- w okresach suszy,
- przed ulewnym deszczem,
- w temperaturze powietrza poniżej 14°C,
- na obszarze ponad 500 m².

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) i okulary ochronne.

Po zastosowaniu środka niezwłocznie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

- nie wchodzić do czasu wystąpienia opadów deszczu lub podlania obszaru potraktowanego środkiem i całkowitego wyschnięcia trawy,
- nie wpuszczać zwierząt na teren potraktowany środkiem do czasu całkowitego wypłukania środka z powierzchni trawnika (wystąpienia opadów deszczu lub podlania obszaru potraktowanego środkiem) i wyschnięcia trawy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Nie dopuścić do wysiania/wysypania granul poza obszar stosowania środka.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0 °C - 30°C
- chronić przed mrozem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -