



DHR.rs1.8208.3.90.2024

ZEZWOLENIE nr R-54/2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku spółki W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec z dnia 10 grudnia 2024 r.

ZEZWALAM

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **NEUDOSAN środek przeciwko mszycom.**

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Nazwa środka referencyjnego:	Insectystop
Numer zezwolenia MRiRW środka referencyjnego wraz z datą wydania:	R-191/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
Posiadacz zezwolenia:	W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec
Producent środka ochrony roślin:	W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec
Rodzaj środka ochrony roślin:	Insektycyd

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	Użytkownicy nieprofesjonalni
Substancje czynne:	Sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (49,66%)
Okres ważności środka ochrony roślin	2 lata

WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
100 ml – 1 l	HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 1 grudnia 2027 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011³, zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008⁴.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

³ Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

OBOWIAZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

1. Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2:
H315 – Działa drażniąco na skórę.
2. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe:
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
3. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1:
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
4. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 3:
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie środka ochrony roślin:

Wymagane piktogramy: GHS07, GHS09

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315, H335, H410

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

Załącznik nr 2 - OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD o działaniu kontaktowym, w postaci koncentratu rozpuszczalnego (SL) w wodzie. Przeznaczony do zwalczania postaci dorosłych i larwalnych oraz jaj owadów i roztoczy. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja czynna środka wykazuje fizyczny sposób działania na szkodniki i powoduje m.in. uszkodzenia kutikuli, a po wnikięciu do ciała szkodnika zaburzenia w osmoregulacji i w funkcjonowaniu układu oddechowego i nerwowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń

Mszyce (z wyłączeniem bawełnicy korówki), przędziorki.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/10 m²

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 500 ml/10 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Grusza

Miodówki

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/10 m²

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 500 ml/10 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Wiśnia

Mszyca wiśniowa

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/10 m²

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 500 ml/10 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Śliwa

Mszyca wiśniowa

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/10 m²

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Zalecana ilość wody: 500 ml/10 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Ogórek i inne warzywa dyniowate, pomidor, papryka, oierzyna (w uprawie szklarniowej)

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Zalecana wydajność cieczy użytkowej zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 11,1 m² powierzchni uprawy.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 7,4 m² powierzchni uprawy.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 5,5 m² powierzchni uprawy.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Kapusta i inne warzywa kapustne (w uprawie polowej)

Mszyce

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 ml/10 m² w 0,9 l wody,

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 ml/10 m² środka w 1,35 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Kalafior i inne warzywa kapustne (w uprawie szklarniowej)

Mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (20 ml środka w 1 l wody).

Zalecana wydatek cieczy użytkowej zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 11,1 m² powierzchni uprawy,

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 7,4 m² powierzchni uprawy.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Fasola i inne warzywa strączkowe (w uprawie polowej na suche nasiona)

Mszyca burakowa

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana dawka środka i ilość wody zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 18 ml/10 m² w 0,9 l wody,

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 27 ml/10 m² środka w 1,35 l wody,

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 36 ml/10 m² środka w 1,8 l wody.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Róża, chryzantema, bluszcz i inne rośliny ozdobne (w uprawie w szklarniowej, w uprawie na tarasach i balkonach oraz w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych)

Mszyce, przędziorki, mączlik szklarniowy

Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka w 100 l wody).

Zalecana wydatek cieczy użytkowej zależy od wysokości roślin uprawnych:

Wysokość roślin poniżej 50 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 11,1 m² powierzchni uprawy.

Wysokość roślin powyżej 50 do 125 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 7,4 m² powierzchni uprawy.

Wysokość roślin powyżej 125 cm: 1 l cieczy użytkowej (roztworu środka) wystarcza na 5,5 m² powierzchni uprawy.

Termin stosowania: środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Załącznik nr 3 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Zabieg wykonywać wieczorem lub we wczesnych godzinach porannych. Szczególnie w celu ochrony dzikich pszczół. Środek jest toksyczny dla glonów, ryb i zwierząt będących pożywieniem dla ryb.

W trakcie przygotowania cieczy użytkowej (roztworu środka) należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do nadmiernego wytworzenia się piany.

Należy zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową, w tym spodniej strony liści, tak aby rośliny były dobrze zwilżone. Należy jednak unikać bezpośredniego opryskiwania kwiatów.

Zabiegi należy przeprowadzać późnym wieczorem, ponieważ środek wykazuje wyższą skuteczność w niższych temperaturach powietrza.

Po zastosowaniu środka, zwłaszcza w uprawach szklarniowych, mogą wystąpić uszkodzenia roślin w przypadku silnej ekspozycji na światło słoneczne.

Przed zastosowaniem środka na całą powierzchnię uprawy (zwłaszcza roślin ozdobnych, w tym nowych gatunków i odmian) zaleca się przed planowanym zabiegiem, sprawdzić działanie środka na mniejszej powierzchni uprawy celem wykluczenia ewentualnej fitotoksyczności. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Załącznik nr 4 - OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Niewymagany

Załącznik nr 5 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) podczas przygotowywania i stosowania środka.

Zaleca się, aby podczas przygotowywania/stosowania środków ochrony roślin nosić koszulę z długimi rękawami, długie spodnie i solidne buty.

Produkt należy stosować jedynie jako środek owadobójczy. Należy postępować zgodnie z etykietą.

Unikać wdychania oparów/aerozolu.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nadmierny kontakt ze środkiem może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Środek jest szkodliwy dla populacji istotnych owadów pożytecznych.

Załącznik nr 7 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w dobrze wentylowanym miejscu.
- szczelnie zamknięty.

Chronić przed mrozem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Zalecana temperatura przechowywania: 20°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia inhalacyjnego: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

W przypadku kontaktu ze skórą: należy spłukać wodą.

W przypadku kontaktu z oczami: przemyć dokładnie dużą ilością wody.

W przypadku połknięcia: wypić dużą ilość wody i zasięgnąć porady lekarza.

Załącznik nr 8 - POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, adres www) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia zobligowany jest do umieszczenia informacji o zawartości w środku ok. 40 g/l dodekanolu użytego jako środka zwilżającego.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ określa posiadacz zezwolenia z uwzględnieniem informacji o konieczności zwrócenia uwagi na tworzenie się piany podczas przygotowywania roztworu do oprysków.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 grudnia 2024 r. spółka W. Neudorff GmbH KG, z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec wystąpiła o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin NEUDOSAN środek przeciwko mszycom.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy środek ochrony roślin jest identyczny ze środkiem Insectystop produkcji spółki W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec.

W toku postępowania administracyjnego potwierdzono, że środek ochrony roślin NEUDOSAN środek przeciwko mszycom jest identyczny ze środkiem Insectystop, stąd również spełnia wymogi określone w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011⁵, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 1 grudnia 2027 r.

Pismem z dnia 19 marca 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce W. Neudorff GmbH KG w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)⁶, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 21 marca 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagi do postępowania, które zostały zaakceptowane.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

⁶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁷.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁸ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Smaczyński
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

⁷ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

⁸ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych