

INFORMACJE I WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNETY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIEKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIĘ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

UWAGA !

TEREN WYKŁADANIA PRZYNET ZE SZCZEPIEKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIĘ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH



PRZYNETY ZE SZCZEPIEKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIĘ

WYKŁADANE BĘDĄ NA OBSZARZE WSCHODNIEJ CZEŚCI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(POWiat BRODNICKI, RYPIŃSKI, LIPNOWSKI, WŁOCŁAWSKI, GOLUBSKO-DOBROŻYŃSKI, ALEKSANDROWSKI, RADZIEJOWSKI;
POW. WĄBRZESKI: GM. KSIĄŻKI, GM. DĘBOWA ŁĄKA, GM. RYŃSK, POW. TORUŃSKI GM. OBROWO, GM. LUBICZ, GM. CZERNIKOWO,

W OKRESIE od 4 do 17 kwietnia 2024 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIĘ

1. LIS jest głównym przenosicielem wściekliżni. Celem skutecznego zwalczania wściekliżni u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynet zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wściekliżny.
2. Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliżni prowadzona jest dwa razy w roku poprzez rzut na samolotów przy net zawierających szczepionkę.
3. Zrzuty immunoprzynet dokonywane są na obszarach niezbudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
4. Immunoprzyroty koloru brązowo-zielonego mają kształt kwadratowy lub kulisty o wielkości ok. 4,5 cm; wykonane z masy mięsno - rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliżni. Uodparnienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynetę a tym samym pojemniczkę (saszetkę) z szczepionką, która rozlewa się na bilonę śluzową jamy ustnej zwierzęcia.
5. Szczepionka jest dopuszczana do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliżni.
6. Przynety dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.

WSKAŻÓWKI

DLA MIESZKANCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKŁADANE SĄ IMMUNOPRZYNETY
DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIĘ

- Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynet, z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa
- Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynet z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa oraz oczami,
 - W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynetą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację „SANEPID-u” lub lekarza weterynarza,
 - Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynetą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarza, protokołarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
 - Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynetą należy zgłosić właściwemu teritorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarzowi, który ustali tok dalszego postępowania.

ABY AKCJA DOUSTNEGO SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZEBIEGALA BEZPIECZNIE
I EFEKTYWNIE, PROSÍ SIĘ O:

- Nie wypuszczanie swobodnie psów i kotów oraz nie organizowanie polowań z psami w okresie 3 tygodni od wyłożenia szczepionki,
- Nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie napotkanych immunoprzynet,
- Zgłaszanie wszelkich kontaktów ludzi lub zwierząt domowych z immunoprzynetami w najbliższych przychodniach lekarskich, szpitalach załatwianych, stacjach „SANEPID-u”, lecznicach weterynaryjnych lub Inspektoratach Weterynarii,
- Szczególne pouczenie dzieci o powyższych zasadach postępowania.



Dofinansowane przez Unię Europejską