

**Obwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie listy leków
refundowanych
od 1 października 2025 roku**



Ministerstwo
Zdrowia

2025

przełomowym rokiem dla zdrowia polskich pacjentów

50 nowych terapii


najwięcej w historii w ramach jednego wykazu



Ministerstwo
Zdrowia



Liczba nowych terapii 2012–2025



Choroby rzadkie

12 nowych terapii dedykowanych
wskazaniom rzadkim lub
ultrarzadkim



Terapie onkologiczne

22 terapie onkologiczne objęte
refundacją



Fundusz Medyczny

3 nowe technologie lekowe
o wysokim poziomie
innowacyjności w ramach nowej
listy TLI V



Terapie nieonkologiczne

28 terapii nieonkologicznych
objętych refundacją




Zmiany na wykazach bezpłatnych leków

Dodanie **nowej szczepionki** na wykaz
65+ oraz **rozszerzenie wskazań**
wybranych leków



Leki o ugruntowanej skuteczności

4 terapie onkologiczne



13 nowych terapii w chorobach kobiecych



Kisqali (*rybocyklib*)

Leczenie uzupełniające wczesnego HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.




Phesgo (*pertuzumab+trastuzumab*)

Leczenie dorosłych pacjentów na HER2 dodatniego raka piersi w formie podań podskórnych.



Truqap (*kapiwasertyb*)

Leczenie II lub III linii w skojarzeniu z fulwestrantem, u dorosłych pacjentów na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HER2-ujemnego.



13 nowych terapii w chorobach kobiecych



Trodelvy (*sacytyzumab gowetikan*)

Leczenie chorych z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi od III lub IV linii.



Eksemestan

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii antyestrogenowej.




Anastrozol

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.



Letrozol

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które były leczone lekami o działaniu antyestrogenowym.




13 nowych terapii w chorobach kobiecych



Elahere (*mirwetuksymab sorawtanzyna*)

Leczenie dorosłych pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z dodatnim receptorem folianowym alfa.




Keytruda (*pembrolizumab*)

Leczenie dorosłych pacjentek z pierwotnym, nowozdiagnozowanym, miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy.



Keytruda (*pembrolizumab*)

Leczenie I linii dorosłych pacjentek na pierwotnie zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium.



13 nowych terapii w chorobach kobiecych



Imfinzi (*durwalumab*) – *monoterapia raka endometrium*

Leczenie dorosłych pacjentek na pierwotnie zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium.




Imfinzi (*durwalumab*) + Lynparza (*olaparyb*) – *terapia skojarzona raka endometrium*

Leczenie dorosłych pacjentek na pierwotnie zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium.




Ryego (*relugoliks+estradiol+octan noretysteronu*)

Objawowe leczenie endometriozy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, które wcześniej były leczone farmakologicznie lub chirurgicznie.




Terapie onkologiczne



Tagrisso (*ozymertynib*)

Leczenie konsolidujące dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.



Hycamtin (*topotekan*)

Leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca.




Fruzaqla (*frukwintynib*)

Leczenie chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego, po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia przeciwnowotworowego.



Enhertu (*trastuzumab deruteksan*)

Leczenie pacjentów z HER2-dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przłykowego.



Terapie onkologiczne



Opdivo+Yervoy (*niwolumab+ipilimumab*)
Leczenie neoadjuwantowe dorosłych pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III.



Erbix (cetuximab)
Nowy zakres wskazań pozarejestacyjnych w terapii raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.



Xgeva (*denosumab*)
Rozszerzenie zakresu kodów ICD-10 guzów litych oraz przeniesienie do chemioterapii.



5 nowych terapii pediatrycznych



Altuvoct (efanesoctocog alfa) – *pierwszy czynnik krzepnięcia podawany raz na tydzień*
Czynnik krzepnięcia VIII o ultraprzedłużonym działaniu.




Hemlibra (emicizumab) – *zniesienie kryterium wiekowego u dzieci*
Rozszerzenie wskazań na pełną populację pediatryczną oraz o pacjentów z umiarkowaną postacią hemofilii A przy ciężkim fenotypie krwotocznym.



5 nowych terapii pediatrycznych



Finlee+Spexotras (*dabrafenib+trametynib*) – *pierwsza celowana terapia na glejaka*
**Leczenie dzieci i młodzieży chorych na glejaka o niskim stopniu złośliwości (LGG),
u pacjentów z mutacją BRAF V600E.**



Finlee+Spexotras (*dabrafenib+trametynib*) – *pierwsza celowana terapia na glejaka*
**Leczenie dzieci i młodzieży chorych na glejaka o wysokim stopniu złośliwości (HGG),
u pacjentów z mutacją BRAF V600E.**



Cibinqo (*abrocytynib*)
Rozszerzenie o pacjentów z ciężką postacią AZS w wieku od 12 r. ż.



3 nowe terapie w chorobach hematologicznych



Voydeya (*danikopan*) – *pierwsza doustna terapia w leczeniu PNH*
Leczenie dorosłych pacjentów z PNH danikopanem w skojarzeniu z rawulizumabem lub ekulizumabem.



Piasky (*krowalimab*)
Leczenie pacjentów z PNH w wieku od 12 roku życia wcześniej nieleczonych inhibitorami C5 (C5i) lub stabilnych, leczonych C5i co najmniej 6 miesięcy.



Omjjara (*momelotynib*)
Leczenie pacjentów z mielofibrozą pierwotną, w przebiegu czerwienicy prawdziwej lub w przebiegu nadpłytkowości samoistnej.



5 nowych terapii w chorobach cywilizacyjnych



Praluent (*alirokumab*) – *znacząca redukcja wymagań przy kwalifikacji, dostęp dla nowej populacji*
Leczenie dorosłych pacjentów z bardzo wysokim i ekstremalnym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz dorosłych i pediatrycznych pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.



Repatha (*ewolokumab*) – *znacząca redukcja wymagań przy kwalifikacji, dostęp dla nowej populacji*
Leczenie dorosłych pacjentów z bardzo wysokim i ekstremalnym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz dorosłych pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.



Leqvio (*inklisiran*) – *znacząca redukcja wymagań przy kwalifikacji, dostęp dla nowej populacji*
Leczenie dorosłych pacjentów z bardzo wysokim i ekstremalnym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz dorosłych pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.




5 nowych terapii w chorobach cywilizacyjnych



Forxiga (dapagliflozyna)

Rozszerzenie wskazania refundacyjnego poprzez obniżenie wymaganego poziomu hemoglobiny glikowanej, wprowadzenie konieczności stosowania co najmniej jednego leku hipoglikemizującego.




Forxiga (dapagliflozyna)


Rozszerzenie wskazania refundacyjnego do pełnego zakresu frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF).




Nowe szczepionki i leki odczulające



Oralair (*wyciąg alergenów z pyłków traw*)
W objawowym leczeniu alergicznego nieżytu nosa.




Staloral 300 (*mieszanki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego*)
Leczenie umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym – rozszerzenie populacji o dzieci w wieku 5–11 lat.



Staloral 300 (*mieszanki wyciągów alergenowych pyłków tymotki, brzozy i traw*)
Leczenie schorzeń alergicznych u dzieci od 5 r.ż. i młodzieży do 18 r.ż. spowodowanych pyłkami tymotki łąkowej, brzozy, traw.



Nowe szczepionki i leki odczulające




Acarizax (*standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego*)
Leczenie umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym – rozszerzenie populacji o dzieci w wieku 5–11 lat.




Arexvy (*szczepionka przeciw wirusowi RSV*)
Profilaktyka zakażeń RSV u pacjentów w wieku 60 lat i starszych.



2 nowe terapie neurologiczne




Qalsody(*tofersen*) – *pierwsza terapia celowana w stwardnieniu zanikowym bocznym*
Leczenie chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS, SLA) związane z mutacją w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1).




Buccolam (*midazolam*)
Przedłużone, ostre napady drgawkowe u dorosłych. Lek interwencyjny o podaniu dopoliczkowym.



10 nowych terapii w chorobach o podłożu zapalnym




Remsima (infliksymab) – *podskórna forma infliksymabu w 6 wskazaniach*
Leczenie chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna, reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów, zeszywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, łuszczycą plackowatą, z ciężką lub umiarkowaną postacią WZJG infliksymabem w podskórnej postaci leku.




Fasenra (benralizumab)
Leczenie pacjentów od 18 r. ż. chorych na eozynofilową ziarniniakowość z zapaleniem naczyń w nowej, dedykowanej części programu.



10 nowych terapii w chorobach o podłożu zapalnym



Różne produkty handlowe (*rutyksymab*)
Leczenie rytuksymabem pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc.



Różne produkty handlowe (*tocilizumab*)
Leczenie pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową (SSc-ILD).



Różne produkty handlowe (*rutyksymab*)
Leczenie pacjentów z toczeniem rumieniowatym układowym w wieku ≥ 18 lat oraz dzieci po okresie dojrzewania.

**Obwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie listy leków
refundowanych
od 1 października 2025 roku**



Ministerstwo
Zdrowia
